

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญของปัญหา

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้ประเทศปีละไม่ต่ำกว่า 65,000 ล้านบาทและเป็นอาหารหลักประจำวันของคนไทยกว่า 60 ล้านคน แต่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลับประสบปัญหาหาราคาข้าวตกต่ำ และราคาปัจจัยการผลิตที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เช่น สารเคมี ปุ๋ย เครื่องมือเครื่องจักรการเกษตร และน้ำมัน เป็นต้น ทำให้รายได้ที่เกษตรกรได้รับไม่เพียงพอต่อการครองชีพและนำไปสู่การเคลื่อนย้ายแรงงานส่วนหนึ่งเข้ามาทำงานในเมืองช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมและอื่นๆ การแก้ไขปัญหาด้านราคาข้าวตกต่ำ รัฐเองก็ได้มีโครงการช่วยเหลือ เช่น การสร้างไซโลเพื่อเก็บข้าว การสร้างโรงสี และโรงอบข้าวในท้องถิ่น เป็นต้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าไทยจะเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ แต่ไม่ได้เป็นผู้กำหนดราคาข้าว การเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งมีประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ด้วย ดังนั้นปัญหาราคาข้าวที่ไม่มีเสถียรภาพ ยังเป็นปัญหาที่ประเทศต้องประสบเสมอมา สำหรับโครงการเสริมที่น่าจะนำมาใช้เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งนอกจากการจำหน่ายข้าวเพื่อการบริโภคโดยตรงเพียงอย่างเดียวและเป็นการเพิ่มการจ้างงานและกระจายรายได้ในท้องถิ่นอีกด้วย

ในปัจจุบันพบว่าผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกเป็นที่นิยมเนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมากประกอบด้วย โยอาหาร กรดไฟติก (Phytic acid) วิตามินซี วิตามินอี และ GABA (gamma aminobutyric acid) ซึ่งช่วยป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน และช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัว เป็นต้น ดังนั้นจากประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำข้าวกล้องงอกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขนมไทยเพื่อให้เป็นอาหารสุขภาพสำหรับผู้บริโภค โดยในการทดลอง จะได้ทำการศึกษาถึงการพัฒนารวมวิธีการผลิตที่เหมาะสม การวิเคราะห์คุณภาพทั้งด้าน กายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และคุณภาพทางประสาทสัมผัส รวมถึงศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่ได้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชน ภาคเอกชน และสถานประกอบการ เพื่อให้คนไทยได้บริโภคอาหารจากข้าวที่มีคุณภาพที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของไทย สามารถนำไปขยายต่อไปในเชิงพาณิชย์เป็นการอนุรักษ์ขนมของไทย และที่สำคัญยังสร้างให้อาหารจากข้าวมีมาตรฐานเพื่อเพิ่มปริมาณการส่งออกแต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของอาหาร ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งข้าวกล้องงอก
- 1.2.2. เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าว
- 1.2.3. เพื่อนำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปถ่ายทอดสู่ชุมชนหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ

1.3 ขอบเขตของการทดลอง

1.3.1 ขนมหวานจากแป้งกล้องงอกที่ทำการวิจัย เป็นอาหารที่คัดเลือกมาจากการสำรวจความต้องการและทดสอบการยอมรับเบื้องต้นจากผู้บริโภค ได้แก่ บัวลอย เต้าฮวยนมสด และลอดช่อง

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป คือ สามารถนำความรู้จากงานวิจัยชิ้นนี้ไปทำการทดลองในขั้นสูงต่อไป กลุ่มเป้าหมาย คือ นักวิจัยหรือนักศึกษาทั่วไป

1.4.2 บริการความรู้แก่ประชาชน คือ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดสู่ประชาชนเพื่อเสริมสร้างอาชีพ หรือสามารถทำเป็นหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ได้ กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนตามจังหวัดต่างๆ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

1.4.3 บริการความรู้แก่ภาคธุรกิจ คือ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปให้บริการความรู้แก่ภาคธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด กลุ่มเป้าหมาย คือ บริษัทหรือภาคเอกชนต่างๆที่สนใจ

1.4.4 นำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ คือ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์และขยายการตลาดในเชิงการค้าที่ใหญ่ขึ้น กลุ่มเป้าหมายคือ บริษัท หรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจ

1.4.5 เป็นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างรายได้หรืออาชีพ กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มประชาชนที่ด้อยโอกาสและผู้ว่างงาน

บทที่ 2

การตรวจเอกสาร

2.1 ข้าวกล้องงอก



ข้าวกล้องงอก (germinated brown rice หรือ “GABA-rice”) ถือเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก ข้าวกล้องงอก (germinated brown rice) เป็นการนำข้าวกล้องมาผ่านกระบวนการงอก ซึ่งโดยปกติแล้ว ในตัวข้าวกล้องเองประกอบด้วยสารอาหารจำนวนมาก เช่น โยอาหาร กรดไฟติก (Phytic acid) วิตามินซี วิตามินอี และ GABA (gamma aminobutyric acid) ซึ่งช่วยป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน และช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัว เป็นต้น เมื่อนำข้าวกล้องมาแช่น้ำเพื่อทำให้งอก จะทำให้ข้าวกล้องมีสารอาหาร โดยเฉพาะ GABA เพิ่มขึ้น ซึ่งนอกจากจะได้ประโยชน์จากการที่มีปริมาณสารอาหารที่สูงขึ้นแล้วยังทำให้ข้าวกล้องงอกที่หุงสุกมีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่ม รับประทานได้ง่ายกว่าข้าวกล้องธรรมดาอีกด้วย จึงง่ายแก่การหุงรับประทานได้โดยไม่ต้องผสมกับข้าวขาวตามความนิยมของผู้บริโภค

จากการศึกษาทางกายภาพและทางชีวเคมีพบว่า "เมล็ดข้าว" ประกอบด้วย เปลือกหุ้มเมล็ด หรือ แกลบ (Hull หรือ Husk) ซึ่งจะหุ้มข้าวกล้อง ในเมล็ดข้าวกล้องประกอบด้วย จมูกข้าวหรือคัพพะ (Germ หรือ Embryo) รำข้าว (เยื่อหุ้มเมล็ด) และเมล็ดข้าวขาวหรือเมล็ดข้าวสาร (Endosperm) สารอาหารในเมล็ดข้าวประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบหลัก โดยมีโปรตีน วิตามินบี วิตามินอี และแร่ธาตุที่แยกไปอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของเมล็ดข้าว นอกจากนี้ ยังพบสารอาหารประเภท ไขมันซึ่งพบได้ในรำข้าวเป็นส่วนใหญ่ ข้าวเมื่ออยู่ในสถานะที่มีการเจริญเติบโตจะมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี การเปลี่ยนแปลง จะเริ่มขึ้น เมื่อน้ำได้แทรกเข้าไปในเมล็ดข้าว โดยจะกระตุ้นให้เอนไซม์ภายในเมล็ดข้าวเกิดการทำงาน เมื่อเมล็ดข้าวเริ่มงอก (malting) สารอาหารที่ถูกเก็บไว้ในเมล็ดข้าวก็จะถูกย่อย (oligosaccharide) และน้ำตาล

รีดิวซ์ (reducing sugar) นอกจากนี้ โปรตีนภายในเมล็ดข้าวก็จะถูกย่อยให้เกิดเป็นกรด อะมิโนและเปปไทด์ รวมทั้งยังพบการการสะสมสารเคมีสำคัญต่าง ๆ เช่น แกมมาออริซานอล (gamma-orazynol) โทโคฟีรอล (tocopherol) โทโค ไตรีนอล (tocotrienol) และโดยเฉพาะ สารแกมมาอะมิโนบิวทริกแอซิด (gamma-aminobutyric acid) หรือที่รู้จักกันว่า "สารกาบา"(GABA)

2.1.1 GABA

GABA เป็นกรดอะมิโนที่ผลิตจากกระบวนการ decarboxylation ของกรดกลูตามิก (glutamic acid) กรดนี้จะมียบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาท(neurotransmitter) ในระบบประสาทส่วนกลาง นอกจากนี้ GABA ยังถือเป็นสารสื่อประสาทประเภทสารยับยั้ง (inhibitor) โดยจะทำหน้าที่รักษาสสมดุลในสมองที่ได้รับการกระตุ้น ซึ่งช่วยทำให้สมองเกิดการผ่อนคลายและนอนหลับสบาย อีกทั้งยังทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นต่อมไร้ท่อ (anterior pituitary) ซึ่งทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโต (HGH)ทำให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อ ทำให้ กล้ามเนื้อเกิดความกระชับ และเกิดสาร lipotropic ซึ่งเป็นสารป้องกันการสะสมไขมัน

จากการศึกษาในหนู พบว่า การบริโภคข้าวกล้องงอกที่มีสาร GABA มากกว่าข้าวกล้องปกติ 15 เท่า จะสามารถป้องกันการทำลายสมอง เนื่องจาก สารเบต้าอไมลอยด์เปปไทด์ (Beta-amyloid peptide) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคสูญเสียความทรงจำ (อัลไซเมอร์) ดังนั้น จึงได้มีการนำสาร GABA มาใช้ในวงการแพทย์ เพื่อการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาทต่างๆ หลายโรค เช่น โรควิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ โรคซึมเศร้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีผลการวิจัยด้านสุขภาพกล่าวว่า ข้าวกล้องงอกที่ประกอบด้วย GABA มีผลช่วยลดความดันโลหิต ลด LDL (Low densitylipoprotein) ลดอาการอัลไซเมอร์ ลดน้ำหนัก ทำให้ผิวพรรณดี ตลอดจนใช้บำบัดโรคเกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลางได้

2.2 ขนมหวาน

ขนมหวานของไทยแต่เดิมเรียก " ข้าวหนม " " เข้าหนม " " ข้าวหนม " ล้วนเป็นคำอันเป็นที่มาของคำว่า "ขนม" ซึ่งมีผู้สันนิษฐานหลายท่านตั้งข้อสันนิษฐานไว้ เริ่มตั้งแต่คำแรก "ข้าวหนม" ที่นักภาษาศาสตร์หลายท่านบอกต่อ ๆ กันมาน่าจะมาจากคำคำนี้ เนื่องจากขนมมีอิทธิพลมาจากอินเดียที่ใช้ข้าวกับนมเป็นส่วนผสมสำคัญในการทำขนมแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ เนื่องจากนมไม่มีบทบาทสำคัญในขนมไทยเลย ขนมไทยใช้มะพร้าวหรือกะทิทำต่างหาก สำหรับ "เข้าหนม" นั้น พระราชวรพงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิญาณได้ทรงตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่า "หนม" เพี้ยนมาจาก "เข้าหนม" เนื่องจาก "หนม" นั้นแปลว่าหวาน แต่กลับไม่ปรากฏความหมายของ"ขนม" ในพจนานุกรมไทย มีเพียงบอกไว้ว่าทางเหนือเรียกขนมว่า "ข้าวหนม" แต่ถึงอย่างไรก็ไม่พบความหมายของคำว่า "หนม" ในฐานะคำที่ท้องถิ่นภาคเหนือเมื่ออยู่โดด ๆ ในพจนานุกรมเช่นกัน อีกข้อสันนิษฐานหนึ่งก็นับว่าน่าสนใจไม่น้อย คำว่า "ขนม" อาจมาจากคำในภาษาเขมร

ว่า "หนม" ที่หมายถึงอาหารที่ทำมาจากแป้ง เมื่อลองพิจารณาดูแล้วพบว่าขนมส่วนใหญ่ล้วนทำมาจากแป้ง ทั้งนี้ โดยมีน้ำตาลและกะทิเป็นส่วนผสม ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า "ขนม" เพี้ยนมาจาก "ขนม" ในภาษาเขมรก็เป็นได้ไม่ว่าขนมจะมีรากศัพท์มาจากคำใดหรือภาษาใด ขนมก็ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในสังคมไทย ด้วยฐานะของขนมไทยอย่างเต็มภาคภูมิ และคนไทยเองก็ได้ชื่อว่าเป็นชนชาติหนึ่งที่ชอบกินขนมเป็นชีวิตจิตใจหลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างขนมไทยกับคนไทยก็คือวรรณคดีมรดกสุโขทัย เรื่องไตรภูมิพระร่วง ซึ่งกล่าวถึงขนมคัมที่เป็นขนมไทยชนิดหนึ่งไว้ขนมไทยเริ่มแพร่หลายมากขึ้นในสมัยอยุธยา ดังปรากฏข้อความในจดหมายเหตุหลายฉบับ บางฉบับกล่าวถึง "ย่านป่าขนม" หรือตลาดขนม บางฉบับกล่าวถึง "บ้านหม้อ" ที่มีการปั้นหม้อ และรวมไปถึงกระทะ ขนมเบื้อง เต่าและรังขนมครก แสดงให้เห็นว่าขนมครกและขนมเบื้องนั้น คงจะแพร่หลายมากจนถึงขนาดมีการปั้นเต่าและกระทะขาย บางฉบับกล่าวถึงขนมชะมด ขนมกงเกวียนหรือขนมกง ขนมครก ขนมเบื้อง ขนมลอดช่อง จนถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อันถือได้ว่าเป็นยุคทองของการทำขนมไทย ดังที่จดหมายเหตุฝรั่งเศสโบราณได้มีการบันทึกไว้ว่า การทำขนมในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นเจริญรุ่งเรืองมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชาวโปรตุเกสอย่างท่านผู้หญิงวิชาเอนทร์หรือบรรดาศักดิ์ว่า ท้าวทองกิบม้า ผู้เป็นต้นเครื่องขนมหรือของหวานในวัง ได้สอนให้สาวชาววังทำของหวานต่าง ๆ โดยเฉพาะได้นำไข่ขาวและไข่แดงมาเป็นส่วนผสมสำคัญอย่างที่ทำโปรตุเกสทำกัน ขนมที่ท่านท้าวทองกิบม้าทำขึ้นและยังเป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบันก็ได้แก่ ขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมหม้อแกว และรวมไปถึง ขนมทองโปร่ง ขนมทองพลุ ขนมสำปันนี ขนมไข่เต่า ฯลฯ ล่วงจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี ผู้ทรงเป็นพระเจ้าน้องยาเธอในสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กล่าวไว้ว่าในงานสมโภชพระแก้วมรกตและฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้มีเครื่องตั้งสำหรับหวานสำหรับพระสงฆ์ ๒,๐๐๐ รูป ประกอบด้วย ขนมไส้ไก่ ขนมฝอย ข้าวเหนียวแก้ว ขนมผิง กล้วยฉาบ ลำเตี้ย หุ้ม สังขยา ฝอยทอง และขนมตะไล ในกาพย์ห่อโคลงเห่เรือชมเครื่องคาวหวาน บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้กล่าวชมเครื่องหวานหรือขนมไทยหลายชนิดด้วยกัน อาทิ ข้าวเหนียวสังขยา ขนมลำเจียก ขนมทองหยิบ ขนมทองหยอด ขนมผิง ขนมรังไร ขนมขอม่วง ขนมบัวลอย ฯลฯ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการพิมพ์ตำราอาหารออกเผยแพร่ การทำขนมไทยก็เป็นหนึ่งในตำราอาหารไทยนั้น จึงนับได้ว่าการทำขนมไทยและวัฒนธรรมขนมไทย เริ่มมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างมีระบบระเบียบในสมัยรัชกาลที่ ๕ นี้เอง แม้ครัวหัวป่าก์เป็นตำราอาหารไทยเล่มแรก ประพันธ์โดยท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ในตำราอาหารไทยเล่มนี้ปรากฏรายการสำหรับของหวานเลี้ยงพระอันประกอบด้วย ขนมทองหยิบ ขนมฝอยทอง ขนมหม้อแกว ขนมหั่นตรา ขนมถ้วยฟู ข้าวเหนียวแก้ว ขนมลิ่มกลืน วนัผลมะปราง ฯลฯ แสดงให้เห็นว่าคนไทยนิยมทำขนมใช้ในงานบุญ ซึ่งก็เป็นแบบแผนต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา

2.3 ขนมหั้วลอย

"บัลลอย" เป็นขนมไทยที่คงไม่มีคนไทยคนไหนที่ยังไม่เคยทาน แป้ง กะทิ น้ำตาล 3 ส่วนประกอบหลักของขนมไทยแบบดั้งเดิม ไม่ว่าจะผ่านไปนานขนาดไหน บัลลอยก็ยังคงประกอบด้วย 3 ส่วนประกอบนี้ บัลลอยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนั้น ผมยังสืบหาไม่ได้แน่ชัด แต่ในกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน (พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒) บรรยายถึงบัลลอยไว้ว่า

“รังไรโรยด้วยแป้ง	เหมือนนกแก้งทำรังรวง
ไอ้อกนกทั้งปวง	ยังยินดีด้วยมีรัง
ทองหยอดทอดสนิท	ทองม้วนมิดคิดความหลัง
สองปีสองปีคั้ง	แต่ลำพังสองต่อสอง
งามจริงงามกุญ	ใส่ชื่อคุณงามกุญทอง
เรียนร่ำค่านึงปอง	สอ้าน้องนั้นเคยล
บัลลอยเล่ห์บัวงาม	คิดบัวงามแก้วกับตน
ปลั่งเปล่งเคร่งขร	สถนุชจุประทุม"

2.4 เต้าฮวย

เต้าฮวยนมสด เป็นอาหารหวานที่ดัดแปลงมาจากเต้าฮวยที่รับประทานร่วมกับน้ำจืด แต่เต้าฮวยไม่เป็นที่นิยมของเด็กรุ่นใหม่ เนื่องจากมีกลิ่นและรสของจึง เต้าฮวยแบบดั้งเดิมที่เรารู้จักกันนั้นทำมาจากน้ำนมถั่วเหลืองล้วนๆ ซึ่งบางคนอาจไม่ชอบกลิ่นของน้ำนมถั่วเหลืองมากนักจึงมีการนำนมสดมาใช้แทน และยังทำให้รสชาติดีขึ้นด้วย เต้าฮวยนมสดจึงเป็นที่นิยมมากกว่า โดยเต้าฮวยนมสดนั้นมีลักษณะคล้ายกับเต้าหู้จึงถูกเรียกติดปากว่า “เต้าหู้นมสด” แต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นเต้าหู้ แต่เป็นนมสดผสมกับนมข้นแล้วนำไปต้มกับผงวุ้น หรือเจลาติน และมีการใช้แป้งมาเป็นสารช่วยในการทรงตัว จึงทำให้มีลักษณะคล้ายกับเต้าหู้ (นิรนาม', มปก.) เต้าฮวยนมสดได้มีการนำสูตรมาพัฒนาอย่างหลากหลายจนเป็นที่นิยมของผู้บริโภคสามารถรับประทานได้ทุกโอกาส และเหมาะกับทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุกันมาจนถึงปัจจุบัน

เต้าหู้นมสด หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม วุ้นหรือเจลาตินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมกัน และน้ำตาลหรืออาจเติมส่วนประกอบอื่นเพื่อปรุงแต่งกลิ่นรส เช่น กาแฟ วานิลลา ชาเขียว และอาจเติมส่วนประกอบอื่น เช่น ผัก ผลไม้ ธัญพืช บรรจุในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง ปิดสนิท และสามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกภายนอกได้ และควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2547) เต้าหู้นมสดมีอายุการเก็บค่อนข้างสั้น ในการยืดอายุการเก็บตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอนุญาตให้สามารถใช้วัตถุกันเสีย โดยให้ใช้ตามชนิดและปริมาณที่กฎหมายกำหนด แต่การใช้วัตถุกันเสียนี้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ในด้านความปลอดภัย

การศึกษาการยืดอายุการเก็บเต้าหู้นมสดให้นานขึ้นด้วยการใช้โคโคซานซึ่งได้จากสารสกัดธรรมชาติเป็นสารกันเสียซึ่งมีรายงานในด้านความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ

2.5 ลอดช่อง

ลอดช่อง.. เป็นขนมไทยแท้โบราณชนิดดั้งเดิม ขนมที่มีกินกันทั่ว ทุกท้องถิ่นแผ่นดินสยาม มักจะนิยมที่จะทำในงานมงคลต่างๆ เช่น งานแต่งงาน เป็นต้น ซึ่งตามหลักโบราณนั้น ขนมลอดช่องจะเสิร์ฟพร้อมกับขนมอีกสามอย่าง ที่ตามประเพณีเรียกว่า **กินสี่ถ้วย** คือการทำขนมสี่อย่าง ได้แก่ **ไข่กบ นกปล่อย บัวลอย อ้ายต้อ** โดยขนมแต่ละอย่างจะมีความหมายต่างกันไป ซึ่งแต่ก่อนมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า **นกปล่อย** โดยชื่อขนมลอดช่องนี้ มาจากขั้นตอนในการทำขนม คือขั้นตอนการกดแป้งให้ออกจากพิมพ์ เพราะลักษณะเฉพาะของตัวลอดช่องรีออกมา คล้ายกับมูลหรือจิ้งกที่ปล่อยถ่าย มีลักษณะเป็นเส้นๆ ยาวประมาณ 2.0 - 2.5 นิ้ว หรืออ้วนๆ สั้นๆ ขึ้นอยู่กับตัวพิมพ์ที่ใช้ในการกดแป้ง ขนมลอดช่อง แต่ผมจะพูดถึงเฉพาะขนมลอดช่อง ซึ่งมีความหมายว่า ให้คู่บ่าวสาวมีความรักยืนยาว เมื่อมีอุปสรรคใดๆ ก็ให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดี ขนมลอดช่องที่อร่อยนั้น ตัวลอดช่องจะต้องมีลักษณะเหนียว หนึบ หอมใบเตย และมีกลิ่นน้ำตาลใส ส่วนน้ำกะทิต้องคั้นจากมะพร้าวสดๆ และใช้น้ำน้อยในการคั้น ก็จะได้หัวกะทิที่สด มัน และหอม ส่วนน้ำตาลนั้นเราสามารถใช้น้ำตาลมะพร้าว หรือน้ำตาลปี๊บ ก็ได้ เคล็ดลับในการทำขนมลอดช่องนั้น มีอยู่สองอย่าง คือตัวแป้งต้องกวนให้สุก และเวลากดเป็นเส้นตัวแป้งต้องร้อน อย่าทิ้งให้แป้งเย็น น้ำกะทิให้ใช้มือละลายน้ำตาลให้เข้ากัน และไม่ต้องตั้งไฟและมาเรียกกันว่า ลอดช่อง เมื่อใดไม่มีมันทักไว้ในสมุดข่อย การทำลอดช่องยังมีการผลิตโดยใช้ข้าวเจ้าผสมกับสีสมุนไพรที่ได้จากธรรมชาติในท้องถิ่น ถือว่าปลอดภัยแต่ก็มีปัญหาเนื่องจากขั้นตอนการผลิตที่ไม่สะอาดพอ อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศเมืองร้อน อาจเป็นสาเหตุทำให้ลอดช่องไม่สามารถเก็บไว้ได้ นาน...เกิดการเน่าเสียเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป จากภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกับ กลุ่มผู้ผลิตลอดช่องชุมชน ชาวหนองกระดิ่ง ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอกีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย พัฒนาคุณภาพลอดช่องเป็นอาหาร ที่มีความสะอาด ปลอดภัย สร้างเอกลักษณ์และมีคุณค่า ทางโภชนาการจากสมุนไพรให้แตกต่างจากลอดช่องทั่วไป ลอดช่องสมุนไพรมีวัตถุดิบที่ใช้ประกอบด้วย ข้าวเจ้า, น้ำ, น้ำปูนใส, น้ำสมุนไพร เช่น น้ำใบเตย, น้ำฝรั่ง, น้ำมะตูม และน้ำดอกคำฝอย อุปกรณ์ที่ต้องใช้หม้อ, กะละมัง, ไม้พาย, ตัวกดลอดช่องและเตา ส่วนขั้นตอนการทำ ขั้นตอนแรกนำข้าวไปแช่น้ำและหมักจนข้าวยุ่ย จากนั้นนำไปผึ่งแดดให้แห้ง ขั้นตอนที่สอง นำสมุนไพรต่างๆ แช่น้ำปูนใส ใช้ไม้พายคนให้ทั่วเพื่อสกัดสีและตัวยาจากนั้นนำมากรอง ด้วยผ้าขาวบางจะได้น้ำสมุนไพรสีต่างๆ และขั้นตอนสุดท้ายคือ การทำตัวลอดช่อง นำข้าวหมักที่แห้งนวดกับน้ำ ก่อนนำไปผสมกับน้ำสมุนไพร เพื่อทำเป็นน้ำแป้ง และกรองผ่านผ้าขาวบาง ให้นำน้ำแป้งที่ได้ไปตั้งไฟปานกลาง กวนด้วยไม้พายจนแป้งสุก ขึ้นมันวาวและเหนียวได้ที่ จึงเทแป้งผ่านตัวกดลอดช่อง ลงสู่ถ้วยที่รองอยู่ด้านล่าง เท่านั้น

จะได้ลดช่องสมุนไพรมีสีสันสวยงามตามสีสมุนไพรมี โดยสีเขียวเกิดจากสมุนไพรมีใบเตย สีชมพูได้จากสีของไม้ฝาง สีส้มที่เกิดจากสีมะตูม สีเหลืองได้จากดอกคำฝอย ที่สำคัญการผลิตอาหารที่ดี ต้องใช้วัตถุดิบที่เป็นข้าวเจ้าท่อนปลอดสารพิษ น้ำสมุนไพรมีที่ไม่มีการใช้สารเคมีและอุปกรณ์การผลิตที่สะอาด เป็นปัจจัยหลักที่สามารถดึงดูดใจผู้บริโภคเป็นครัวของโลกตามนโยบายของรัฐฯ อีกทั้งยังมีสรรพคุณทางยาช่วยบำรุงหัวใจทำให้ชุ่มชื้น บำรุงโลหิต แก้ท้องร่วง-ท้องเสีย บำรุง

2.6 แป้งข้าวเหนียว

แป้งข้าวเหนียว (Glutinous rice flour) ได้จากข้าวสารเหนียว แป้งข้าวเหนียวที่สุกจะข้นเหนียวแต่ไม่ใส (อบเชย และขนิษฐา, 2547)

แป้งข้าวเหนียวถือเป็นหัวใจหลักในการทำขนมบัวลอย ข้าวเหนียวที่คั้นนั้น ต้องเป็นข้าวเหนียวใหม่ที่มีกลิ่นหอม แต่โบราณจะใช้ข้าวเหนียวใหม่แช่น้ำไว้ 1 คืน ก่อนนำมาโม่พร้อมกับน้ำอีกเล็กน้อย เพื่อให้ได้น้ำแป้งข้นๆ จึงกรองเอาน้ำออกด้วยผ้าขาวบางที่พับซ้อนหลายชั้น บีदनน้ำออกหมดเหลือแต่เนื้อแป้งจึงนำมาใช้ (ณัฐพงศ์, 2549)

2.6.1 ส่วนประกอบของแป้ง

อบเชย และขนิษฐา (2547) ได้กล่าวของส่วนประกอบของแป้งว่า แป้งเป็นโมเลกุลใหญ่จัดอยู่ในพวกของน้ำตาลหลายชั้น ประกอบด้วยกลูโคสหลายหน่วยมาเชื่อมต่อกันเป็นสายยาวแบ่งชนิดของโมเลกุลตามลักษณะการเชื่อมโยงของกลูโคสเป็น 2 ชนิด

2.6.1.1 อะมิโลส (amylose) ประกอบด้วยกลูโคสเกาะกันเป็นเส้นเดี่ยว จะมีลักษณะเป็นวุ้นเหมือนแป้งสุก

2.6.1.2 อะมิโลเพคติน (amylopectin) ประกอบด้วยกลูโคสเกาะกันเป็นแขนง เมื่อแป้งสุกจะมีลักษณะเหนียวเกาะกันแน่นแต่ไม่เป็นวุ้น

ข้าวเหนียวตามลักษณะส่วนประกอบทางเคมี มีอะมิโลสเป็นส่วนประกอบทางเคมีประมาณร้อยละ 0-2 จึงทำให้ข้าวเหนียวเมื่อนึ่งสุกจะนุ่มและเกาะตัวกันเป็นก้อนป็นได้


ตารางที่ 2.1 ความแตกต่างระหว่างอะมิโลส และอะมิโลเพคติน

อะมิโลส	อะมิโลเพคติน
1. ละลายน้ำได้ดีกว่า	1. ละลายน้ำได้น้อยกว่า
2. เมื่อต้มในน้ำหนืดขึ้นน้อยกว่าแต่ข้นกว่า	2. หนืดขึ้นมากกว่าและใส
3. ให้สีน้ำเงินแก่กับไอโอดีน	3. ให้สีแดงม่วงและสีน้ำตาล
4. ประกอบด้วยโมเลกุลที่ต่อกันเป็นเส้นตรง	4. โมเลกุลต่อกันคล้ายกิ่งไม้
5. ประกอบด้วยกลูโคส 200-2,100 หน่วย	5. แต่ละกิ่งมีกลูโคส 20-25 หน่วย
6. ต้มแล้วทิ้งไว้จับเป็นวุ้น	6. ไม่จับตัวเป็นวุ้น

ที่มา: เข็มทอง, 2538


2.6.2 การเกิดเจลาตินในเซชัน(Gelatinization)

การเกิดเจลาตินในซ์ คือ การที่เม็ดแป้ง (starch granule) ดูดน้ำและพองตัว เนื่องจากความร้อนหรือสารเคมี จนการพองตัวและความหนืดเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุด ซึ่งไม่สามารถคืนสภาพได้



ภาพที่ 2.1 อุณหภูมิที่แป้งเกิดการเจลาตินในซ์เรียกว่า gelatinization temperature หรือ pasting temperature

การเจลาตินในซ์ เป็นการสุกของแป้ง ซึ่งเกิดจากการให้ความร้อนอาหารที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบ เกิดในการให้อาหารสุกด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การต้ม การนึ่ง การทอด การอบ การทำให้สุกด้วยเอกซ์ทรูเดอร์ ไมโครเวฟ เป็นต้น



ภาพที่ 2.2 Relational Words: Rapid visco amylograph, retrogradation

ที่มา: Food Network Solution (มปป.)


โมเลกุลของแป้งประกอบด้วยหมู่ที่ชอบน้ำอยู่ ดังนั้นมันจึงสามารถรับน้ำเข้าไปในโมเลกุลได้ตามสัดส่วนของความชื้นสัมพัทธ์ของบรรยากาศ ซึ่งภายใต้สภาวะปกติแป้งจะมีปริมาณความชื้นร้อยละ 12-14 แต่เมื่อเติมน้ำลงไปน้ำจะซึมผ่านเข้าไปในเม็ดแป้งโดยไม่รบกวนอนุภาคของเม็ดแป้ง และปริมาณน้ำที่เม็ดแป้งรับได้สูงสุดคือ ปริมาณร้อยละ 30 การพองตัวของเม็ดแป้งนี้จะไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของโมเลกุล จนกระทั่งของผสมนั้นได้รับความร้อนสูงพอที่จะทำให้ลายพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล จากนั้นเม็ดแป้งจึงจะแสดงการเปลี่ยนแปลงของลักษณะปรากฏให้เห็นอนุภาคน้ำที่เม็ดแป้งเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส เรียกว่าช่วงอุณหภูมิการเกิดเจลาคีไนซ์ ช่วงนี้เม็ดแป้งยังคงมีสภาพอยู่ได้โดยไม่แตกออก แต่ถ้าอุณหภูมิสูงถึง 100 องศาเซลเซียส หรือมีการกวนอย่างรุนแรงจนเม็ดแป้งแตกออก โมเลกุลของแป้งก็จะรวมเข้ากับตัวกลางที่ล้อมรอบอยู่ทำให้เกิดลักษณะของเหลวข้นของแป้ง (Starch Paste) (ตารางที่ 2.2)

ตารางที่ 2.2 อุณหภูมิการเกิดเจลในไส้ของแป้งชนิดต่างๆ

ชนิดแป้ง	ปริมาณโมลอส (ร้อยละ)	อุณหภูมิการเกิดเจลในไส้ (°C)
ข้าวสาลี	26	43-65
ข้าวบาเลย์	22	56-62
ข้าวโพด	28	62-70
ข้าวโอ๊ต	27	56-62
ข้าวเจ้า	18	61-78
ข้าวเหนียว	1	55-65
ข้าวฟ่าง	25	69-75
มันฝรั่ง	23	58-66


ที่มา : คัดแปลงจาก Hadziyev (1987)

การเกิดเจล เมื่อตั้งส่วนผสมของแป้งซึ่งเป็นของเหลวข้นไว้ โดยปราศจากการรบกวน จะทำให้เกิดพันธะระหว่างโมเลกุลของแป้ง และสร้างร่างแหสามมิติขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโมเลกุลของอมัยโลส ซึ่งโมเลกุลเหล่านี้จะมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลผ่านพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของน้ำ ไกลโคเจน ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรต และโครงสร้างมีสาขามากจะไม่เกิดเจล ส่วนโมเลกุลของอะไมโลเพคตินจะเกิดพันธะระหว่างโมเลกุลได้ยาก ยกเว้นเมื่อแป้งมีความเข้มข้นร้อยละ 30 จึงจะทำให้โมเลกุลซึ่งมีสาขาของอมัยโลสเพคตินนั้นรวมยึดเข้าด้วยกันได้ แต่แป้งโดยทั่วไปมีอมัยโลสเป็นส่วนประกอบอยู่ ก็จะสามารถเกิดเจลได้ดีแม้จะมีอมัยโลสที่ความเข้มข้นต่ำ (อัญชลินทร์ และผศ.ทศพร, มปป.)



การเกิดรีโทรเกรเดชัน (Retrogradation) สามารถเกิดได้ทั้งในเจลและสารแขวนลอยซึ่งจะมีความเข้มข้นสูง เมื่อถูกทำให้เย็นอย่างรวดเร็วจะเกิดการรวมกลุ่มของโมเลกุลแป้งที่แน่นมากขึ้น เกิดเป็นผลึกเล็กๆ และตกตะกอนทำให้สมบัติของเจลเปลี่ยนแปลงไป โดยปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลต่อการเกิดรีโทรเกร

เดชนั้ก็อูนหภูมิกับขนาดและรูปร่างโมเลกุลของแป้ง ซึ่งอูนหภูมิที่เกดรีโทรเกรเดชนั้ได้เร็วมากที่สดุจะอยู่ช่วง 0 องศาเซลเซียส



ที่มา: <http://gumunbah.pbworks.com/w/page/8665289/7> (มปป.)

2.6.3 การเลือกซื้อแป้งข้าวเหนียว

ในปัจจุบันที่เครื่องจักรผลิตแป้งผงสำเร็จให้ใช้ได้อย่างสะดวกสบาย จึงจำเป็นต้องระวังในการเลือกซื้อ เพราะอาจได้แป้งที่เก่าจะทำให้แป้งมีกลิ่นเหม็นอับ ทำให้ขนมมีกลิ่นไม่น่ารับประทาน การเลือกซื้อแป้งจำเป็นต้องดูวัน เดือน ปีที่ผลิต การบรรจุหีบห่อที่มิดชิด แป้งที่ใหม่เมื่อดมจะไม่มิกลิ่นอับ และต้องไม่มีไขแมลงหรือตัวมอด (ณัฐพงศ์, 2549)

2.7 แป้งข้าวเจ้า

แป้งข้าวเจ้าเป็นแป้งที่ทำมาจากเมล็ดข้าวเจ้า มีสีขาว เนื้อละเอียดจับดูแล้วสากมือเล็กน้อย ถูกับน้ำแล้วจะแข็งตัว เมื่อทำให้สุกจะมีสีขาวขุ่นและมีกลิ่นหอม ถ้าทิ้งให้เย็นจะอยู่ตัวเป็นก้อน ร่วน ไม่เหนียว จึงเหมาะที่ใช้ในการประกอบอาหารที่ต้องการความอยู่ตัว ร่วน ไม่เหนียวเหนียว เช่น ใช้ทำขนมกล้วย ขนมจีบ หนุ่ย เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นขนมจีน เป็นต้น (ศรีนวล, 2535)

2.7.1 ชนิดของแป้งข้าวเจ้า มีอยู่ 3 ชนิด

1. แป้งเก่า เป็นแป้งที่ทำจากข้าวค้างปี มีคุณสมบัติที่ดูน้ำได้ดี เหมาะที่จะทำขนมที่ใช้เนื้อเป็นส่วนผสม เช่น ขนมเค้ก คุกกี้ ขนมพาย เป็นต้น
2. แป้งใหม่ เป็นแป้งที่ทำจากข้าวใหม่ แป้งชนิดนี้จะดูน้ำได้น้อย เพราะจะมีความชื้นในตัว เหมาะที่จะขนมได้หลายประเภท
3. แป้งสด เป็นแป้งที่โม่ทับน้ำ เหมาะที่จะทำขนม ที่ดูน้ำมาก ถ้าใช้แป้งสดจะทำให้ขนมแน่น ไม่แห้ง เช่น คุกกี้ คุกกี้

2.7.2 คุณสมบัติของแป้งข้าวเจ้า

แป้งข้าวเจ้าเมื่อทำให้สุกโดยวิธีกวน เมื่อเย็นแล้วจะแข็ง วิธีการทำให้แห้ง คือ ใส่น้ำมันพืชลงไปนวด น้อยในส่วนผสมของแป้งแล้วจึงกวน (มณฑิร, 2541) แป้งข้าวเจ้าสามารถจัดตามปริมาณอะไมโลส ได้ เป็น ข้าวเจ้าอะไมโลสต่ำร้อยละ 12-27 ข้าวเจ้าอะไมโลสปานกลางร้อยละ 20-25 และข้าวอะไมโลสสูงมีมากกว่าร้อยละ 27 ถึงแม้จะเป็นข้าวพันธุ์เดียวกัน ความแตกต่างของปริมาณอะไมโลส อาจอยู่ในช่วงร้อยละ 4-5 ตามแหล่งที่ปลูก ข้าวไทยมีปริมาณอะไมโลสตั้งแต่ต่ำจนถึงสูงอัตราส่วนขององค์ประกอบอะไมโลสและอะไมโลเพกตินแตกต่างกันตามชนิดของพันธุ์ข้าว

แป้งข้าวเจ้ามีลักษณะเป็นเกล็ดเล็กๆ เหลี่ยมบ้างกลมบ้าง ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเมล็ดข้าว ประกอบไปด้วย ส่วนประกอบย่อย 2 ส่วน คือ อะไมโลสและอะไมโลเพกติน อะไมโลส คือ โมเลกุลที่ประกอบขึ้นจากหน่วยกลูโคสที่มีโครงสร้างแบบเส้นตรง ในขณะที่อะไมโลเพกตินประกอบด้วยหน่วยกลูโคสเช่นกัน แต่มีโครงสร้างแบบแยกเป็นกิ่งก้าน (ศรีนวล, 2535) ได้ระบุถึงคุณสมบัติของแป้งไว้ดังนี้

1. แป้งกระจายตัวได้ดีในน้ำเย็น เนื่องจากเป็นผงละเอียด เมื่อนำผสมกับน้ำเย็นจะไม่ละลายน้ำ แต่จะกระจายในน้ำเย็นทำให้น้ำขุ่น ซึ่งจะใช้ในการเตรียมแป้งเพื่อผสมในอาหารที่เป็นของเหลว ร้อนไม่ให้แป้งเกาะเป็นก้อน การที่แป้งไม่ละลายในน้ำเย็นยังเป็นผลดีต่อกระบวนการผลิตคือ ให้ได้แป้งที่สะอาดบริสุทธิ์
2. แป้งช่วยป้องกันความชื้นไม่ให้สัมผัสอาหาร โดยใช้แป้งนวดในการทำขนมปัง ใช้เคลือบผิวอาหารในการทำมาเฟ่น ลูกกวาดต่างๆ ใช้เป็นตัวป้องกันอาหารจับเป็นก้อน ทำให้อาหารเก็บได้นาน เช่นการใช้แป้งข้าวโพดผสมในน้ำตาลปั้น (icing sugar) ป้องกันน้ำตาลจับเป็นก้อน
3. แป้งช่วยให้อาหารมีความเข้มข้น หนืด หรือเหนียว การใช้แป้งข้าวโพด แป้งสาลีทำให้น้ำของอาหารมีความเข้มข้น ไม่ก้นตัวง่ายเช่น ซุปน้ำข้นกระเพาะปลา เป็นต้น ส่วนแป้งข้าวเหนียว แป้งมันสำปะหลัง จะทำให้อาหารข้นเหนียวหนืด เช่น เต้าส่วน ราดหน้า เป็นต้น
4. แป้งช่วยให้อาหารมีเนื้อนุ่มหรือเหนียว ขึ้นอยู่กับชนิดของแป้ง ส่วนผสมและวิธีการประกอบอาหารมีดังนี้

- อาหารที่มีลักษณะนุ่มร่วน จะใช้แป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี เช่น ขนมผักกาด ขนมถ้วย ตะไล นอกจากนี้การใช้น้ำมันผสมในแป้งคลุกเคล้าให้เข้ากันจะได้อาหารลักษณะนุ่มร่วน เช่น ขนมกลีบลำดวน

- อาหารที่มีลักษณะเหนียว เช่น ขนมชั้น กะละแม ขนมเหนียว หรือใช้แป้งข้าวเจ้า แทนก็ได้ แต่ต้องพยายามนวดหรือกวนนานๆ เพื่อให้เม็ดข้าวแตกตัวมากที่สุด

5. แป้งช่วยให้อาหารมีลักษณะอยู่ตัว เมื่อนำแป้งไปผสมกับน้ำแล้วผ่านความร้อนจะได้อาหารที่อยู่ตัวมีลักษณะเหนียว เช่น กวยเตี๋ยว วุ้นเส้น จะได้อาหารลักษณะกรอบแข็ง เช่น ขนมกรอบเค็ม ปาท่องโก๋ เป็นต้น

2.7.3 กรรมวิธีการผลิตแป้งข้าวเจ้า

การบดหรือการโม่แป้งข้าวเจ้าในประเทศไทยแบ่งออกเป็นกรรมวิธีได้ 3 วิธี คือ

1. วิธีการโม่แห้ง เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการผลิตแป้ง เพราะเพียงแต่ป้อนวัตถุดิบเข้าเครื่องบดหรือเครื่องโม่เท่านั้นก็จะได้แป้งออกมา แต่แป้งที่ได้จากกรรมวิธีนี้มาคุณภาพต่ำ เพราะมีความสะอาดไม่เพียงพอ เม็ดแป้งค่อนข้างหยาบ ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน

2. วิธีการโม่ น้ำ วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด คือ นำวัตถุดิบมาทำความสะอาดโดยใช้เครื่องจักรก่อนที่จะนำไปล้างน้ำและแช่ให้นิ่ม เพื่อง่ายต่อการโม่เป็นน้ำแป้ง ต่อจากนั้นน้ำแป้งก็จะถูกแยกน้ำออกก่อนที่จะถูกบดแห้งด้วยลมร้อนต่อไป แป้งที่ได้กรรมวิธีนี้จะมีคุณภาพดีและสามารถเก็บไว้ได้นาน เหมาะแก่การทำขนมชนิดต่างๆ ได้ดีทั้งนี้เนื่องจากแป้งชนิดนี้มีความละเอียดและมีคุณภาพสม่ำเสมอ ไม่มีกลิ่นเหม็นสาบหรือเหม็นหืน

2.7.4 องค์ประกอบทางเคมีของแป้ง

แป้งประกอบด้วนคาร์บอนร้อยละ 44.40 ไฮโดรเจนร้อยละ 6.20 และออกซิเจนร้อยละ 49.40 ของน้ำหนักโมเลกุลโดยส่วนใหญ่ อยู่ในรูป 2-0-glucose นอกจากนี้จะเป็นโปรตีนและไขมัน Pentosan และคุณค่าทางโภชนาการของแป้งข้าวเจ้า 100 กรัม ประกอบด้วย ความชื้น 11.8 กรัมคาร์โบไฮเดรต 80.4 กรัม โปรตีน 6.4 กรัม ไขมัน 0.8 กรัม เส้นใย 0.3 กรัม และพลังงาน 365 กิโลแคลอรี (กองโภชนาการ กรมอนามัย, 2530)

2.7.5 อุณหภูมิแป้งสุก

เมื่อเพิ่มอุณหภูมิของน้ำแป้งให้สูงขึ้น แรงที่เกาะกันระหว่างโมเลกุลของแป้งจะอ่อนตัวลง เม็ดแป้งจะดูดน้ำมากขึ้น และเม็ดแป้งสูญเสียระเบียบการจัดตัวภายใน อุณหภูมินี้เรียกว่า “อุณหภูมิแป้งสุก” และปรากฏเช่นนี้เรียกว่า “การสุกของแป้ง” (gelatization) (ณรงค์และอัญชนีย์, 2528) ทำให้แป้งกลายเป็นเจลและเปลี่ยนแปลงลักษณะทึบแสงเป็นโปร่งแสงได้แบ่งอุณหภูมิแป้งข้าวสุกเป็น 3 ประเภทดังนี้

ตารางที่ 2.3 อุณหภูมิแป้งข้าวสาลีเป็น 3 ประเภท

อุณหภูมิแป้งสาลี (องศาเซลเซียส)	ประเภทอุณหภูมิแป้งสาลี
ต่ำกว่า 70	ต่ำ
70 - 75	ปานกลาง
มากกว่า 75	สูง

(งามชื่น, 2532) ได้ศึกษาคุณภาพข้าวและข้าวสาลี รายงานว่า ข้าวเหนียวที่มีคุณภาพดีควรมีอุณหภูมิแป้งสาลีต่ำ เมื่อหุงต้มแล้วจะได้ข้าวสาลีที่อ่อนนุ่ม ในทำนองเดียวกันข้าวอะไมโลสต่ำควรมีอุณหภูมิแป้งสาลีต่ำ เนื่องจากในระหว่างการต้ม เมล็ดข้าวจะดูดน้ำเข้าไปด้วยทำให้ความชื้นในเมล็ดสูงขึ้นหากข้าวอะไมโลสต่ำ อุณหภูมิแป้งสาลีปานกลางหรือสูงทำให้ข้าวสาลีมีลักษณะและ สำหรับข้าวอะไมโลสปานกลางหรือสูงจะไม่เกิดปัญหาดังกล่าว

2.8 น้ำตาล

2.8.1 น้ำตาล

น้ำตาล คือ สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่มีรสหวาน ให้พลังงานกับร่างกาย น้ำตาลสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ น้ำตาลชั้นเดียว (monosaccharide) เช่น กลูโคส ฟรุคโทส เป็นต้น น้ำตาลสองชั้น (disaccharide) เช่น น้ำตาลทรายหรือซูโครส (sucrose) ที่ประกอบด้วยน้ำตาลกลูโคสกับน้ำตาลฟรุคโทส และน้ำตาลหลายชั้น (oligosaccharide) คือน้ำตาลที่ประกอบด้วยสายกลูโคสที่มีขนาดความยาวอยู่ในช่วง 2-10 โมเลกุล (อบเชย, 2544) วัตถุดิบที่ใช้ผลิตน้ำตาลได้แก่ อ้อย, เมเปิ้ล, ปาล์มชนิดต่าง ๆ และบีทรูท น้ำตาลที่ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่ทำจากอ้อย น้ำตาลที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมลูกกวาดและขนมหวาน ได้แก่ น้ำตาลทราย ประกอบด้วย น้ำตาลอินเวอร์ต, เถ้า, ความชื้น และสารอินทรีย์ที่ไม่ใช่ซูโครส ร้อยละ 0.002, 0.002, 0.01 และ 0.001 ตามลำดับ (สิริ, 2544)

คุณสมบัติของน้ำตาลที่สำคัญมีดังนี้ (สิริ, 2544)

2.8.1.1 ความหวานน้ำตาล น้ำตาลเป็นสารให้รสหวานตามธรรมชาติ จากการเปรียบเทียบความหวาน ฟรุคโทส เป็นน้ำตาลที่หวานที่สุด รองลงมาได้แก่ ซูโครส และกลูโคส ตามลำดับ โดยทั่วไปในการปรุงอาหารนิยมน้ำตาลซูโครส หรือน้ำตาลทราย

2.8.1.2 การละลายของน้ำตาล น้ำตาลทั่วไปละลายน้ำได้ร้อยละ 30-80 ปริมาณที่ละลายขึ้นกับอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นการละลายของน้ำตาลเพิ่มขึ้น โดยน้ำตาลฟรุคโทส เป็นน้ำตาลที่ละลายน้ำได้ดีที่สุด รองลงมาคือซูโครส กลูโคส มอลโทส และแล็กโทส ตามลำดับ

2.8.1.3 การเกิดสีน้ำตาล เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี ได้แก่ เมื่อน้ำตาลได้รับความร้อนจนอุณหภูมิไม่เกิน 132 องศาเซลเซียส และมีค่า pH 5-5.5 ผลึกของซูโครสถูกไฮโดรไลซิส อย่างช้า ๆ ได้น้ำตาลกลูโคส และฟรุคโทส ถ้าวัด pH ให้ต่ำกว่า 3.5 ในขณะที่ให้ความร้อน น้ำตาลจะเกิดการไฮโดรไลซิส ร้อยละ 50 ของปริมาณทั้งหมด เมื่อได้รับความร้อนจนถึงอุณหภูมิที่สูงกว่า 150 องศาเซลเซียส ในสภาวะน้ำน้อย น้ำตาลเกิดการสูญเสียไปหนึ่งโมเลกุล เกิดน้ำตาลที่เรียกว่า น้ำตาลแอนไฮโดร (anhydro sugar) จะได้สารคาราเมลแลน (caramelan) มีรสขม สีน้ำตาล ใช้แต่งสีในชี้อ้วนดำ ชี้อ้วนหวาน และน้ำอัดลมประเภทโคล่า เรียกว่า ปฏิกิริยาการเคี้ยวไหม้ หรือ คาราเมลไลเซชัน (caramelization) นอกจากนี้การเกิดสีน้ำตาลยังเกิดจาก ปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Mallard reaction) เกิดปฏิกิริยาระหว่างสารคาร์บอนิล ($-CO$) ของน้ำตาลรีดิวซิง กับ สารประเภทอะมิโน ($-NH_2$) ของกรดอะมิโน ซึ่งปฏิกิริยาเมลลาร์ด เกิดอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิสูงกว่า 112 องศาเซลเซียส หรือที่ pH สูงกว่า 7

2.8.1.4 การดูดความชื้น และการเก็บรักษาความชื้นโดยน้ำตาลมีผลต่อเนื้อสัมผัส การดูดความชื้น น้ำตาลแต่ละประเภทมีความสามารถในการดูดความชื้นต่างกัน โดยฟรุคโทส ดูดความชื้นได้ดีมากที่สุด รองลงมาคือ กลูโคส ซูโครส มอลโทส และแล็กโทส ตามลำดับ ซึ่งมีผลต่อความนุ่ม และความชุ่มชื้นของอาหาร การเก็บรักษาความชื้น เกี่ยวข้องกับการดูดความชื้น การเก็บรักษาความชื้นหมายถึงการที่น้ำตาลสามารถยึดความชื้นไว้ไม่คายออกสู่บรรยากาศ มีประโยชน์ในการช่วยให้ขนมอบ ไม่แห้งแข็ง

2.8.2 น้ำเชื่อม

น้ำเชื่อมเป็นสารละลายชนิดเข้มข้น มีน้ำเป็นตัวทำละลาย และมีน้ำตาลเป็นตัวยึดละลายที่รวมเป็นเนื้อเดียว เนื่องจากน้ำตาลเป็นสารที่ตกผลึกได้ทำให้ความสามารถในการละลายจำกัด น้ำตาลที่มีขนาดผลึกต่างกันจะละลายได้เร็วช้าต่างกันด้วย น้ำตาลที่มีผลึกขนาดเล็กจะละลายได้เร็วกว่าน้ำตาลที่มีผลึกขนาดใหญ่ ทั้งนี้เพราะมีปริมาณพื้นผิวหน้ามากกว่า ในการละลายในน้ำ น้ำตาลจะดูดความร้อน โดยความร้อนยิ่งสูง น้ำตาลจะละลายได้มากขึ้น (ศิริลักษณ์, 2522)

คุณสมบัติของน้ำเชื่อมมีดังนี้ (ณรงค์ และอัญชนีย์, 2528; Pennington, 1990)


2.8.2.1. ความดันไอของตัวทำละลายจะลดต่ำลง แม้ว่าความดันไอรวมของสารละลายจะสูงขึ้น ในน้ำเชื่อมความดันไอจะขึ้นอยู่กับโอกาสที่โมเลกุลน้ำที่จะระเหย ไปจากผิวหน้าน้ำเชื่อมสู่บรรยากาศเหนือน้ำเชื่อมนั้น ในภาชนะปิดความดันไอนี้จะถึงขีดสูงสุด ณ อุณหภูมิหนึ่งซึ่งอัตราความเร็วในการระเหยกลายเป็นไอ และในการที่โมเลกุลของน้ำจะคืนกลับลงสู่ น้ำเชื่อม นั้นจะเท่ากัน ความดันสูงสุด ณ อุณหภูมิหนึ่งก็คือความดันไอน้ำเชื่อมที่ระเหยได้ช้ากว่า จึงมีแรงดันไอลดต่ำ

2.8.2.2 สารละลายน้ำตาลที่มีจุดเดือดเพิ่มสูงขึ้น จะมีจุดเยือกแข็งลดต่ำลง ความสัมพันธ์ของจุดเดือดกับจุดเยือกแข็งของสารละลายน้ำตาล เป็นสัดส่วนกัน หมายความว่า ที่ความดันบรรยากาศ 1 โม

ลของน้ำตาล ในน้ำ 1 กิโลกรัม จุดเดือดเพิ่มขึ้นประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส และจุดเยือกแข็งลดลง 2 องศาเซลเซียส ดังนั้นเมื่อความเข้มข้นของสารละลายน้ำตาลเพิ่มขึ้น จุดเดือดเพิ่มสูงขึ้น และ จุดเยือกแข็งลดต่ำลง เช่นน้ำเชื่อมซูโครสที่ร้อยละ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 และ 90.8 มีจุดเดือดเท่ากับ 100.4, 100.6, 101.0, 101.5, 102.5, 103.0, 106.5, 112.0 และ 130.0 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ยกเว้นว่าถ้าตัวละลายระเหยได้ง่ายกว่าตัวทำละลายจุดเดือดจะต่ำลง ในการผลิตอาหารแต่ละประเภทจะใช้จุดเดือดและความเข้มข้นของน้ำเชื่อมต่าง ๆ กัน

2.8.2.3 น้ำเชื่อมมีแรงดันออสโมติกจะสูงขึ้นมากกว่าน้ำตาลทราย โดยเมื่อสารละลายน้ำตาลทราย มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น แรงดันออสโมติกจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และเมื่ออุณหภูมิของสารละลายน้ำตาลเพิ่มขึ้น แรงดันออสโมติกเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย

2.8.2.4 การเกิดผลึกน้ำตาล มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นแรก ช่วงก่อนการเกิดนิวคลีเอชัน ซึ่งเป็นช่วงสั้น ๆ จากนั้นขั้นที่ 2 ได้แก่ การเกิดนิวคลีเอชัน (nucleation) มี 2 แบบ คือ เกิดนิวคลีเอชันได้ด้วยความเข้มข้นของน้ำตาลสูง (homogeneous nucleation) และเกิดจากสารอื่นช่วยให้เกิดนิวคลีเอ (heterogeneous nucleation) เช่น ฝุ่น ผลึกเก่า หรือการสัมผัสเทียม เป็นต้น จากภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของน้ำตาล และอุณหภูมิ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดนิวคลีเอชันโซนต่าง ๆ ได้แก่ ช่วงที่ไม่มีการตกผลึก เรียกว่า stable zone ช่วงที่ไม่สามารถเกิดนิวคลีเอชันเองได้ แต่ถ้ามีผลึกตกค้าง ผลึกสามารถโตได้ เรียกว่า metastable zone จากนั้นเป็นช่วงที่เกิดนิวคลีเอชันได้ ถ้ามีการคนสารละลาย เรียกว่า false grain zone และช่วงที่เกิดนิวคลีเอชันเองได้ เรียกว่า labile zone ขั้นที่ 3 คือการเติบโตของผลึก (crystal growth) ที่ความเข้มข้นของสารละลายสูง อุณหภูมิ และความหนืดต่ำ สารละลายสามารถเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบเกิดผลึก (crystalline) แต่ถ้าอุณหภูมิต่ำ ความหนืดสูง โมเลกุลไม่สามารถเคลื่อนที่มาจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบเพื่อเกิดเป็นผลึก สารละลายน้ำตาลเปลี่ยนไปอยู่ในสภาวะยาง (rubber) จนเมื่อลดอุณหภูมิจนถึง อุณหภูมิที่เรียกว่า glass transition temperature (Tg) สารละลายน้ำตาลเปลี่ยนไปอยู่ในสภาวะแก้ว (glass) ซึ่งเป็นสภาวะไม่เสถียร เมื่อมีปริมาณน้ำ ความชื้น และอุณหภูมิสูงระหว่างการเก็บ มีปริมาณนิวคลีเอปะปน หรือมีปริมาณสารขัดขวางการตกผลึกน้อย เช่นกลูโคสไซรัป น้ำตาลสามารถเปลี่ยนจากสภาวะอสัณฐาน เป็นผลึก เรียกว่า devitrification (สิริ, 2544)



ภาพที่ 2.3 โชน ของการตกผลึกที่ความเข้มข้นของสารละลายของน้ำตาลซูโครส และอุณหภูมิต่าง ๆ ที่บรรยากาศปกติ (ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท)
ที่มา : Hartel and Shastri (1991)

2.9 กะทิ

กะทิ คือ ส่วนที่ได้จากการคั้นมะพร้าวสด ถ้าต้องการหัวกะทิแท้ ๆ อาจบีบโดยไม่เติมน้ำหรือบางทีก็เติมน้ำเล็กน้อย แล้วแต่จะต้องการหัวกะทิชั้นเพียงใด กะทิที่คั้นจากน้ำเย็นจะเก็บไว้ได้ไม่นานก็จะมีกลิ่นบูด ถ้าคั้นด้วยน้ำร้อนหรืออุ่นน้ำกะทิให้ร้อนใกล้จะเดือดก็อาจจะเก็บกะทินั้นไว้ได้นานขึ้นเล็กน้อย กะทิถ้าต้มจะข้นขึ้น ถ้าตั้งไฟไว้นานกะทิจะแตกมัน ด้วยเหตุที่มะพร้าวสดหรือกะทิเสียง่ายจึงมีการชูดและคั้นกะทิเมื่อเวลาที่ต้องการใช้ซึ่งนับว่ายุ่งยาก ขณะนี้ได้มีการเก็บรักษากะทิโดยการระเหยน้ำออก ผ่านการต้มฆ่าเชื้อ เติมน้ำกลับแล้วบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท (พานิชย์, 2544)

2.9.1 ลักษณะทั่วไปของกะทิ

กะทิจะไดจากการคั้นมะพร้าวที่ขูดออก และอาจเติมน้ำหรือไม่เติมน้ำก็ได้ เพราะมีลักษณะเป็นอิมัลชัน ชนิดน้ำมันในน้ำ ซึ่งหมายถึงลักษณะของน้ำมันจะกระจายอยู่ในสารละลายน้ำ และถูกล้อมรอบสภาพดังกล่าวเกิดจากระบบที่มีแรงดึงระหว่างผิว ระหว่างโมเลกุลของน้ำและไขมันต่ำลง เพราะมีโปรตีนเป็นตัวลดแรงดึงระหว่างผิวกะทิมิลลชีฟายเออร์โดยธรรมชาติ ได้แก่ ฟอสโฟไลปิด ได้แก่ เลซิธิน และเซพาลิน อยู่ในกะทิ เลซิธินเป็นอิมิลลชีฟายเออร์ชนิดหนึ่งสามารถทำให้อิมิลลชีฟายเออร์มีความคงตัวเพิ่มขึ้นได้ ขณะที่ลดขนาดของเม็ดไขมันลง สารเหล่านี้สามารถทำให้ไขมันในกะทิมีสสมบัติเปียกน้ำ กระจายตัวไหลได้ และละลายได้ แต่ถึงแม้ว่าจะมีเลซิธินในกะทิก็กังไม่สามารถทำให้กะทิอยู่ตัวได้ เนื่องจากกะทิมิปริมาณไขมันอยู่มาก เมื่อเทียบกับปริมาณโปรตีน ความเข้มข้นของโปรตีนระหว่างผิวเม็ดไขมันกับน้ำมีไม่มากพอที่จะป้องกันการรวมตัว โดยที่การแยกตัวของชั้นเมื่อตั้งทิ้งไว้ 5 – 10 ชั่วโมง จนกระทั่งแยกชั้นสมบูรณ์ในเวลา 24 ชั่วโมง ถ้าเราลดอุณหภูมิของกะทิลงมาถึง 10 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที จะสามารถปั่นเอาหัวกะทิออกมาได้ และถ้าล้างหัวกะทิด้วยน้ำประปา สารละลายเกลือและน้ำกลั่น เพื่อกำจัดโปรตีน น้ำตาล เกลือแร่ ที่ละลายอยู่ออกไประบบอิมัลชันจะเปลี่ยนจากชนิดน้ำมันในน้ำเป็นน้ำในน้ำมัน (ระริน, 2540)

2.9.2 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของกะทิ (กรพกา, 2539)

2.9.2.1 ความแก่อ่อนของมะพร้าว มะพร้าวที่ยังอ่อนมีปริมาณน้ำตาลสูง และไขมันต่ำ เมื่อนำมาสกัดน้ำกะทิจะได้กะทิที่มีความมันน้อย แต่มะพร้าวที่แก่เกินไปปริมาณโปรตีนจะลดลงเนื่องจากถูกใช้ไปกับกระบวนการเมตาบอลิซึม (metabolism)

2.9.2.2 วิธีการบีบคั้นกะทิ การใช้แรงขนาด 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว บีบเนื้อมะพร้าวจะได้ปริมาณน้ำกะทิมากที่สุด และมีประสิทธิภาพถึงร้อยละ 90 – 95 การใช้แรงน้อยได้น้ำกะทิปริมาณน้อยและมีปริมาณไขมัน และโปรตีนต่ำ การคั้นน้ำกะทิเพื่อให้ได้ปริมาณมาก และคุณภาพที่ สม่่าเสมอ ควรใช้เครื่องบีบมากกว่าการคั้นด้วยมือ

2.9.2.3 ปริมาณน้ำที่ใช้ อุณหภูมิในการคั้น และระยะเวลาในการผสมมะพร้าวกับน้ำ ความเข้มข้นของน้ำกะทิจะเพิ่มขึ้น เมื่อระยะเวลาการผสมนานขึ้น และเพิ่มเล็กน้อยตามอุณหภูมิของน้ำที่ใช้สกัด การสกัดจะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อผสมเนื้อมะพร้าวขูดกับน้ำที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส ก่อนคั้นเป็นเวลา 15 – 20 นาที

2.9.3 การเสื่อมเสียของกะทิ

การเสื่อมเสียของกะทิที่เกิดจากจุลินทรีย์ เพราะกะทิเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเสื่อมเสียทุกชนิด ได้แก่การปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ในกลุ่ม Bacillus, Achromobacter, Microbacterium, Micrococcus, Brevibacterium และโคลิฟอร์มบางชนิด ส่วนการเสื่อมเสียทางกายภาพ ได้แก่การแยกชั้นของอิมัลชัน ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ไม่เป็นที่ยอมรับ (Seow และ Gwee, 1997)

2.9.4 คุณสมบัติทางกายภาพ

กะทิมีความหนาแน่นและความเป็นกรด – ด่าง จะมีค่าแปรผกผันกับอุณหภูมิ ส่วนค่าแรงดึงผิวและความหนืดสูงขึ้นตามอุณหภูมิจนถึง 60 องศาเซลเซียส เป็นผลมาจากโมเลกุลโปรตีนเกิดการเสียสภาพเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นแล้วเกิดการรวมตัวกันที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ค่าแรงดึงผิวและความหนืดลดลง และที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส โปรตีนจะมีการรวมตัวกันมากที่สุด โปรตีนของกะทิทั้งหมด เช่น อัลบูมิน โกลบูลิน เป็นต้น (สุวรรณ, 2516) กรดไขมันในกะทิส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ทำให้น้ำมันชนิดนี้แข็งตัวที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิห้องเล็กน้อย (ณรงค์ และอัญชนีย์, 2528)

2.9.5 กะทิผงและกรรมวิธีการผลิตกะทิผง

กะทิผง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำกะทิสดมาทำให้แห้งเป็นผง ซึ่งเมื่อผสมน้ำแล้วสามารถนำไปใช้ได้ทันที กะทิผงมีลักษณะเป็นผงร่วน ปราศจากสิ่งแปลกปลอมใด ๆ มีสีและกลิ่นตามธรรมชาติของกะทิ และละลายได้ดีในน้ำ มีความชื้น และกรดไขมันอิสระ ร้อยละไม่เกิน 2 และ 0.9 ตามลำดับ มีปริมาณไขมัน และโปรตีนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 และ 9 ตามลำดับ (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2528)

วิธีการที่นิยมนำมาใช้ผลิตกะทิผง คือ การทำแห้งด้วยเครื่องพ่นฝอย (spray drying) ด้วยการเติมวัตถุเจือปนอาหาร เช่น มอลโตเด็คซ์ตริน (maltodextrin) เคซีน หรือหางนมผง ลงในกะทิที่สกัดได้ ผสมให้เข้ากันนำมาพาสเจอไรซ์ และทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน (homogenized) ก่อนนำไปทำแห้งด้วยวิธีการพ่นฝอย ทำให้เย็นทันที แล้วบรรจุในถุงอะลูมิเนียม หรือกระป๋อง มีอายุการเก็บรักษาประมาณ 4 เดือนที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส สาเหตุในการเสื่อมเสียของกะทิผง ส่วนใหญ่เนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน การจับตัวเป็นก้อน และสูญเสียความสามารถในการละลายน้ำ (wettability) (Seow และ Gwee, 1997)

2.9.6 การเสียของอาหารประเภทที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบ

การเสียที่สำคัญของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีไขมันและน้ำมันเป็นส่วนประกอบ ได้แก่

2.9.6.1 การเกิดไฮโดรไลซิส (Hydrolysis)

การเกิดไฮโดรไลซิสเป็นปฏิกิริยาการย่อยสลายของน้ำมันหรือไขมัน ทำให้เกิดกลีเซอรอล โมโนกลีเซอไรด์ ไตรกลีเซอไรด์ และกรดไขมันอิสระ โดยปฏิกิริยาจะเกิดเร็วขึ้นถ้ามีน้ำหรือเอนไซม์อยู่ด้วย หรืออยู่ในสถานะที่มีอุณหภูมิสูงหรือความชื้นสูง เช่น การทอดอาหารที่มีความชื้นสูง การเกิดไฮโดรไลซิสของน้ำมันหรือไขมันเป็นสาเหตุทำให้

1. จุดเกิดควันของน้ำมันต่ำลง
2. เกิดฟองระหว่างการทอด
3. เกิดการกัดกร่อนของอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร เนื่องจากมีกรด ไขมันอิสระเกิดขึ้น
4. เกิดรสขมหรือกลิ่นคล้ายสบู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใช้น้ำมันที่ใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์ม

สำหรับปัญหาการเสียเนื่องจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสนี้ ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้วัตถุกันหืน แต่อาจแก้ไขได้ด้วยการใช้วัตถุกันหืนที่มีคุณภาพดี และกระบวนการแปรรูปที่เหมาะสม

2.9.6.2 การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation)

การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน เป็นการเสียจากปฏิกิริยาทางเคมีที่สำคัญ และพบบ่อยที่สุดในอาหารประเภทน้ำมันและไขมัน และอาหารที่มีไขมันและน้ำมันเป็นองค์ประกอบ เป็นข้อจำกัดที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาอายุการเก็บสั้นลง การเกิดออกซิเดชันขึ้นในกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวทำให้เกิดอนุมูลอิสระขึ้น ปัจจัยที่มีส่วนในการทำให้ปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิดเร็วขึ้นหรือช้าลง ได้แก่ ชนิดของกรดไขมัน แสง อุณหภูมิ ออกซิเจน โลหะ เอนไซม์ และรังสี เป็นต้น

2.9.6.3 ปฏิกิริยาการเกิดรีเวอร์ชัน (Reversion)

ปฏิกิริยาการเกิดรีเวอร์ชัน เป็นปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดกลิ่นคล้ายสี (painty odor) หรือกลิ่นคล้ายหญ้า (grassy odor) โดยมากมักจะเกิดในน้ำมันถั่วเหลือง สำหรับกลไกในการเกิดของปฏิกิริยานี้ยังไม่พบสาเหตุแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดคลิโนเลนิก หรือกรดคลิโนเลอิกที่เป็นองค์ประกอบในน้ำมันพืช

2.9.6.4 การเกิดโพลิเมอไรเซชัน (Polymerization)

การเกิดโพลิเมอไรเซชัน เป็นปฏิกิริยาที่ทำให้มีการจับตัวกันระหว่างกรดไขมันไม่อิ่มตัว โดยจะเกิดขึ้นเมื่อไขมันหรือน้ำมันได้รับความร้อนที่อุณหภูมิสูง ๆ เป็นเวลานาน ๆ เช่น ในน้ำมันที่ใช้ในการทอด เป็นต้น

2.10 วุ้น

วุ้นเป็นกัมที่สกัดได้จากสาหร่ายทะเล ที่ไม่ละลายในน้ำเย็น ละลายได้ในน้ำร้อนเมื่อแข็งตัวให้เจลมีลักษณะแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดี เนื่องจากคุณสมบัติที่วุ้นสามารถเกิดเจลได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิละลายมาก จึงทำให้มีการนำวุ้นไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารมาก นิยมใช้กันมากในผลิตภัณฑ์ขนมอบ ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน เป็นต้น (สิวาพร, 2535)

วุ้นประกอบด้วย 2 ส่วน คือ อากาโรส และอากาโรเพกติน อากาโรสเป็นโซโมเลกุลของน้ำตาลD-galactoseสลับกับ 3,6-anhydro-L-galactoseและอาจมีกิ่งเป็น 6-O-methyl-D-galactose ส่วนอากาโรเพกตินเป็นโซโมเลกุลที่ประกอบด้วย D-galactoseและ 3,6-anhydro-L-galactoseมีกรดไพรูวิกเกาะอยู่ที่ตำแหน่ง C-4 และ C-6 นอกจากนี้ยังมีกลุ่มซัลเฟตเอสเทอร์เกาะอยู่ด้วย วุ้นสามารถเกิดเจลได้ถ้าละลายในน้ำร้อนแล้วปล่อยให้เย็นเป็นเจลที่แตกต่างไปจากสารโพลีแซคคาไรด์อื่นๆ กล่าวคือเจลที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40-50 องศาเซลเซียส ลักษณะของเจลที่ได้ใสแข็งแรงรอบ

ในประเทศไทยนิยมทำวุ้นจากสาหร่าย(Agar-Agar) มาทำขนม เช่น วุ้นหน้ากะทิ วุ้นลาย วุ้นชั้น วุ้นสาหร่ายทำมาจากสารเหนียวที่มีอยู่ในสาหร่ายทะเล มีคุณสมบัติจับตัวเป็นวุ้นที่หยุ่นได้ มีลักษณะใส

วุ้นมีขายในท้องตลาดมี 2 ลักษณะ คือ เป็นเส้นและเป็นผง ชนิดเป็นผงมักจะผ่านกระบวนการทำให้ขาวและบดละเอียด ไม่ว่าจะเป็นวุ้นชนิดใด การนำมาใช้ควรชั่งน้ำหนัก ดีกว่าวิธีการตวงวุ้น ชนิดมีเส้นมักมีขายเป็นกำๆ ส่วนวุ้นผงจะมีขายโดยตรงบรรจุของขนาดต่างๆ ที่ลากบอกวิธีใช้ไว้ด้วย(ณรงค์, 2538)

2.11 นมข้นหวาน

เป็นนมที่เติมน้ำตาลลงไปแล้วทำให้เข้มข้นขึ้น มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ 45% เป็นเนื้อมนมแท้ๆไม่เกิน 30% ที่เหลือเป็นส่วนของน้ำ นมข้นหวานไม่เหมาะที่จะใช้เลี้ยงทารก เพราะเมื่อนำมาชงให้ทารกต้องผสมน้ำ จึงได้เนื้อมนมน้อย ไขมัน และโปรตีน มีอยู่เพียงจำนวนน้อย นมข้นหวานเหมาะสำหรับชงกับน้ำชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มอื่น ทา และจิ้มขนมปัง หรือทำขนมปัง

2.12 นมข้นจืด

การใช้ประโยชน์ของนมข้นจืดนอกจากใช้เติมในเครื่องดื่มพวกกาแฟ ชา ช็อกโกแลต หรือเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ขนมอบต่างๆ แล้วยังสามารถมาเติมน้ำอีกหนึ่งเท่า เพื่อใช้เป็นนมสดพร้อมดื่มได้ จุดประสงค์การผลิตนมข้นจืดคือ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณค่าซึ่งมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ และเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งนมสด ปัจจุบันนี้นมข้นจืดที่จำหน่ายในประเทศไทยมิได้ผลิตโดยการ

ระเหยน้ำออกไปส่วนหนึ่ง แต่เป็นการผลิตจากนมผงในรูปการกึ่งรูป นมข้นจืดที่บรรจุกระป๋องมักมีกลิ่นนมคั่วที่รุนแรง(จิตติมา และคณะ, 2545)

ตารางที่ 2.4 แสดงองค์ประกอบของนมชนิดต่างๆ

ชนิด	น้ำ(%)	ไขมันเนย (%)	โปรตีน (%)	แลคโทส (%)	แร่ธาตุ (%)	น้ำตาลทราย (%)
นมบริสุทธิ์	88.00	3.50	3.25	4.50	0.75	0.00
นมผงมีไขมัน	1.50	27.50	27.00	38.00	6.00	0.00
นมสตรعهย	72.00	8.00	7.50	10.50	1.75	0.00
นมข้นหวานมีไขมัน	31.00	8.00	7.75	10.50	1.75	41.00
นมข้นปราศจากไขมัน	91.00	เล็กน้อย	3.50	4.75	0.75	-
นมผงปราศจากไขมัน	2.50	1.50	36.00	51.50	8.00	-
นมสตรعهยปราศจากไขมัน	72.00	เล็กน้อย	11.00	14.50	2.50	-
นมข้นหวานปราศจากไขมัน	29.00	เล็กน้อย	11.00	14.50	2.50	43.00

ที่มา: จิตติมา และอรอนงค์, 2546

2.13 การแช่แข็ง

การแช่แข็งเป็นการถนอมอาหารวิธีหนึ่ง ซึ่งสามารถเก็บรักษาอาหารได้เป็นเวลานานและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าการแช่เย็น โดยเฉพาะการเสื่อมเสียเนื่องจากจุลินทรีย์จะเกิดได้ช้ามาก (ไพบุลย์,2529)

2.13.1 ทฤษฎีการแช่เยือกแข็ง

หมายถึง การนำอาหารมาแช่เย็นจนแข็ง ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง โดยทั่วไปนิยมใช้ที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า เพื่อให้ น้ำที่อยู่ในอาหารกลายเป็นผลึกน้ำแข็งไม่ว่าจะเป็นอาหารสดหรืออาหารสำเร็จรูป ซึ่งจะช่วยให้การเก็บรักษาอาหารได้นานโดยที่อาหารคงสภาพใกล้เคียงกับอาหารสดการแช่แข็งเป็นการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ

2.13.2 การแช่แข็งอาหารแบ่งได้เป็น 2 วิธี

2.13.2.1 การแช่แข็งแบบช้า (Slow freezing)

คือ การทำให้อาหารแข็งตัวที่อุณหภูมิประมาณจุดเยือกแข็ง หรือ ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส อย่างช้าๆโดยใช้เวลาประมาณ 3-72 ชั่วโมง การแช่แข็งวิธีนี้ผลึกน้ำแข็งที่เกิดขึ้นในเนื้ออาหารจะมีขนาดใหญ่ จึงไปดันหรือทิ่มแทงผนังเซลล์ของอาหาร เช่น เนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ ให้เกิดความบอบช้ำและฉีกขาด เป็นผลให้อาหารเมื่อนำมาละลายน้ำแข็งมีลักษณะเละ ชุ่มน้ำ เนื่องจากของเหลวภายในเซลล์ไหลออกมา ซึ่งประกอบไปด้วยสารอาหาร วิตามิน และเกลือแร่ต่างๆ

2.13.2.2 การแช่แข็งแบบเร็ว (Quick freezing)

คือ การทำให้น้ำในอาหารกลายเป็นน้ำแข็งอย่างรวดเร็วโดยใช้อุณหภูมิต่ำ -17.8 ถึง -45.6 องศาเซลเซียส ในระยะเวลาอันสั้นไม่เกิน 30 นาที วิธีนี้ผลึกน้ำแข็งที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเล็กละเอียด ไม่ทำให้เซลล์ของอาหารบอบช้ำมากนัก การแช่แข็งแบบนี้จึงไม่ทำลายเซลล์อาหารมากเหมือนการแช่แข็งแบบช้า และเป็นวิธีที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร การแช่แข็งแบบนี้ทำได้หลายวิธี เช่น การจุ่มอาหารในสารให้ความเย็นโดยตรง การใช้ลมเป่าลงบนอาหาร เป็นต้น (ปิยธิดา, 2548)

2.13.3 การเกิดผลึกของน้ำ

การเกิดผลึกของน้ำ คือ การรวมตัวกันอย่างมีระเบียบ ภายในส่วนที่เป็นของแข็ง (solid phase) ซึ่งเกิดจากน้ำหรือจากสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายอยู่ การจะเกิดผลึกได้นั้นต้องประกอบด้วยสองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันคือ เริ่มด้วยการก่อนิวเคลียสผลึก (nucleation) แล้ว ตามด้วยการเพิ่มขนาดของผลึก (crystal growth)

2.13.4 การก่อนิวเคลียสผลึก

คือ การที่โมเลกุลของน้ำมารวมตัวกันอย่างมีระเบียบจนเป็นอนุภาคเล็กๆขึ้น ซึ่งขนาดของอนุภาคในช่วงนี้เรียกว่า ขนาดวิกฤต (critical size) จนเมื่อสภาวะเหมาะสมคือ ระดับอุณหภูมิต่ำลงถึงจุดความเย็นยิ่งยวดยิ่ง (supercooling) ซึ่งจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งการก่อนิวเคลียสจะเกิดได้ 2 แบบ คือ homogeneous nucleation จะเกิดขึ้นในน้ำบริสุทธิ์เท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับการแช่เยือกแข็งอาหาร อีกแบบคือ heterogeneous nucleation เกิดขึ้นในการแช่เยือกแข็งเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิตทั่วไป จะเกิดขึ้นเมื่อโมเลกุลของน้ำเรียงตัวกันเป็นอนุภาคเล็กๆและเกิดสภาวะที่เหมาะสมขึ้นที่ผิวหน้าของอนุภาคนั้น

2.13.5 การเพิ่มขนาดผลึก

เป็นการเกิดต่อเนื่องมาจากการก่อนิวเคลียสผลึก การเพิ่มขนาดของผลึกน้ำแข็งจะเกิดได้ที่อุณหภูมิใกล้กับจุดหลอมเหลว โดยโมเลกุลของน้ำจะเคลื่อนตัวไปเกาะอยู่กับนิวเคลียสผลึกที่ก่อตัวแล้วมีมากกว่าผลึกที่ก่อนิวเคลียสผลึกขึ้นใหม่ เพราะโมเลกุลของน้ำในสภาวะที่เป็นของเหลวมีขนาดเล็กจะเคลื่อนที่ได้ในอัตราเร็วสูง และจะหยุดลงเมื่อกระทบกับผิวหน้านิวเคลียสผลึกดังปรากฏ ดังกล่าว ขนาดของผลึกน้ำแข็งในอาหารแช่เยือกแข็ง มีความสำคัญที่เกี่ยวพันไปถึงคุณภาพของอาหารแช่แข็งเป็นอย่างมาก

2.13.6 ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลึกน้ำแข็ง

ผลึกน้ำแข็งจะเกิดขึ้นเกิดจากปัจจัยดังนี้

1. อัตราเร็วในการแช่เยือกแข็ง
2. อุณหภูมิของตัวอย่าง

3. ลักษณะตามธรรมชาติของเซลล์

(คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,2539)

2.13.7 ผลของการแช่เยือกแข็งต่ออาหาร

การแช่เยือกแข็งมีผลกระทบต่อคุณภาพของอาหารโดยตรง คือ ทำให้เซลล์ของเนื้อเยื่อแตก เนื่องจากเกิดผลึกน้ำแข็งขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อการแช่เยือกแข็งเกิดขึ้นอย่างช้าๆ การแช่เยือกแข็งจะมีผลน้อยมากต่อการเปลี่ยนแปลงของสารสี รสชาติ และคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร

อาหารที่อยู่ในรูปอิมัลชันเมื่อนำไปแช่เยือกแข็งจะทำให้ความคงตัวลดลง บางครั้งอาจจะทำให้โปรตีนตกตะกอนออกจากสารละลาย ตัวอย่างเช่น การแช่เยือกแข็งนํ้านม ทำให้เป็นข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์จากนํ้านม

อาหารประเภทผักและผลไม้จะมีความทนทานต่อการเสียหายจากการแช่เยือกแข็งได้น้อยกว่าเนื้อสัตว์ เนื่องจากโครงสร้างของเนื้อเยื่อและเซลล์มีความแตกต่างกัน เนื้อเยื่อสัตว์จะมีโครงสร้างยืดหยุ่นมากกว่าเนื้อเยื่อพืชทำให้ขยายตัวออกได้ระหว่างการแช่เยือกแข็ง ขณะที่เซลล์ของเนื้อเยื่อพืชจะแตกออกเมื่อนํ้าภายในเซลล์กลายเป็นผลึกน้ำแข็ง ความรุนแรงของเซลล์พืชจะแตกมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของผลึกน้ำแข็งที่เกิดขึ้นและอัตราของการถ่ายเทความร้อน

อัตราของการแช่เยือกแข็งมีอิทธิพลต่อเนื้อเยื่อพืช หากการแช่เยือกแข็งกระทำอย่างช้าๆ ทำให้ผลึกน้ำแข็งมีขนาดโตขึ้นในช่องว่างระหว่างเซลล์ ซึ่งจะทำให้เซลล์พืชที่อยู่รอบๆ มีโครงสร้างเปลี่ยนไปและทำลายผนังเซลล์ที่อยู่ข้างเคียง นอกจากนี้ผลึกน้ำแข็งยังมีความดันไอดำกว่าบริเวณภายในเซลล์ ทำให้มีน้ำเคลื่อนย้ายจากภายในเซลล์ออกมายังผลึกน้ำแข็ง ทำให้ผลึกน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นในช่องว่างระหว่างเซลล์ และเซลล์พืชจะเหี่ยวลง และเซลล์จะถูกทำลายอย่างถาวรเมื่อความเข้มข้นของตัวถูกละลายภายในเซลล์เพิ่มขึ้น

เมื่อนำอาหารแช่เยือกแข็งมาหาลอมละลาย เซลล์ไม่สามารถคืนรูปและแต่งได้เหมือนเดิม อาหารจะมีเนื้อนุ่ม มีของเหลวจากภายในเซลล์ไหลออกมาเนื่องจากผนังเซลล์ถูกทำลายแต่หากกระบวนการแช่เยือกแข็งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผลึกน้ำแข็งที่เกิดขึ้นภายในเซลล์และช่องว่างระหว่างเซลล์จะมีขนาดเล็ก จะมีผลเสียหายต่อผนังเซลล์น้อยมาก และไม่เกิดความแตกต่างระหว่างความดันไอดัวย เซลล์ไม่เหี่ยวลง หรือมีการสูญเสียนํ้าออกจากเซลล์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ลักษณะเนื้อของอาหารแช่เยือกแข็งจะยังคงเหมือนเดิมมาก ทำให้อาหารแช่เยือกแข็งที่ได้มีคุณภาพดีและเมื่อนำไปหาลอมละลายก็จะมีลักษณะปรากฏที่ดีด้วย(นิธิยา,2544)

ตารางที่ 2.5 เปรียบเทียบการแช่แข็งแบบช้าและการแช่แข็งแบบเร็ว

การแช่แข็งแบบช้า	การแช่แข็งแบบเร็ว
1. ผลึกน้ำแข็งมีขนาดใหญ่กว่า 2. กระบวนการเมแทบอลิซึมเกิดอย่างช้าๆ 3. ใช้เวลานานกว่า 4. เมื่อนำอาหารไปละลายน้ำแข็ง อาหารจะเสียคุณค่าทางโภชนาการมากกว่า 5. เซลล์ต่างๆ ถูกทำลายมากกว่า	1. ผลึกน้ำแข็งมีขนาดเล็กกว่า 2. หยุดกระบวนการเมแทบอลิซึม 3. ใช้เวลาน้อยกว่า 4. เมื่อนำอาหารไปละลายน้ำแข็ง อาหารจะเสียคุณค่าทางโภชนาการน้อยกว่า 5. เซลล์ต่างๆ ถูกทำลายน้อยกว่า

ที่มา : ปิยธิดา(2548)

2.13.8 การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง

ภาชนะบรรจุสำคัญผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ควรมีคุณสมบัติป้องกันการสูญเสียความชื้น และสะดวกต่อการสะดวกต่อการขนส่ง โดยทั่วไปการบรรจุอาหารแช่แข็งควรคำนึงถึงข้อกำหนดต่อไปนี้

2.13.8.1 ห้องบรรจุต้องสะอาด สามารถป้องกันการปนเปื้อนได้

2.13.8.1 ต้องบรรจุทันที เวลาที่ใช้จากกระบวนการผลิตถึงช่วงการบรรจุไม่ควรเกิน 1

ชั่วโมง

2.13.8.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุและพนักงานบรรจุต้องสะอาดและระวังการปนเปื้อน คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้เป็นภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์แช่แข็งมีดังนี้

- เป็นวัสดุที่คงตัวในสภาพที่อุณหภูมิต่ำได้ดี
- เป็นวัสดุที่ไม่ยอมให้สิ่งต่อไปนี้ผ่านได้สะดวกน้ำ ไอน้ำ ออกซิเจน สารมีกลิ่น และแสง
- เป็นวัสดุที่เหนียวและแข็งแรง พอที่จะรับปริมาณส่วนขยายจากการเปลี่ยนแปลงจากสถานะของเหลวเป็นของน้ำแข็ง ในกรณีมีการห่อผลิตภัณฑ์ก่อนแช่แข็ง
- เป็นวัสดุที่ยอมให้การถ่ายเทความร้อนออกจากผลิตภัณฑ์ เป็นไปได้ด้วยดีถ้ามีการบรรจุผลิตภัณฑ์ก่อนแช่แข็ง
- ไม่เป็นวัสดุที่มีกลิ่นและรสแปลกปลอม ไม่เป็นพิษต่อผลิตภัณฑ์อาหาร
- เป็นวัสดุที่ทนต่อความร้อน
- เป็นวัสดุที่ทนทานและสะดวกต่อการขนย้าย

2.13.9 การเก็บรักษาอาหารแช่แข็ง

2.13.9.1 ห้องเย็นต้องมีอุณหภูมิไม่สูงกว่า -18 องศาเซลเซียส และควบคุมให้มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส

2.13.9.2 ห้องนั้นต้องมีเนื้อที่เพียงพอ มีการหมุนเวียนของอากาศดีทั่วถึง

2.13.9.3 ต้องรักษาความสะอาดภายในห้องเย็น และความเป็นระเบียบ

2.13.9.4 การหมุนเวียนของอาหารแช่แข็งที่เก็บรักษาต้องคำนึงถึงสิ่งที่เข้าเก็บก่อน ต้องนำออกก่อน (first in – first out) (พรพิมล, 2545)

2.13.10 ผลการเก็บรักษาอาหารแช่เยือกแข็ง

การเก็บรักษาอาหารแช่เยือกแข็ง ยิ่งลดอุณหภูมิให้ต่ำลง ยิ่งลดอัตรา การเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก จุลินทรีย์และปฏิกิริยาทางชีวเคมีน้อยลง เพราะกระบวนการแช่เยือกแข็งและการเก็บรักษาไม่ได้ทำลาย activity ของเอนไซม์ และผลของจุลินทรีย์ก็มีความผันแปรไปตามอุณหภูมิด้วย การเก็บรักษาอุณหภูมิ ระหว่าง -4 ถึง -10 องศาเซลเซียส จะมีผลต่อการเกิด lethat effect ต่อจุลินทรีย์มากกว่าการเก็บที่อุณหภูมิ ต่ำกว่านี้ (ระหว่าง -15 ถึง -30 องศาเซลเซียส)

สำหรับอุณหภูมิที่ใช้ในการเก็บรักษาอาหารแช่เยือกแข็งโดยทั่วไป คือ ประมาณ -18 องศาเซลเซียส จะมีการสูญเสียคุณภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและอาหารบางชนิดอาจเกิดจาก activity ของเอนไซม์ด้วย และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้เร็วขึ้น เมื่อความเข้มข้นของตัวถูกละลายสูงขึ้น รอบๆผลึกน้ำแข็ง ทำให้ Water activity ลดลง นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนค่าพีเอชและ redox potential ด้วย ถ้าเอนไซม์ไม่ถูกทำลายขณะที่เซลล์เมมเบรนถูกทำลายด้วยผลึกน้ำแข็ง จะทำให้เอนไซม์เข้าไปทำ ปฏิกิริยากับตัวถูกละลายที่อยู่ภายในและมีความเข้มข้นมากขึ้นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของอาหาร แช่เยือกแข็งระหว่างการเก็บรักษา มีดังนี้

2.13.10.1 การเสื่อมสลายของสารสี

ระหว่างการเก็บรักษาอาหารแช่เยือกแข็ง ประเภทผักสีเขียว คือสารสีเขียวหรือคลอโรฟิลล์ จะค่อยๆ สลายตัวอย่างช้าๆ ไปเป็นสีน้ำตาลของฟิโอฟิตินถึงแม้ผักจะผ่านการลวกแล้วก็ตาม ส่วนในผลไม้ อาจมีการเป็นพีเอชเนื่องจากของเหลวภายในเซลล์มีความเข้มข้นมากขึ้น เมื่อเย็นจัดเกลือของสารบางชนิด จะมีการละลายลดลงและตกตะกอน เมื่อพีเอชของเซลล์พืชเปลี่ยนไปจะทำให้สีของแอนโทไซยานิน เปลี่ยนไปด้วย

2.13.10.2 การสูญเสียวิตามิน

วิตามินที่ละลายได้ดีในน้ำ เช่น วิตามินซีและกรดแพนโททินิกจะสูญเสียไปได้ถึงแม้ที่ อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งก็ตาม หากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจะมีการสูญเสียวิตามินซีเพิ่มขึ้น 6 – 20 เท่าในผัก และ

30 – 70 เท่าในผลไม้ ส่วนการสูญเสียวิตามินชนิดอื่นๆส่วนใหญ่จะเกิดจากของเหลวที่ไหลออกมา โดยอาหารประเภทเนื้อสัตว์และเนื้อปลา

2.13.10.3 Activity ของเอนไซม์ที่เหลืออยู่

ผักหรือผลไม้ที่ผ่านการลวกไม่เพียงพอจะยังคงมี เอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสเหลืออยู่ ซึ่งทำให้ผักและผลไม้ดกเหลือง เนื่องจากปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลที่เร่งด้วยเอนไซม์ หากยังมีเอนไซม์ลิพอกซิเจนสจะทำให้เกิดกลิ่นและรสชาติที่ผิดปกติจากลิพิด ส่วนเอนไซม์ที่ย่อยสลายโปรตีนและลิพิดในเนื้อสัตว์ อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรสชาติ และลักษณะเนื้อสัมผัสเมื่อเก็บรักษาไว้เป็นเวลานาน

2.13.10.4 ออกซิเดชันของลิพิด

ปฏิกิริยานี้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างช้าๆ ที่อุณหภูมิ – 18 องศาเซลเซียส (นิธิยา,2544)

2.13.10.5 การเกิดผลึกใหม่ (Recrystallization)

ถ้าอุณหภูมิในขณะเก็บไม่คงที่ จะทำให้ขนาดของผลึกน้ำแข็งใหญ่ขึ้น ซึ่งจะทำให้คุณภาพของอาหารลดลงเหมือนที่พบในการแช่แข็งแบบช้า

2.13.10.6 การไหม้เนื่องจากความเย็นจัด(Freezer burn)

เป็นลักษณะดำหนิที่เกิดขึ้นกับอาหารแช่แข็งที่มีภาชนะบรรจุไม่เหมาะสม โดยจะเกิดขึ้นที่ผิวหน้าของผลิตภัณฑ์เป็นรอยไหม้และมีสีน้ำตาลเกิดขึ้น ถ้าเป็นเนื้อสัตว์จะเห็นได้ชัดคือผิวมีสีแดงเข้มออกน้ำตาล ลักษณะคล้ายไหม้ทำให้ดูไม่น่ารับประทาน สาเหตุเกิดจากน้ำจากผิวหน้าของอาหารได้ระเหยออกไปมาก แต่ไม่ได้เป็นปัญหาเนื่องจากจุลินทรีย์ ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารด้วยวัสดุที่ป้องกันการระเหยของน้ำ หรือนำอาหารไปผ่านกระบวนการเคลือบผิวหน้าให้แข็งตัวเสียก่อน เรียกว่า เกลสซิง(glazing)(ปิยธิดา,2548)

2.13.11 การขนส่งอาหารแช่แข็ง

การขนส่ง เป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องรักษาระดับอุณหภูมิ ของอาหารแช่แข็ง ไม่ให้สูงขึ้น จึงต้องขนส่งด้วยรถขนส่งห้องเย็นที่อุณหภูมิต่ำกว่า -20 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะอายุการเก็บรักษาปลาแช่แข็งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้ในการเก็บ (อุณหภูมิของห้องเย็น) เช่น ปลาที่จับได้ใหม่ๆ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จะเก็บได้นาน 8 เดือน แต่ถ้าเก็บที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส จะเก็บได้เพียง 1 เดือน การที่อุณหภูมิสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลานานเท่าไรจะเป็นผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการขนส่งผลิตภัณฑ์แช่แข็งจากโรงงานแช่เย็นที่ดี ทำเรื่องที่ดี ไปยังร้านขายปลีกมักมีปัญหาเรื่องอุณหภูมิเสมอ

โดยทั่วไปการขนส่งด้วยรถห้องเย็นนานที่สุดประมาณ 30 ชั่วโมง และเมื่อถึงปลายทางอุณหภูมิของคอนเทนเนอร์(Container) ไม่ควรเกิน -18 องศาเซลเซียส ควรจะเป็น -20 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า

อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงการเสื่อมสภาพระหว่างการขนส่ง ควรปฏิบัติดังนี้

1. ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าควรสั้นที่สุด
2. ควรทิ้งระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์กับผนังคอนเทนเนอร์
3. ไม่ควรประหยัดเรื่องฉนวน
4. การปิดเปิดประตูถ้าจำเป็นให้ให้น้อยที่สุด

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2539)

2.13.12 ข้อดีและข้อเสียของอาหารแช่เยือกแข็ง

2.13.12.1 อาหารแช่แข็งมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าอาหารที่ถนอมโดยใช้อุณหภูมิสูง เพราะความร้อนจะทำลายวิตามินในอาหารเกือบหมด

2.13.12.2 อาหารแช่แข็งมีลักษณะคล้ายอาหารสดมากกว่า อาหารที่ถนอมโดยวิธีอื่นจึงทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์สูงตามไปด้วย แม้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตที่สูงก็ตาม แต่ก็คุ้มกับผลที่ได้รับ

2.13.12.3 อาหารแช่แข็งที่มีอายุการเก็บรักษาสั้นกว่าอาหารแห้งหรืออาหารกระป๋องมาก

2.13.12.4 ห้องหรือตู้เก็บรักษาผลิตภัณฑ์รวมทั้งการขนส่งจะต้องใช้ห้องแช่แข็ง จะเก็บในอุณหภูมิปกติเหมือนผลิตภัณฑ์อื่นๆ ไม่ได้

2.13.12.5 ผลิตภัณฑ์แช่แข็งอาจสูญเสียภาชนะไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์น้ำแข็งที่ละลายได้ โดยเฉพาะใช้วิธีแช่แข็งที่ไม่มีประสิทธิภาพ (ลาวัลย์, 2542)

2.13.13 การคืนสภาพของอาหารแช่แข็ง

การคืนหรือการละลายน้ำแข็ง คือ การให้ความร้อนแก่อาหารแช่แข็งเพื่อให้ น้ำแข็งละลาย ส่วนการแช่แข็งนั้น คือ การดึงความร้อนในอาหารออกให้เกิดผลึกน้ำแข็งในอาหาร กระบวนการทั้งสองนี้ คือ การย้อน จะมีความสัมพันธ์ของอุณหภูมิอาหารกับเวลา การละลายอาหารแช่แข็งใช้เวลานานกว่าการแช่แข็งกับธรรมชาติของน้ำ

การละลายน้ำแข็งตามธรรมชาติ จะเกิดการละลายที่ผิวหน้าอาหารก่อน ในทันทีที่อาหารเป็นน้ำแข็งหมด ความร้อนจะส่งผ่านและเปลี่ยนอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็วจึงปรากฏการละลายที่ผิวหน้าอาหารอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อผิวหน้าเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำ น้ำก็จะหน่วงเหนี่ยวการส่งผ่านและเปลี่ยนอุณหภูมิของอาหารให้ช้าลง ยิ่งเวลาผ่านไป ชั้นของน้ำก็จะหนามากขึ้น จะยิ่งชะลอการส่งผ่านความร้อน ทำให้การละลายเริ่มช้าลง

2.13.13.1 วิธีการคืนสภาพ

- ใช้การหมุนเวียนของน้ำเย็น ทำได้โดยการนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแช่แข็ง แช่ลงในภาชนะที่มีน้ำเย็นอุณหภูมิประมาณ 20 องศาเซลเซียส โดยให้น้ำนั้นมีการหมุนเวียนตลอดเวลา เพื่อช่วยให้

การถ่ายเทความร้อนเป็นไปได้เร็วขึ้น และช่วยรักษาอุณหภูมิของผิวหนังอาหารไม่ให้สูงเกินไป แต่วิธีนี้จะทำให้เกิดการสูญเสียอาหารบางชนิดที่ละลายน้ำได้

- ใช้เตาอบ นิยมใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องผ่านวิธีการหุงต้ม โดยการอบให้สุกไปพร้อมกันกับการคินสภาพ แล้วพร้อมที่จะนำไปรับประทานเลย

- การใช้กระแสไฟฟ้าผ่านอิเล็กโทรด ทำได้โดยการนำอาหารที่ผ่านการแช่แข็งไปแช่ลงในของเหลวที่เป็นตัวกลาง ซึ่งมักจะเป็นน้ำ โดยมีแผ่นอิเล็กโทรด 2 แผ่นจุ่มอยู่ โดยต่ออยู่กับวงจรไฟฟ้า กระแสสลับที่มีความต่างศักย์ 380 โวลต์ มีสวิตช์ปิดเปิดได้อัตโนมัติ เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดความร้อนสูงเกินไป นับว่าเป็นวิธีที่เหมาะสม อีกวิธีหนึ่งเพราะอัตราการคินตัวโดนวิธีนี้จะเร็วกว่าวิธีแรกถึง 3 เท่า

- การใช้ไมโครเวฟ เป็นการอาศัยความร้อนที่เกิดขึ้นจากช่วงความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในระดับไมโครเวฟ ประหยัดเวลาและเนื้อที่ได้มาก

2.13.13.2 วิธีการคินสภาพที่เหมาะสม

การคินสภาพของอาหารแช่แข็งแบ่งออกเป็น 2 วิธี

1. การคินสภาพแบบเร็ว (Fast thawing)
2. การคินสภาพแบบช้า (Slow thawing)

การคินสภาพแบบที่รวดเร็วนั้น จะให้อาหารคินสภาพที่มีคุณภาพดีกว่าการใช้เวลานาน การคินสภาพที่เหมาะสม คือ วิธีที่เร็วที่สุด แต่อุณหภูมิไม่สูงเกินไปจนเชื้อจุลินทรีย์ที่ผิวหนังหรือในอาหารเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ในระดับครัวเรือนนิยมใช้ไมโครเวฟคินสภาพของอาหารแช่แข็ง เนื่องจากเตาไมโครเวฟนั้นให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แพร่เข้าสู่อาหาร โมเลกุลของน้ำแข็งทั้งภายในและที่ผิวหนังอาหารจะได้รับการกระตุ้นให้สั่นไหว เกิดความร้อนขึ้นพร้อมกัน การละลายน้ำแข็งจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์กว่า (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539)

2.14 ไมโครเวฟ

พลังงานจากรังสีไมโครเวฟเป็นพลังงานจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ความถี่ 2,450 MHz หรือ 915 MHz การให้ความร้อนด้วยตู้อบไมโครเวฟแตกต่างจากการให้ความร้อนด้วยเครื่องอบธรรมดา คือ เครื่องอบธรรมดาให้พลังงานความร้อนโดยเปลวไฟแบบเตาแก๊สหรือความร้อนจากขดลวดไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้อาหารสุกโดยการถ่ายเทความร้อน 3 วิธี คือ การนำ การพา และการแผ่รังสี แต่ตู้อบไมโครเวฟทำให้อาหารสุกโดยคลื่นไมโครเวฟที่มีความถี่สูงถึง 2,450 ล้านรอบ/วินาที ทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารสั่นสะเทือนและชนโมเลกุลอื่นๆ ต่อไป จนเกิดเป็นพลังงานจลน์ และพลังงานจลน์นี้จะกลายสภาพเป็นพลังงานความร้อน จึงทำให้อาหารสุกอย่างรวดเร็วกว่าการประกอบอาหารด้วยระบบอื่น ๆ

อาหารส่วนใหญ่มีน้ำเป็นองค์ประกอบ นอกจากนี้ยังมีเกลือแร่ชนิดต่าง ๆ ละลายอยู่ เช่น โซเดียมคลอไรด์ โพแทสเซียมคลอไรด์ และแคลเซียมคลอไรด์ เกลือแร่ที่ละลายในน้ำนี้จะแตกตัวอยู่ในรูปที่มีประจุ อะตอมของโซเดียม โพแทสเซียมและแคลเซียม จะมีประจุบวกหรือที่เรียกว่า แคตไอออน เนื่องจากแคตไอออนจะเกาะติดแคลโทด (ขั้วลบ) ส่วนคลอริンจะมีประจุลบหรือที่เรียกว่า แอนไอออน โดยแอนไอออนจะเกาะติดกับแอโนด (ขั้วบวก) หรือเกาะติดแผ่นโลหะที่มีประจุบวก

อาหารหรือวัตถุใด ๆ ก็ตามซึ่งมีประจุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในสนามไฟฟ้า นั่นคือ เกิดการเปลี่ยนแปลงในคู่มิโครเวฟซึ่งมีสนามไฟฟ้าด้วย โครงสร้างโมเลกุลของน้ำมีอะตอมของไฮโดรเจน 2 อะตอมเกาะติดกับออกซิเจนอะตอมด้วยมุม 105° ไฮโดรเจนอะตอมที่มีประจุบวก 1 ประจุ ส่วนออกซิเจนอะตอมมีประจุลบ 2 ประจุ เราเรียกโมเลกุลที่มีลักษณะดังกล่าวว่า ไดโพล (dipole) หรือโมเลกุลไดโพล ไดโพลในสนามแม่เหล็กเปรียบเสมือนเข็มของเข็มทิศไฟฟ้าและทำตัวในสนามไฟฟ้าเหมือนเข็มของเข็มทิศแม่เหล็ก ก่อนที่จะมีการทำให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้น โมเลกุลของน้ำในอาหารจะมีทิศทางกระจัดกระจาย

ส่วนโมเลกุลซึ่งอยู่ในรูปของแข็ง เช่น น้ำแข็งซึ่งถูกล็อกโดยโครงสร้างของผลึกน้ำแข็งจะไม่สามารถหมุนไปตามทิศทางของสนามไฟฟ้าได้ จึงไม่เกิดการชนกัน ในขณะที่โมเลกุลของก๊าซหรือไอไม่มีความหนาแน่นพอที่จะเกิดการเสียดสีกันจนเกิดความร้อนได้

ปฏิกริยาร่วมกันระหว่างคลื่นไมโครเวฟกับโมเลกุลที่มีขั้ว เช่น น้ำ เป็นกลไกหลักที่ทำให้เกิดความร้อนในการใช้คลื่นไมโครเวฟกับอาหารทั่วไปยกเว้นอาหารที่มีความเข้มข้นของเกลือสูง เช่น แสม

คลื่นไมโครเวฟไม่ใช่ความร้อน แต่เป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงาน แต่คลื่นไมโครเวฟจะเปลี่ยนไปเป็นความร้อนโดยการทำให้อนุภาคหรือโมเลกุลที่มีขั้วเสียดสีกันและเกิดความร้อนขึ้น เมื่อคลื่นไมโครเวฟซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงมากถึง 2,450 ล้านรอบ/วินาที พุ่งเข้าหาอาหารจากทุกทิศทุกทางโดยรอบของผนังตู้ด้านในแล้วแผ่กระจายไปยังอาหาร จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้วไฟฟ้าอย่างรวดเร็วในอาหาร ขั้วของน้ำจะเปลี่ยนทิศทางตามการเปลี่ยนแปลงทิศทางในสนามไฟฟ้า ทำให้เกิดการเสียดสีกันของโมเลกุลภายในอาหาร พลังงานจะเคลื่อนย้ายไปยังไอออนและอะตอมหรือโมเลกุลใกล้เคียง ก่อให้เกิดความร้อนขึ้นและอาหารสุกอย่างรวดเร็วคล้ายกับการถูมือไปมาเร็ว ๆ จะทำให้รู้สึกร้อนขึ้นมาทันที

ไมโครเวฟเดินทางเป็นเส้นตรงเหมือนแสง ถูกสะท้อนกลับเมื่อกระทบโลหะ เคลื่อนที่ผ่านอากาศสามารถทะลุผ่านภาชนะที่ทำด้วยแก้ว พลาสติก กระดาษ หรือไม้ได้ หรือถูกดูดซับโดยส่วนประกอบในอาหารซึ่งมีน้ำเป็นส่วนใหญ่ ถ้าคลื่นไมโครเวฟถูกสะท้อนกลับหมดหรือทะลุผ่านวัตถุโดยไม่มีการดูดซับวัตถุหรืออาหารนั้นก็จะไม่ร้อน อาหารจะร้อนขึ้นเมื่อมีการดูดซับคลื่นหรือพลังงานไว้ ในการให้ความร้อนแก่อาหารจะทำให้คลื่นสูญเสียพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าไป ค่าลอสแฟคเตอร์เป็นค่าที่ชี้บอกการสูญเสียพลังงานไมโครเวฟในการเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในอาหารหรือบอกว่า คลื่นถูกดูดซับไว้มากน้อยแค่ไหน

วัตถุดิบที่ดูดซับคลื่นไมโครเวฟได้มาก คือ วัตถุที่มีการเคลื่อนที่ภายในโมเลกุลมากกว่าวัตถุดิบชนิดหนึ่ง เรียกลักษณะดังกล่าวว่า ความหยาบ (lossy) ระดับความหยาบนี้จะแปรผันกับคลื่นความถี่ อุณหภูมิและคุณสมบัติของวัตถุ ถ้าวัตถุดิบมีความหยาบมาก วัตถุจะดูดซับพลังงานไมโครเวฟได้มาก นั่นคือวัตถุจะร้อนมาก

การถ่ายเทความร้อนในอาหารเกิดจากการนำความร้อนด้วย แก้ว กระจก และโพลิเมอร์ที่ใช้ในการบรรจุมีค่าการนำความร้อนต่ำ คือโปร่งใสหรือไม่ดูดซับคลื่นไมโครเวฟจึงไม่ร้อน ส่วนโลหะจะสะท้อนคลื่นไมโครเวฟได้ เนื่องจากอาหารมีส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งไม่สม่ำเสมอ รูปแบบการทำให้ร้อนโดยไมโครเวฟจึงต่างกันด้วย (วิไล, 2545)

2.14.1 องค์ประกอบอาหารกับไมโครเวฟ

อาหารต่าง ๆ มีส่วนประกอบที่แตกต่างกันมากรวมทั้งส่วนประกอบที่จำเป็นต้องใช้ในการปรุงแต่งอาหาร เช่น เกลือ น้ำตาล น้ำมัน แป้ง ล้วนแต่มีผลที่แตกต่างกันไป เมื่อนำมาหุงต้มด้วยไมโครเวฟซึ่งควรจะต้องศึกษาเพื่อสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง ในกรณีของอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่มีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอยู่เป็นปริมาณสูงจะมีความเหนียวมากเมื่อนำมาหุงต้มด้วยไมโครเวฟเพราะเป็นการให้ความร้อนอย่างรวดเร็วเกินไปจนพวกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันไม่มีโอกาสที่จะสลายตัวได้เลยจึงมักจะเหนียวกว่าการใช้วิธีให้ความร้อนแบบดั้งเดิม อาหารประเภทไข่ที่กระเทาะเปลือกออกแล้วจะหุงต้มด้วยไมโครเวฟได้อย่างรวดเร็วเช่นการทำไข่ตุ๋น ไข่ลวก หรือสังขยาจะใช้ไมโครเวฟได้ดี แต่ถ้าเป็นไข่ทั้งฟองแล้วห้ามใช้เพราะจะมีการระเบิด น้ำตาลที่ใช้ปรุงแต่งรสชาติอาหาร การเคี่ยวน้ำเชื่อมหรือการทำลูกกวาด ลูกอมจะไม่มีปัญหาจะเกิดความร้อนได้รวดเร็วด้วยไมโครเวฟ แต่สำหรับเกลือแกง และเกลือในรูปแบบอื่น ในรูปของเกลือแร่ต่าง ๆ เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต แมกนีเซียมคาร์บอเนต ที่อยู่ในน้ำและในอาหารจะทำให้การดูดซับคลื่นไมโครเวฟได้ต่ำ มีผลให้เกิดความร้อนได้ช้ากว่า (คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, 2543)

2.15 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

พัชรี้ ตั้งตระกูล(2549) จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษหาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมและสภาพการผลิตข้าวกล้องงอกที่มีประสิทธิภาพ พบว่า ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เมื่อนำมาเพาะเป็นข้าวกล้องงอกจะมีสาร GABA มากที่สุด (15.2 - 19.5 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม) ซึ่งสูงกว่าข้าวกล้องปกติ ส่วนสภาวะที่จะทำให้ข้าวกล้องงอกได้ดีคือ ต้องนำข้าวกล้องไปแช่น้ำราว 48 - 72 ชั่วโมงในหม้อแช่ โดยมีการควบคุมอุณหภูมิ การไหลเวียนน้ำ ความดัน และความเป็นกรดด่างของน้ำ เพื่อให้ความชื้นจากน้ำไปกระตุ้นให้เมล็ดข้าวงอกและเปลี่ยนกรดกลูตามิกไปเป็นสารกาบาอันเป็นส่วนที่

สำคัญที่สุด ต่อมาเมื่อได้ข้าวกล้องงอกในขั้นตอนนี้แล้ว ก็ต้องทำให้ข้าวกล้องงอกหยุดการงอกต่อไป โดยอบแห้งให้มีความชื้นต่ำกว่า 14% ในหม้ออบแห้ง จากนั้นจึงบรรจุลงในถุงสุญญากาศพร้อมขายเป็น ลำดับสุดท้าย สำหรับข้าวกล้อง ที่สามารถนำมาแช่น้ำให้เกิดการงอกได้นั้นจะต้องเป็นข้าวกล้องที่ผ่านการกะเทาะเปลือกมาไม่นานเกิน 2 สัปดาห์

จารุรัตน์ ตันเต และ วรณช เจษฎารักษ์ (2550) ทำการศึกษาภาวะผลของความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ และเวลาในกระบวนการแช่ต่อปริมาณแกมมาอะมิโนบิวเทอริกเอซิก(GABA) และปริมาณกลูตาเมตของข้าวกล้องงอก โดยนำข้าวกล้องหอมมะลิ 105 แช่ในสารละลายที่มี pH แตกต่างกัน(pH 4, 4.5, 5, 5.5, 6 และ 6.5) ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง พบว่า ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ 105 ที่แช่ในสารละลาย pH 4, 5 และ 5.5 มีปริมาณ GABA ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ($p>0.05$) โดยการแช่ในสารละลายที่ pH 5 มีปริมาณ GABA สูงสุด (21.93 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม น้ำหนักแห้ง) เมื่อนำข้าวกล้องหอมมะลิ 105 มาแช่ในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ (1 มิลลิโมลาร์ต่อลิตร, pH 5) ที่อุณหภูมิ 30, 40 และ 50 องศาเซลเซียส นาน 3, 8 และ 12 ชั่วโมง พบว่า การแช่ข้าวกล้องที่อุณหภูมิ 40 และ 50 องศาเซลเซียส นาน 8 ชั่วโมง มีปริมาณ GABA ในข้าวกล้องงอกหอมมะลิ 105 ที่ไม่แตกต่างทางสถิติ($p>0.05$) ในขณะเดียวกันมีปริมาณ GABA สูงกว่าสภาวะในการแช่ที่อุณหภูมิและเวลาอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับ ($p\leq 0.05$) โดยการแช่ที่อุณหภูมิที่ 40 องศาเซลเซียส นาน 8 ชั่วโมง มีปริมาณ GABA สูงสุด (31.18 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม น้ำหนักแห้ง) มีปริมาณแคลเซียม 2.77 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม น้ำหนักแห้ง ในขณะที่มีปริมาณกลูตาเมตน้อยที่สุด (580.88 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม น้ำหนักแห้ง) โดยพบว่า การแช่ข้าวในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ (1 มิลลิโมลาร์ต่อลิตร, pH 5) ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส นาน 8 ชั่วโมง มีผลทำให้ปริมาณ GABA และมีปริมาณแคลเซียมสูงขึ้นประมาณ 3 เท่า และ 0.5 เท่า ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวกล้องหอมมะลิ 105 ที่ไม่ผ่านการแช่ (GABA ~10.55 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม น้ำหนักแห้ง และปริมาณแคลเซียม 1.9 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม น้ำหนักแห้ง)

วรณช ศรีเจษฎารักษ์ (2551) ได้มีการศึกษาหาวิธีการงอกแบบใหม่ นั่นคือการงอกทั้งเปลือก ที่ทำให้ได้สาร GABA สูงขึ้น ในพันธุ์ข้าวหลายชนิด ซึ่งพันธุ์ข้าวที่พบว่าสามารถให้สาร GABA สูงที่สุด คือ ข้าวมะลิแดง โดยการนำข้าวเปลือกมะลิแดงมาแช่น้ำ ที่อุณหภูมิ 35-40 °ซ เวลา 10-12 ชั่วโมง จากนั้นนำมาเพาะงอกในความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 95 % ที่อุณหภูมิ 35-40 °C เวลา 30-35 ชั่วโมง นำมาอบแห้ง กะเทาะเอาเปลือกออก ผลที่ได้พบว่า ข้าวมะลิแดง มีสาร GABA เพิ่มขึ้น เป็น 12 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม น้ำหนักแห้ง มากกว่าข้าวทุกสายพันธุ์ ที่เคยนำมาทำข้าวกล้องงอก ไม่ว่าจะเป็น ข้าวขาวดอกหอมมะลิ 105 ข้าวชัยนาท ข้าวคลองหลวง กข.6 และข้าวเหนียวดำ ข้อดีของการทำข้าวกล้องงอกแบบงอกทั้งเปลือก คือ ดี

ข้าวจะสวยกว่าข้าวกล้องงอกทั่วไป รสชาติดี กรอบกรอบ หวานมัน นอกจากนี้เวลาแกะเทาะเปลือกงอกได้เมล็ดข้าวเต็มสูง ปริมาณข้าวหักน้อยกว่ากะเทาะเปลือกที่ไม่ผ่านการงอก

กมลวรรณ แจ่มชัด (2551) ที่ปรึกษาคณะวิจัย และอาจารย์ประจำ พร้อมด้วยนักวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ศิริภัทร์ จันทรอร่าม และ จุไรพร แก้วศรีทอง จากภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรม การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาแนวคิดของผลิตภัณฑ์ 3 ชนิด คือ กระทงทองทาร์ตและแครกเกอร์ จากแป้งข้าวกล้องงอก โดยใช้ภูมิปัญญาไทยจากรูปแบบของกระทงทองผสมกับความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ด้านสมบัติต่างๆ ของแป้งข้าวเจ้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ ใหม่ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ผ่านการพัฒนาสูตรสามารถใช้แป้งข้ากล้องงอกได้ 100 % และใช้ไฮโดรคอลลอยล์ช่วย ปรับปรุงเนื้อสัมผัส และพัฒนากรรมวิธีการผลิตโดยใช้วิธีการอบในสภาวะที่เหมาะสมแทนการทอด จน สามารถผลิตได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอม รสชาติดี และมีเนื้อสัมผัสกรอบ ไม่แข็งกระด้าง ที่สำคัญยังทำ ให้ไขมันลดลงถึง 50 % เมื่อเปรียบเทียบกับกระทงทอง สามารถเก็บได้นานประมาณ 5 เดือน

สถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(2552) ทำการพัฒนา ไอศกรีมจากน้ำข้าวกล้องงอก สำหรับไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาจากข้าวกล้องงอก ปรับปรุงจากสูตรไอศกรีมกะทิสด โดยลดปริมาณกะทิสดและใช้น้ำข้าวกล้องงอกแทน ผสมกับน้ำตาลทราย ตามสัดส่วนที่พอเหมาะ รวมทั้งใช้วัตถุดิบจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองชนิดต่าง ๆ ที่ผ่านการวิเคราะห์คุณค่าทาง โภชนาการมาแล้ว ได้แก่ ข้าวสังข์หยด ข้าวเหนียวดำ (ข้าวกล้องดำ) ข้าวฮาง (ข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว กข 6 นี้) ข้าวเหลืองปะทิว ข้าวเจ้าเส้าไห้ ทั้งหมดเป็นข้าวกล้องที่ผ่านการสีมาไม่นานหรือใช้ข้าวกล้องสด โดย เพาะข้าวกล้องงอกก่อน จากนั้นทำเป็นน้ำข้าวกล้องงอก นำน้ำข้าวกล้องงอกไปผสมกับกะทิตันสดและน้ำ ตามสูตร จากนั้นนำไปปั่นไอศกรีมด้วยเครื่องปั่น โดยส่วนผสมของไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอกจะเน้นวัตถุดิบ จากข้าวทั้งหมด โดยอาจเติมรำข้าวที่คั่วให้หอมและปั่นเป็นผงละเอียดหรือเติมส่วนประกอบของข้าวเหนียว ลงไปในข้าวเจ้า หรือทำไอศกรีมจากข้าวเม่าควรใช้ข้าวเม่าสด เพื่อลดกลิ่น เป็นต้น

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

3.1 วัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ์

3.1.1 วัตถุดิบ

3.1.1.1 ข้าวกล้องงอก ตรา ปิ่นเงิน การเตรียมข้าวกล้องงอก มีดังนี้

- บัวย่อยข้าวกล้องงอกและลดช่องข้าวกล้องงอก ใช้ข้าวกล้องงอกพรีเมียม

วิธีเตรียมข้าวกล้องงอกพรีเมียม โดยนำข้าวกล้องงอก 200 กรัม แช่น้ำ 300 ml. ทิ้งไว้ 1 คืน จากนั้นนำไปต้ม เป็นเวลา 20 นาที และนำไปปั่นให้ละเอียด จนเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้ข้าวกล้องงอกพรีเมียม

- เติ๋ยข้าวกล้องงอก ใช้ข้าวกล้องงอก

วิธีเตรียมข้าวกล้องงอก นำข้าวกล้องงอก 200 กรัม แช่น้ำ 300 ml. ทิ้งไว้ 1 คืน นำข้าวกล้องงอกมากรองเอาน้ำออก นำมาปั่นกับน้ำ 2 ลิตร เป็นเวลา 1 นาที กรองกากทิ้งไป ต่อมานำไปตุ๋น ที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส นาน 15 วินาที คนให้เข้ากัน จะได้ข้าวกล้องงอก

3.1.1.2 แป้งข้าวเจ้า ตรา ช้างสามเศียร

3.1.1.3 แป้งข้าวเหนียว ตรา ช้างสามเศียร

3.1.1.4 แป้งมัน ตรา ปลาไทย 5 ดาว

3.1.1.5 ผงวุ้น ตรา นางเงือก

3.1.1.6 เกลาตินผง

3.1.1.7 น้ำปูนใส

3.1.1.8 ใบเตยหอม

3.1.1.9 น้ำตาลทราย ตราวังขนาย ผลิตโดยบริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด

3.1.1.10 น้ำตาลมะพร้าว

3.1.1.11 นมสดรสจืด ตรา สวนจิตรดา

3.1.1.12 กะทิคั้นสด จากตลาดสดเทศบาล

3.1.1.13 นมข้นจืดระเหย ตรา F&N

3.1.1.14 นมข้นหวาน ตรา F&N

3.1.1.15 วานิลาน้ำ ตรา วินเนอร์

3.1.1.16 เกลือ ตรา ประทีป

3.1.1.17 เทียนอบขนม

3.1.1.18 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ขนมหวานแช่แข็งที่อุณหภูมิ -18°C ตรา S&P

3.1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

3.1.2.1 ตู้อบลมร้อน ยี่ห้อ BINDER รุ่น FED 720

3.1.2.2 กระดาษทองเหลือง

3.1.2.3 เครื่องชั่งดิจิตอล 4 ตำแหน่ง รุ่น Dragon 204

3.1.2.4 เครื่องชั่งดิจิตอล 2 ตำแหน่ง รุ่น HG series

3.1.2.5 Thermometer วัดอุณหภูมิ

3.1.2.6 ตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส รุ่น HLLF-205 ยี่ห้อ HETO ผลิตจากประเทศ

ไทย

3.1.2.7 ตู้แช่เย็น อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

3.1.2.8 เตามิโครเวฟ

3.1.2.9 ถ้วยพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ชนิดมีฝาปิดสนิท ขนาด 4 ออนซ์

3.2 อุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์คุณภาพ

3.2.1 อุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ

3.2.1.1 เครื่องวัดค่าสี Spectrophotometer CM-3500d

3.2.1.2 เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ (A_w) AQUALAB รุ่น SERIES PE 06069336B

3.2.1.3 Refractometer Brix RHB-32ATC Milwaukee

3.2.2 อุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี

3.2.2.1 เครื่องวัดความชื้นแบบอินฟราเรด Moisture Determination Balance FD-620

3.2.3 อุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์

3.2.3.1 ตู้อบลมร้อนสำหรับฆ่าเชื้อ (Hot air Oven) Binder รุ่น FD 115

3.2.3.2 หม้ออัดความดัน (Autoclave) sanyo รุ่น lado Autoclave

3.2.3.3 ตู้ปลอดเชื้อ Heal Forec รุ่น A2

3.2.3.4 อาหารเลี้ยงเชื้อ (PDA) สำหรับวิเคราะห์เชื้อราและยีสต์

3.2.3.5 อาหารเลี้ยงเชื้อ (PCA) สำหรับวิเคราะห์จุลินทรีย์ทั้งหมด

3.2.3.6 จานเพาะเชื้อที่ปลอดเชื้อ

3.2.3.7 ปิเปตขนาด 1 มล. ที่ปลอดเชื้อ

3.2.3.8 ปีกเกอร์ขนาด 50 ml

3.2.3.9 แอลกอฮอล์

3.2.3.10 ตะเกียงแอลกอฮอล์

3.2.4 อุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์คุณภาพ

3.2.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์: โปรแกรมสำเร็จรูป

3.2 สถานที่ดำเนินงาน

- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (622) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

3.3 ระยะเวลาในการดำเนินงาน

เดือนตุลาคม 2553 – เดือนกันยายน 2554

3.4 วิธีการทดลอง

3.4.1 บั้วลอยข้าวกล้องงอกแช่แข็ง

3.4.1.1 ศึกษาสูตรพื้นฐานของผลิตภัณฑ์บั้วลอย ศึกษาสูตรพื้นฐานบั้วลอยจำนวน 3 สูตร โดยดัดแปลงจากสูตรผลิตภัณฑ์บั้วลอย จำนวน 3 สูตร คือ สูตรของ รายการ แม่ดอกโสนบานเช้า (2554), ณัฐพงศ์ (2549) และสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว (มปป.) ดังแสดงในตารางที่ 3.1 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) แล้วนำไปทดสอบหาการยอมรับของผู้บริโภค โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (Randomized Complete Block Design, RCBD) ใช้ผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝนครั้งละ 30 คน จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยนำขนมบั้วลอยมาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยมีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 – point hedonic scale) นำผลมาวิเคราะห์หาความแปรปรวน (Analysis of Variance - ANOVA) และวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan's New Multiple's Range test (DMRT) เพื่อนำสูตรที่ดีที่สุดไปพัฒนาปริมาณของข้าวกล้องงอกฟรีเจลดต่อปริมาณแป้งข้าวเหนียวในบั้วลอยข้าวกล้องงอกต่อไป (วิธีทำแสดงดัง ภาคผนวก ก)

ตารางที่ 3.1 แสดงสูตรพื้นฐานที่ใช้ในการผลิตบัวลอย จำนวน 3 สูตร

ส่วนผสม	สูตรที่ (กรัม)		
	1	2	3
ตัวแป้ง			
แป้งข้าวเหนียว	200	400	330
แป้งมัน	10	20	-
น้ำเปล่า	150	450	280
น้ำกะทิ			
หัวกะทิ	600	800	600
หางกะทิ	-	200	-
น้ำตาลทราย	-	200	150
น้ำตาลมะพร้าว	100	20	-
เกลือ	5	7	5

หมายเหตุ: สูตร 1 รายการ แม่ดอกโสนบานเช้า (2554)

สูตร 2 ณัฐพงศ์ (2549)

สูตร 3 สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว (มปป.)

3.4.1.2 ศึกษาปริมาณของข้าวกล้องงอกพรีเจลต่อปริมาณแป้งข้าวเหนียวในบัวลอยข้าว

กล้องงอกที่เหมาะสม โดยศึกษาการเตรียมวัตถุดิบในการผลิตบัวลอยข้าวกล้องงอกจากข้าวกล้องงอกพรีเจลต่อแป้งข้าวเหนียว คัดแปลงสูตรพื้นฐานการผลิตจาก สูตรพื้นฐานสูตรที่ 2 จาก ณัฐพงศ์ (2549) โดยผู้วิจัยต้องการศึกษาปริมาณข้าวกล้องงอกพรีเจลที่เหมาะสมในการผลิตบัวลอยข้าวกล้องงอก (การเตรียมข้าวกล้องงอกพรีเจลจาก ข้อ 3.1.1.1) เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการด้าน วิตามิน สารกาบา และเส้นใยอาหาร ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งปริมาณของข้าวกล้องงอกพรีเจลต่อปริมาณแป้งข้าวเหนียวมีผลต่อการผลิตในด้าน สี รสชาติ กลิ่น และลักษณะเนื้อสัมผัส โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) ซึ่งใช้ปริมาณข้าวกล้องงอกพรีเจลต่อแป้งข้าวเหนียว 3 ระดับ คือ 75:25, 70:30 และ 65:35 ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 3.2 แล้วนำไปทดสอบหาการยอมรับของผู้บริโภค วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (Randomized Complete Block Design, RCBD) ใช้ผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝนครั้งละ 30 คน จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยนำบัวลอยข้าวกล้องงอกมาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยมีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 – point hedonic scale) นำผลมาวิเคราะห์หาความแปรปรวน (Analysis of Variance - ANOVA) และวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan's New Multiple's

Range test (DMRT) เพื่อนำสูตรที่ดีที่สุดไปศึกษาปริมาณน้ำตาลทรายต่อน้ำที่ใช้ทำน้ำเชื่อมในการต้มเม็ดบัวลอยข้าวกลิ้งงอกต่อไป

ตารางที่ 3.2 แสดงปริมาณข้าวกลิ้งงอกพรีเจลต่อแป้งข้าวเหนียวจำนวน 3 สูตร

ส่วนผสม	น้ำหนักส่วนผสม (กรัม)		
	สูตรที่ 1	สูตรที่ 2	สูตรที่ 3
ข้าวกลิ้งงอกพรีเจล	75	70	65
แป้งข้าวเหนียว	25	30	35

3.4.1.3 ศึกษาปริมาณของน้ำตาลทรายต่อน้ำที่ใช้ทำน้ำเชื่อมในการต้มเม็ดบัวลอยข้าวกลิ้งงอกที่เหมาะสม จากการศึกษาปริมาณของข้าวกลิ้งงอกพรีเจลต่อปริมาณแป้งข้าวเหนียวในบัวลอยข้าวกลิ้งงอก มีข้อเสนอแนะจากผู้ทดสอบว่า รสชาติของเม็ดบัวลอยจัดเกินไป เมื่อรับประทานกับน้ำกะทิ จึงมาศึกษาปริมาณของน้ำตาลทรายต่อน้ำที่ใช้ทำน้ำเชื่อมในการต้มเม็ดบัวลอยข้าวกลิ้งงอก ซึ่งมีผลทำให้เม็ดบัวลอยรสชาติหวานขึ้น โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) โดยใช้ปริมาณน้ำตาลทรายต่อน้ำ ที่ 3 ระดับ คือ 5:95, 10:90 และ 15:85 ตามลำดับ แสดงดังตารางที่ 3.3 แล้วนำไปทดสอบหาการยอมรับของผู้บริโภค วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (Randomized Complete Block Design, RCBD) ใช้ผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝนครั้งละ 30 คน จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยนำบัวลอยข้าวกลิ้งงอกมาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยมีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 – point hedonic scale) นำผลมาวิเคราะห์หาความแปรปรวน (Analysis of Variance - ANOVA) และวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan's New Multiple's Range test (DMRT) นำสูตรที่ดีที่สุดไปศึกษาการแช่แข็งและการละลายหลังการแช่แข็งของบัวลอยข้าวกลิ้งงอก ในการแช่แข็งที่อุณหภูมิ -18°C ต่อไป

ตารางที่ 3.3 แสดงปริมาณน้ำตาลทรายต่อน้ำในน้ำเชื่อมที่ใช้ในการต้มเม็ดบัวลอย

ส่วนผสม	น้ำหนักส่วนผสม (กรัม)		
	สูตรที่ 1	สูตรที่ 2	สูตรที่ 3
น้ำตาลทราย	5	10	15
น้ำ	95	90	85

3.4.1.4 ศึกษากรรมวิธีการละลายหลังการแช่แข็งของผลิตภัณฑ์บัวลอยข้าวกลิ้งงอกที่เหมาะสมในการแช่แข็งที่อุณหภูมิ -18°C จากการศึกษาผลิตภัณฑ์บัวลอยข้าวกลิ้งงอกที่ผ่านการพัฒนา จึงนำมาศึกษากรรมวิธีการละลายหลังการแช่แข็งของผลิตภัณฑ์บัวลอยข้าวกลิ้งงอกที่เหมาะสม เพื่อเป็นวิธีการอุ่นก่อนรับประทาน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) โดยการนำผลิตภัณฑ์บัวลอยข้าวกลิ้งงอกที่ผ่านการแช่แข็งที่อุณหภูมิ -18°C ใช้กรรมวิธีนำเข้าเตาไมโครเวฟ (900 วัตต์) ตั้งความร้อนสูงสุด และนำออกมาคนเล็กน้อยก่อนหมดเวลา 30 วินาทีก่อนหมดเวลา (วิธีการจากผลิตภัณฑ์ขนมหวานแช่แข็งที่อุณหภูมิ -18°C ตรา S&P) ซึ่งใช้ระยะเวลาในการให้ความร้อนที่ 3 ระดับ คือ 1 นาที 30 วินาที, 2 นาที และ 2 นาที 30 วินาที ตามลำดับ แล้วนำไปทดสอบหาการยอมรับของผู้บริโภค วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (Randomized Complete Block Design, RCBD) ใช้ผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝนครั้งละ 30 คน จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยนำบัวลอยข้าวกลิ้งงอมาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยมีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 – point hedonic scale) นำผลมาวิเคราะห์หาความแปรปรวน (Analysis of Variance - ANOVA) และวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan's New Multiple's Range test (DMRT) นำสูตรที่ดีที่สุดไปศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะคุณภาพของผลิตภัณฑ์บัวลอยข้าวกลิ้งงอระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18°C ต่อไป

3.4.1.5 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะคุณภาพของผลิตภัณฑ์บัวลอยข้าวกลิ้งงอระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18°C ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์บัวลอยข้าวกลิ้งงอระหว่างการเก็บรักษา โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกจากการทดลองที่ผ่านมา ซึ่งบรรจุใส่ด้วยพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ชนิดมีฝาปิดสนิท ขนาด 4 ออนซ์ (ที่อุณหภูมิ -20 ถึง 120 องศาเซลเซียส) และนำไปเก็บเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 4 เดือน สุ่มตัวอย่างมาทดสอบทุก 2 สัปดาห์ คือ สัปดาห์ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 และ 16 โดยนำผลิตภัณฑ์บัวลอยข้าวกลิ้งงอที่ผ่านการศึกษากกรรมวิธีการละลายหลังการแช่แข็งของผลิตภัณฑ์บัวลอยข้าวกลิ้งงอที่เหมาะสม มาประเมินคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเก็บที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยทดสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของบัวลอยข้าวกลิ้งงอก

- วัดปริมาณของแข็งที่ละลาย (องศาบริกซ์)
- ตรวจวัดสี ด้วยเครื่องวัดสี Spectrophotometer

2. การวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยวางแผนการทดลองเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง 2 ตัวอย่าง ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ (Pair Sample T-Test) ใช้ผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝนครั้งละ 30 คน จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยนำบัวลอยข้าวกล็องงอก แซ่แข็งที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 4 เดือน กลุ่มตัวอย่างมาทดสอบทุก 2 สัปดาห์ คือ สัปดาห์ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 และ 16 โดยทำการทดสอบเปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุม ซึ่งเป็นตัวอย่างสูตรเดียวกันที่เตรียมใหม่ก่อนการทดสอบ นำมาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยมีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 – point hedonic scale) นำผลมาวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการทดสอบ T-test โดยใช้ตัวอย่างที่บรรจุในถ้วยพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ชนิดมีฝาปิดสนิท ขนาด 4 ออนซ์ (ดังแสดงในภาคผนวก ก)

3.4.2 เค้าสวยข้าวกล็องงอก

3.4.2.1 ศึกษาหาสูตรพื้นฐานของเค้าสวยนมสดจำนวน 3 สูตร โดยดัดแปลงจากสูตรเค้าสวยนมสด จำนวน 3 สูตร คือ สูตรของ กัสซี่(2549), อุบล(มปป.) และจากนส.ปวีตรา เมฆภูวดล ในรายวิชา เทคโนโลยีขนมหวาน ประจำปีการศึกษา 2553 ดังแสดงในตารางที่ 3.4 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) แล้วนำไปทดสอบหาการยอมรับของผู้บริโภค โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (Randomized Complete Block Design, RCBD) ใช้ผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝนครั้งละ 30 คน จำนวน 2 ซ้ำ ซึ่งเป็นอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทดสอบทางประสาทสัมผัส ดังแสดงในตารางที่ 4 นำมาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ใช้ผู้ทดสอบครั้งละ 30 คน จำนวน 2 ซ้ำ โดยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 – point hedonic scale) โดยนำเค้าสวยนมสด แซ่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 วัน นำมาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น โดยรวม รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยมีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 – point hedonic scale) นำผลมาวิเคราะห์หาความแปรปรวน (Analysis of Variance - ANOVA) และวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan's New Multiple's Range test (DMRT) เพื่อนำสูตรที่ดีที่สุดไปพัฒนาเค้าสวยข้าวกล็องงอกต่อไป (วิธีทำแสดงดัง ภาคผนวก ก)

ตารางที่ 3.4 ส่วนผสมเต้าหอยนมสดในการคัดเลือกสูตรพื้นฐาน

ส่วนผสม	ปริมาณ (กรัม)		
	สูตรที่ 1	สูตรที่ 2	สูตรที่ 3
นมสด	250	500	550
น้ำ	200	420	420
นมข้นจืด	-	-	245
นมข้นหวาน	-	-	100
น้ำตาลทราย	30	90	16
ผงวุ้น	2	2	4
เจลาตินผง	-	2	5
วานิลาน้ำ	-	5	-

ที่มา : สูตรที่ 1 กัสซี่, 2549

สูตรที่ 2 อุบล, มปป.

สูตรที่ 3 จากนส.ปวีตรา เมฆภูวดล ในรายวิชา เทคโนโลยีขนมหวาน ประจำปีการศึกษา 2553

3.4.2.2 ศึกษาปริมาณของน้ำข้าวกล้องงอกต่อนมสดในเต้าหอยนมสดที่เหมาะสม นำสูตรที่ได้จากการศึกษาสูตรพื้นฐานของเต้าหอยนมสด มาศึกษาปริมาณของน้ำข้าวกล้องงอกต่อนมสดที่เหมาะสมในการผลิตเต้าหอยข้าวกล้องงอก ซึ่งปริมาณของน้ำข้าวกล้องงอกมีผลต่อการผลิตในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และลักษณะเนื้อสัมผัส วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) โดยใช้ปริมาณของน้ำข้าวกล้องงอกต่อนมสด 3 ระดับ คือ 60:40, 80:20 และ 100:0 ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 3.5 แล้วนำไปทดสอบหาการยอมรับของผู้บริโภค โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (Randomized Complete Block Design, RCBD) ใช้ผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝนครั้งละ 30 คน จำนวน 2 ซ้ำ ซึ่งเป็นอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยนำเต้าหอยข้าวกล้องงอก แช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 วัน นำมาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยมีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 – point hedonic scale) นำผลมาวิเคราะห์หาความแปรปรวน (Analysis of Variance - ANOVA) และวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan's New Multiple's Range test (DMRT) เพื่อนำสูตรที่ดีที่สุดไปศึกษาปริมาณของสารให้ความคงตัวที่เป็นสารที่ทำให้เกิดเจลในผลิตภัณฑ์เต้าหอยข้าวกล้องงอกต่อไป

ตารางที่ 3.5 แสดงปริมาณน้ำข้าวกล้องงอกต่อนมสดจำนวน 3 สูตร

ส่วนผสม	ปริมาณส่วนผสมของแต่ละอัตราส่วน (กรัม)		
	60 : 40	80 : 20	100 : 0
น้ำข้าวกล้องงอก	330	440	550
นมสด	220	110	0
น้ำ	420	420	420
นมข้นจืด	245	245	245
นมข้นหวาน	100	100	100
น้ำตาลทราย	16	16	16
ผงวุ้น	4	4	4
เจลาตินผง	5	5	5

3.4.2.3 ศึกษาปริมาณของสารให้ความคงตัวที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์เต้าหู้ยข้าวกล้องงอก

จากการศึกษาปริมาณของน้ำข้าวกล้องงอกต่อนมสดในเต้าหู้ยนมสด มีข้อเสนอแนะจากผู้ทดสอบว่า ลักษณะเนื้อสัมผัสของเต้าหู้ยข้าวกล้องงอกมีเนื้อหยาบ เมื่อใช้ช้อนตักเนื้อที่ได้มีลักษณะเป็นเม็ดๆ ตักไปเรื่อยๆจะกลายเป็นของเหลวข้น หนืด ไม่น่ารับประทาน ซึ่งน่าจะเกิดจากสารให้ความคงตัวในเต้าหู้ยข้าวกล้องงอก โดยสารในความคงตัวมีผลทำให้เกิดโครงสร้างของเจลในเต้าหู้ยข้าวกล้องงอก จึงมาศึกษาปริมาณของสารให้ความคงตัวที่เหมาะสมในเต้าหู้ยข้าวกล้องงอก ระหว่างสารให้ความคงตัว 2 ชนิด คือ ผงวุ้นกับเจลาตินผง ซึ่งวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) โดยใช้ปริมาณสารให้ความคงตัวของผงวุ้นกับเจลาตินผง ที่ 3 ระดับ คือ 100:0, 0:100 และ 50:50 ตามลำดับ แสดงดังตารางที่ 3.6 แล้วนำไปทดสอบหาการยอมรับของผู้บริโภค โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (Randomized Complete Block Design, RCBD) ใช้ผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝนครั้งละ 30 คน จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยนำเต้าหู้ยข้าวกล้องงอก แช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 วัน นำมาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยมีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 – point hedonic scale) นำผลมาวิเคราะห์หาความแปรปรวน (Analysis of Variance - ANOVA) และวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan's New Multiple's Range test (DMRT) เพื่อนำสูตรที่ดีที่สุดไปวิเคราะห์คุณสมบัติ และศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์เต้าหู้ยข้าวกล้องงอกระหว่างการเก็บรักษาต่อไป

ตารางที่ 3.6 แสดงปริมาณของผงวุ้น: เจลาตินผงในเต้าฮวยข้าวกล็องงอก

ส่วนผสม	น้ำหนักส่วนผสม (กรัม)		
	100 : 0	50:50	0:100
น้ำข้าวกล็องงอก	550	550	550
น้ำ	420	420	420
นมข้นจืด	245	245	245
นมข้นหวาน	100	100	100
น้ำตาลทราย	16	16	16
ผงวุ้น	9	4.5	0
เจลาตินผง	0	4.5	9

3.4.2.4 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะคุณภาพของผลิตภัณฑ์เต้าฮวยข้าวกล็องงอก

ระหว่างการเก็บรักษา ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์เต้าฮวยข้าวกล็องงอก ระหว่างการเก็บรักษา โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกจากการทดลองที่ผ่านมา บรรจุลงในถ้วยพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ชนิดมีฝาปิดสนิท ขนาด 4 ออนซ์ พร้อมฝาปิด(ผนึกสนิท) ชนระร้อน และนำไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 1 เดือน และสุ่มตัวอย่างมาทดสอบทุก 1 สัปดาห์ คือ 1, 2, 3 และ 4 ประเมินคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยทดสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของเต้าฮวยข้าวกล็องงอก

- วัดปริมาณของแข็งที่ละลาย (องศาบริกซ์)
- ตรวจวัดสี ด้วยเครื่องวัดสี Spectrophotometer

2. การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของเต้าฮวยข้าวกล็องงอก

- วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

3. การวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยวางแผนการทดลองเป็นการเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง 2 ตัวอย่าง ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ (Pair Sample T-Test) ใช้ผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝนครั้งละ 30 คน จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยนำเต้าฮวยข้าวกล็องงอก แช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 เดือน ทำการสุ่มตัวอย่างมาทดสอบทุก 1 สัปดาห์ คือ 1, 2, 3 และ 4 โดยทำการทดสอบเปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุม ซึ่งเป็นตัวอย่างสูตรเดียวกันที่เตรียมใหม่ 1 วัน ก่อนการทดสอบ โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 วัน นำมาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น

รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยมีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 – point hedonic scale) นำผลมาวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการทดสอบ T-test โดยใช้ตัวอย่างที่บรรจุในถ้วยพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ชนิดมีฝาปิดสนิท ขนาด 4 ออนซ์ พร้อมฝาปิด(ผนึกสนิท) (ดังแสดงในภาคผนวก ก) กำหนดรายละเอียดในการทดสอบ ดังนี้

- สี หมายถึง สีของผลิตภัณฑ์
- กลิ่น หมายถึง กลิ่นของผลิตภัณฑ์ขณะทดสอบ
- รสชาติ หมายถึง รสชาติโดยรวมต่อผลิตภัณฑ์
- ลักษณะเนื้อสัมผัส หมายถึง ลักษณะความเป็นเจลของผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบด้วยการใช้ช้อนตักดู และยังคงความเป็นเจลที่สามารถรู้สึกได้ภายในปากขณะบริโภค
- ความชอบโดยรวม หมายถึง ความชอบที่มีต่อผลิตภัณฑ์

4. การวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ โดยตรวจหาปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ต้องไม่เกิน 5×10^4 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม และตรวจหาปริมาณ *Escherichia coli* ต้องไม่พบในตัวอย่าง 1 กรัม โดยใช้ตัวอย่างที่บรรจุในถ้วยพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ชนิดมีฝาปิดสนิท ขนาด 4 ออนซ์ พร้อมฝาปิด(ผนึกสนิท) (ดังแสดงในภาคผนวก ก)

3.4.3 ลดช่องว่างกล่องออก

3.4.3.1 ศึกษาอัตราส่วนของข้าวกล้องงอกต่อการนำในการพรีเจล กับ ปริมาณแป้งข้าวเหนียว ในกระบวนการผลิตบัวลอยข้างกลิ้ง โดยวางแผนการทดลองแบบ Factorial in Rcbd โดยศึกษาอัตราส่วนของข้าวกล้องงอกต่อการนำในการพรีเจล 2 ระดับที่ 2:2 และ 2:3 กับปริมาณแป้งข้าวเหนียว 3 ระดับที่ 80, 90 และ 100 กรัม แสดงดังตารางที่ 3.7 ภาคผนวก ก นำบัวลอยที่ได้มาทำการ จากนั้นนำบัวลอยไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน สี กลิ่น รสชาติ ความนุ่ม ความเหนียว และความชอบโดยรวม ใช้ผู้ทดสอบครั้งละ 30 คน จำนวน 2 ซ้ำ โดยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 – point hedonic scale)

ตารางที่ 3.7 ร้อยละของแป้งข้าวกล้องงอกต่อแป้งข้าวเจ้า

ส่วนผสม	ร้อยละของแป้งข้าวกล้องงอกต่อแป้งข้าวเจ้า (%)		
	50	60	70
ข้าวกล้องงอก	6.0	7.2	8.4
แป้งข้าวเจ้า	6.0	4.8	3.6
แป้งมัน	6.0	6.0	6.0
น้ำปูนใส	82.0	82.0	82.0

3.4.3.2 ศึกษาระยะเวลาในการกวนส่วนผสมที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตลอดช่องข้าวกลิ้ง โดยวางแผนการทดลองแบบ Rcbd โดยศึกษาระยะเวลาในการกวนส่วนผสมเหมาะสมในกระบวนการผลิตลอดช่องข้าวกลิ้งงอก 3 ระดับที่ 20 30 และ 40 นาที นำลอดช่องที่ได้มาทำการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน สี กลิ่น รสชาติ ความนุ่ม ความเหนียว และความชอบโดยรวม ใช้ผู้ทดสอบครั้งละ 30 คน จำนวน 2 ซ้ำ โดยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 – point hedonic scale)

3.4.3.3 ศึกษาอายุการเก็บรักษา โดยทำการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่ระยะเวลาการเก็บ 4 สัปดาห์

นำลอดช่องข้าวกลิ้งงอกที่พัฒนาได้มาบรรจุด้วยพลาสติกขณะร้อนปิดฝา เก็บรักษาในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ สุ่มทุกสัปดาห์ โดยนำลอดช่องข้าวกลิ้งงอกมาวัดคุณภาพในด้านกายภาพ ได้แก่ การวัดค่าสี Brix และทางด้านจุลินทรีย์ ได้แก่ ตรวจหาปริมาณยีสต์ รา และอีโคไล โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar (PDA) โดยวิธีการ Pour plate และวัดคุณภาพทางประสาทสัมผัส ใช้ผู้ทดสอบครั้งละ 30 คน จำนวน 2 ซ้ำ โดยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 – point hedonic scale)

บทที่ 4

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

4.1 บัวลอยข้าวกล้องงอกแช่แข็ง

4.1.1 ผลจากการศึกษาหาสูตรพื้นฐานของผลิตภัณฑ์บัวลอย

จากการศึกษาหาสูตรพื้นฐานผลิตภัณฑ์บัวลอยโดยดัดแปลงจากสูตรบัวลอย จำนวน 3 สูตร คือ สูตรของ รายการ แม่ดอกโสนบานเช้า (2554), ญัฐพงศ์ (2549) และสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว (มปป.) สูตรบัวลอยทั้ง 3 สูตร จากการนำไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม พบว่า สูตรพื้นฐานของบัวลอยมีผลต่อความชอบในด้านต่างๆ กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ($p \leq 0.05$) แสดงดังตารางที่ 4.1 โดยสูตรที่ 2 มีความชอบด้าน กลิ่นโดยรวม รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ผู้บริโภคให้การยอมรับสูงที่สุด ส่วนคะแนนความชอบด้านสี ในสูตรที่ 3 ผู้บริโภคให้ความยอมรับมากที่สุด เนื่องจากในส่วนผสมไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลมะพร้าว ทำให้สีขาวน่ารับประทาน จึงทำให้ผู้บริโภคให้ความยอมรับสูงที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 4.1 โดยผลิตภัณฑ์บัวลอยสูตรที่ 2 ผู้บริโภคให้การยอมรับเฉลี่ยสูงที่สุดส่วนใหญ่ในทุกด้าน จึงนำสูตรนี้มาศึกษาหาปริมาณของข้าวกล้องงอกฟรีเจลต่อปริมาณแป้งข้าวเหนียวในบัวลอยข้าวกล้องงอกต่อไป

ตารางที่ 4.1 แสดงผลการศึกษาสูตรพื้นฐานทั้ง 3 สูตร

คุณภาพ	สูตร 1	สูตร 2	สูตร 3
สี	5.33±0.15 ^c	6.47±0.15 ^b	7.63±0.93 ^a
กลิ่น	6.47±1.04 ^b	7.63±0.93 ^a	5.33±1.94 ^c
รสชาติ	5.70±1.18 ^b	7.07±1.04 ^a	6.20±1.19 ^b
ลักษณะเนื้อสัมผัส	6.57±1.07 ^b	7.43±1.41 ^a	6.23±0.86 ^b
ความชอบโดยรวม	6.00±1.11 ^b	6.97±1.19 ^a	6.03±1.27 ^b

หมายเหตุ: อักษรที่ต่างกันในแนวนอนหมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ($p \leq 0.05$)

4.1.2 ผลจากการศึกษาปริมาณของข้าวกล้องงอกฟรีเจลต่อปริมาณแป้งข้าวเหนียวในบัวลอยข้าวกล้องงอกที่เหมาะสม

นำสูตรที่ได้จากการศึกษาสูตรพื้นฐานที่เหมาะสม ไปทำการศึกษาปริมาณของข้าวกล้องงอกฟรีเจลต่อปริมาณแป้งข้าวเหนียวในบัวลอยข้าวกล้องงอกที่เหมาะสม ซึ่งปริมาณของข้าวกล้องงอกมีผลต่อการผลิตในด้าน สี รสชาติ กลิ่น ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยทำการทดลองปริมาณของข้าวกล้องงอกฟรีเจลต่อแป้งข้าวเหนียว 3 ระดับ คือ 75:25, 70:30 และ 65:35 ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 3.2 เพื่อ

หาปริมาณของข้าวกล้องงอกพรีเจลต่อปริมาณแป้งข้าวเหนียวในบั่วลอยข้าวกล้องงอกที่เหมาะสมในการผลิตบั่วลอยข้าวกล้องงอก

ตารางที่ 4.2 แสดงผลการศึกษาปริมาณของข้าวกล้องงอกพรีเจลต่อปริมาณแป้งข้าวเหนียวในบั่วลอยข้าวกล้องงอกที่เหมาะสม

คุณลักษณะ	ปริมาณข้าวกล้องงอกพรีเจลต่อแป้งข้าวเหนียว (กรัม)		
	75:25	70:30	65:35
สี	7.67 ± 0.12^a	7.30 ± 0.17^b	6.73 ± 0.24^b
กลิ่น	7.03 ± 0.65^a	6.10 ± 0.44^b	5.53 ± 0.32^c
รสชาติ	7.43 ± 0.43^a	6.30 ± 0.76^b	4.97 ± 0.29^c
ลักษณะเนื้อสัมผัส	7.23 ± 0.54^a	6.30 ± 0.54^b	4.80 ± 0.32^c
ความชอบโดยรวม	7.47 ± 0.35^a	6.43 ± 0.66^b	5.03 ± 0.43^c

หมายเหตุ: อักษรที่ต่างกันในแนวนอนหมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ($p \leq 0.05$)

จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของปริมาณข้าวกล้องงอกพรีเจลต่อแป้งข้าวเหนียว ทั้ง 3 ระดับ พบว่า ปริมาณของข้าวกล้องงอกพรีเจลที่แตกต่างกันมีผลต่อความชอบในด้านต่างๆกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่($p \leq 0.05$) ดังตารางที่ 4.2 โดยการใช้ปริมาณข้าวกล้องงอกพรีเจลต่อแป้งข้าวเหนียว ที่ 75: 25 กรัม ผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุดในทุกๆด้าน โดยลักษณะเนื้อสัมผัสที่ปริมาณข้าวกล้องงอกพรีเจลต่อแป้งข้าวเหนียวที่ระดับ 75: 25 ผู้บริโภคมีข้อเสนอแนะว่า มีลักษณะเนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่ม นีบ กว่าสูตรปริมาณข้าวกล้องงอกพรีเจลต่อแป้งข้าวเหนียวที่ระดับ 70:30 และ 65:35 แสดงว่าปริมาณข้าวกล้องงอกพรีเจลมีผลต่อความชอบในด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์บั่วลอยข้าวกล้องงอก สูตรปริมาณข้าวกล้องงอกพรีเจลต่อแป้งข้าวเหนียวที่ระดับ 70:30 และ 65:35 มีลักษณะเนื้อสัมผัสแห้งในขณะปั่นเป็นเม็ดบั่วลอยกว่าสูตรที่ระดับ 75: 25 ตามลำดับ และสูตรที่ระดับ 75: 25 มีปริมาณของข้าวกล้องงอกที่มากที่สุด จึงเลือกสูตรที่ระดับ 75: 25 จึงนำไปทำการศึกษาริมาณน้ำตาลทรายต่อน้ำที่ใช้ทำน้ำเชื่อมในการต้มเม็ดบั่วลอยข้าวกล้องงอกต่อไป

4.1.3 ผลการศึกษาปริมาณของน้ำตาลทรายต่อน้ำที่ใช้ทำน้ำเชื่อมในการต้มเม็ดบั่วลอยข้าวกล้องงอกที่เหมาะสม นำสูตรที่ได้จากการศึกษาปริมาณของข้าวกล้องงอกพรีเจลต่อปริมาณแป้งข้าวเหนียวในบั่วลอยข้าวกล้องงอกที่เหมาะสม ไปทำการศึกษาริมาณของน้ำตาลทรายต่อน้ำที่ใช้ทำน้ำเชื่อมในการต้มเม็ดบั่วลอยข้าวกล้องงอก ซึ่งปริมาณของน้ำตาลทรายต่อน้ำที่ใช้ทำน้ำเชื่อมในการต้มเม็ดบั่วลอยข้าวกล้องงอก มีผลต่อการผลิตในด้าน รสชาติ และความชอบโดยรวม โดยทำการทดลองปริมาณของน้ำตาลทรายต่อน้ำที่ใช้ทำน้ำเชื่อม 3 ระดับ คือ 5:95, 10:90 และ 15:85 ตามลำดับ แสดงดังตารางที่ 3.3 เพื่อหาปริมาณน้ำตาลทรายต่อน้ำที่ใช้ทำน้ำเชื่อมในการต้มเม็ดบั่วลอยข้าวกล้องงอกที่เหมาะสมในการผลิตบั่วลอยข้าวกล้องงอก

ตารางที่ 4.3 แสดงผลการศึกษาปริมาณของน้ำตาลทรายต่อน้ำที่ใช้ทำน้ำเชื่อมในการต้มเมล็ดบัวลอยข้าวกลิ้งงอกที่เหมาะสม

คุณลักษณะ	ปริมาณน้ำตาลทรายต่อน้ำ (กรัม)		
	5:95	10:90	15:85
สี	7.06 ± 0.12 ^a	6.83 ± 0.16 ^b	6.13 ± 0.16 ^c
กลิ่น	7.37 ± 0.19 ^a	6.90 ± 0.15 ^b	6.33 ± 0.15 ^b
รสชาติ	7.37 ± 0.19 ^a	6.57 ± 0.19 ^b	6.27 ± 0.19 ^b
ลักษณะเนื้อสัมผัส	7.37 ± 0.14 ^a	6.53 ± 0.14 ^b	6.10 ± 0.14 ^c
ความชอบโดยรวม	7.80 ± 0.13 ^a	6.63 ± 0.13 ^b	6.23 ± 0.13 ^c

หมายเหตุ: อักษรที่ต่างกันในแนวนอนหมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ($p \leq 0.05$)

จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของปริมาณของน้ำตาลทรายต่อน้ำที่ใช้ทำน้ำเชื่อมในการต้มเมล็ดบัวลอยข้าวกลิ้งงอก ทั้ง 3 ระดับ พบว่า ปริมาณของน้ำตาลทรายที่แตกต่างกันมีผลต่อความชอบในด้านต่างๆกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่($p \leq 0.05$) ดังตารางที่ 4.3 โดยการใช้ปริมาณน้ำตาลทรายต่อน้ำ ที่ระดับ 5:95 ผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุดในทุกๆด้าน โดยรสชาติที่ปริมาณน้ำตาลทรายต่อน้ำที่ระดับ 5:95 รสชาติของเมล็ดบัวลอยข้าวกลิ้งงอกหวานกำลังดี เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรที่เพิ่มปริมาณน้ำตาลทรายมากขึ้น ทำให้รสชาติของเมล็ดบัวลอยข้าวกลิ้งงอกหวานมากเกินไป ทำให้ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบน้อยกว่า แสดงว่าปริมาณน้ำตาลทรายมีผลต่อความชอบในด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์บัวลอยข้าวกลิ้งงอก จึงนำสูตรที่ดีที่สุดไปทำการศึกษ ปริมาณน้ำตาลทรายต่อน้ำที่ใช้ทำน้ำเชื่อมในการต้มเมล็ดบัวลอยข้าวกลิ้งงอกต่อไป

4.1.4 ผลจากการศึกษากรรมวิธีการละลายหลังการแช่แข็งของผลิตภัณฑ์บัวลอยข้าวกลิ้งงอกที่เหมาะสมในการแช่แข็งที่อุณหภูมิ -18°C

นำสูตรที่ได้จากการศึกษาที่ผ่านมา และนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปแช่แข็งในตู้แช่แข็งที่อุณหภูมิ -18°C ไปทำการศึกษกรรมวิธีการละลายหลังการแช่แข็งของผลิตภัณฑ์บัวลอยข้าวกลิ้งงอกที่เหมาะสม ซึ่งกรรมวิธีการละลายหลังการแช่แข็งมีผลต่อผลิตภัณฑ์ในด้าน สี รสชาติ กลิ่น ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยทำการทดลองนำผลิตภัณฑ์บัวลอยข้าวกลิ้งงอกที่ผ่านการแช่แข็งที่อุณหภูมิ -18°C ใช้กรรมวิธีนำเข้าเตาไมโครเวฟ(900 วัตต์) ตั้งความร้อนสูงสุด และนำออกมาคนเล็กน้อยก่อนหมดเวลา 30 วินาทีก่อนหมดเวลา (วิธีการจากผลิตภัณฑ์ขนมหวานแช่แข็งที่อุณหภูมิ -18°C ตรา S&P) ซึ่งใช้ระยะเวลาในการให้ความร้อนที่ 3 ระดับ คือ 1 นาที 30 วินาที, 2 นาที และ 2 นาที 30 วินาที ตามลำดับ เพื่อหากรรมวิธีการละลายหลังการแช่แข็งของผลิตภัณฑ์บัวลอยข้าวกลิ้งงอกที่เหมาะสมในการแช่แข็งที่อุณหภูมิ -18°C



บัวลอยข้าวกลิ้งงอกแช่แข็ง



บัวลอยข้าวกลิ้งงอกหลังการคืนตัว

ภาพที่ 4.1 บัวลอยข้าวกลิ้งงอก

ตารางที่ 4.4 แสดงผลการศึกษากิจกรรมวิธีการละลายหลังการแช่แข็งของผลิตภัณฑ์บัวลอยข้าวกลิ้งงอกที่เหมาะสมในการแช่แข็งที่อุณหภูมิ -18°C

คุณลักษณะ	ระยะเวลาในการให้ความร้อน (นาท)		
	1.30	2	2.30
สี	7.32 ± 0.19^b	7.76 ± 0.10^a	6.75 ± 0.41^b
กลิ่น	6.36 ± 0.75^b	7.05 ± 0.66^a	5.01 ± 0.32^c
รสชาติ	6.33 ± 0.55^b	7.32 ± 0.52^a	4.98 ± 0.35^c
ลักษณะเนื้อสัมผัส	6.10 ± 0.46^b	7.44 ± 0.45^a	5.56 ± 0.32^c
ความชอบโดยรวม	6.45 ± 0.68^b	7.57 ± 0.43^a	5.13 ± 0.53^c

หมายเหตุ: อักษรที่ต่างกันในแนวนอนหมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p \leq 0.05$)

จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์บัวลอยข้าวกลิ้งงอกแช่แข็งที่อุณหภูมิ -18°C ในการศึกษากรรมวิธีการละลายหลังการแช่แข็งของผลิตภัณฑ์บัวลอยข้าวกลิ้งงอก ทั้ง 3 ระยะเวลาในการให้ความร้อน พบว่า ระยะเวลาในการให้ความร้อนของเตาไมโครเวฟที่แตกต่างกันมีผลต่อความชอบในด้านต่างๆกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ($p \leq 0.05$) ดังตารางที่ 4.4 โดยการใช้ระยะเวลาในการให้ความร้อนที่ 2 นาที ผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุดในทุกๆด้าน โดยลักษณะเนื้อสัมผัส ความหนึบ นุ่ม เหนียวของผลิตภัณฑ์บัวลอยข้าวกลิ้งงอกแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระยะเวลาในการให้ความร้อนที่ 1.30 นาที บัวลอยข้าวกลิ้งงอกแช่แข็ง ยังมีปริมาณน้ำแข็งอยู่ในผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระยะเวลาในการให้ความร้อนที่ 2.30 นาที มีกลิ่นไหม้เล็กน้อย และแห้ง แสดงว่าระยะเวลาในการให้ความร้อนมีผลต่อความชอบในด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์บัวลอยข้าวกลิ้งงอก โดยสูตรที่ใช้ระยะเวลาในการให้ความร้อนที่ 2 นาที ให้คุณลักษณะที่ดีที่สุด ในทุกด้าน จึงเลือกสูตรที่ใช้ระยะเวลาในการให้ความร้อนที่ 2 นาที แก่ผลิตภัณฑ์บัวลอยข้าวกลิ้งงอกแช่แข็ง จึงนำไปทำการศึกษการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะคุณภาพของผลิตภัณฑ์บัวลอยข้าวกลิ้งงอกระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18°C ต่อไป

ตารางที่ 4.6 ค่าคะแนนความชอบเฉลี่ยของบั่วลอยข้าวกล้องงอกหลังการเก็บรักษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์

คุณลักษณะ ของผลิตภัณฑ์	คะแนนเฉลี่ย	
	บั่วลอยข้าวกล้องงอก	บั่วลอยจากห้องตลาด
สัปดาห์ที่ 1		
สี	7.65 ± 0.21^a	8.20 ± 0.63^a
กลิ่น	7.78 ± 0.34^a	7.64 ± 0.62^a
รสชาติ	8.23 ± 0.53^a	7.84 ± 0.47^a
เนื้อสัมผัส	8.46 ± 0.12^a	7.98 ± 0.15^a
ความชอบโดยรวม	8.21 ± 0.78^a	8.10 ± 0.08^a
สัปดาห์ที่ 2		
สี	7.76 ± 0.48^a	8.27 ± 0.42^a
กลิ่น	7.84 ± 0.72^a	8.40 ± 0.82^a
รสชาติ	8.10 ± 0.68^a	8.15 ± 0.74^a
เนื้อสัมผัส	8.49 ± 0.12^a	8.25 ± 0.35^a
ความชอบโดยรวม	8.02 ± 0.09^a	7.99 ± 0.01^a
สัปดาห์ที่ 3		
สี	7.23 ± 0.11^a	7.64 ± 0.45^a
กลิ่น	7.34 ± 0.22^a	7.08 ± 0.31^a
รสชาติ	7.02 ± 0.41^a	7.02 ± 0.22^a
เนื้อสัมผัส	6.82 ± 0.23^b	7.14 ± 0.82^a
ความชอบโดยรวม	7.00 ± 0.81^b	7.45 ± 0.67^a
สัปดาห์ที่ 4		
สี	6.43 ± 0.18^b	7.55 ± 0.21^a
กลิ่น	6.51 ± 0.12^b	7.42 ± 0.34^a
รสชาติ	6.95 ± 0.21^a	6.32 ± 0.23^a
เนื้อสัมผัส	5.15 ± 0.43^b	7.41 ± 0.14^a
ความชอบโดยรวม	6.23 ± 0.34^b	7.64 ± 0.31^a

หมายเหตุ ตัวอักษรในแนวนอนที่ต่างกัน หมายถึง ค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ($p \leq 0.05$)



ภาพที่ 4.2 บัวลอยข้าวกลี้งงอกแช่แข็ง

จากการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่าคะแนนความชอบของบัวลอยข้าวกลี้งงอกเปรียบเทียบกับบัวลอยจากท้องตลาด พบว่าที่ระยะเวลาการเก็บ 2 สัปดาห์ ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบทุกด้านไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p > 0.05$) แสดงดังตารางที่ 4.6 ในด้านสี อยู่ในระดับความชอบปานกลาง กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมอยู่ในระดับความชอบเล็กน้อยถึงปานกลาง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบัวลอยข้าวกลี้งงอกจากท้องตลาด ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบ ในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบปานกลางถึงมาก เมื่อบัวลอยข้าวกลี้งงอกมีอายุการเก็บเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 3 บัวลอยข้าวกลี้งงอกมีคะแนนความชอบเฉลี่ยด้านเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมแตกต่างจากบัวลอยในท้องตลาดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) โดยบัวลอยข้าวกลี้งงอกมีคะแนนความชอบเฉลี่ยด้านเนื้อสัมผัสอยู่ที่ระดับ 5 มาสามารถบอกได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ทดสอบจึงมีอายุการเก็บรักษาที่ 4 สัปดาห์



ภาพที่ 4.3 บัวลอยข้าวกลิ้งอบกรอบแช่แข็งพร้อมบรรจุภัณฑ์

4.2 เค้าสวยข้าวกลิ้งอบกรอบ

4.2.1 ผลจากการศึกษาหาสูตรพื้นฐานของเค้าสวยนมสดจำนวน 3 สูตร จากการศึกษาหาสูตรพื้นฐานเค้าสวยนมสดโดยดัดแปลงจากสูตรเค้าสวยนมสด จำนวน 3 สูตร คือ สูตรของ กัสซี่(2549), อุบล (มปป.) และจากนส.ปวีตรา เมฆภูวดล ในรายวิชา เทคโนโลยีขนมหวาน ประจำปีการศึกษา 2553 **ดังแสดงในตารางที่ 3.1** สูตรเค้าสวยนมสดทั้ง 3 สูตร เมื่อแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 วัน ต้องการเปรียบเทียบความชอบของสูตรพื้นฐานของเค้าสวยนมสด จากการนำไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม พบว่า สูตรพื้นฐานของเค้าสวยนมสดมีผลต่อความชอบในด้านต่างๆกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ($p \leq 0.05$) แสดงดังตารางที่ 4.7 ซึ่งผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับสูตรที่ 3 มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความชอบในด้าน สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม อยู่ในระดับคะแนนความชอบ ปานกลางถึง ชอบมาก ตามลำดับ และแตกต่างจากสูตรอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ($p \leq 0.05$) ผลจากการประเมินทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ ในด้านสีผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบสูตรที่ 3 สูงที่สุด คือ อยู่ในระดับคะแนนความชอบ ปานกลางถึงชอบมาก และแตกต่างจากสูตรที่ 1 และสูตรที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p \leq 0.05$) ด้านกลิ่นผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบสูตรทดลองที่ 3 สูงที่สุด คือ อยู่ในระดับคะแนนความชอบปานกลางถึงชอบมาก และแตกต่างจากสูตรอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ($p \leq 0.05$) แต่สูตรที่ 1 ไม่แตกต่างสูตรที่ 2 สำหรับด้านรสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบสูตรทดลองที่ 3 สูงที่สุด คือ อยู่ในระดับคะแนนความชอบปานกลางถึงชอบมาก และแตกต่างจากสูตรที่ 1 กับสูตรที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p \leq 0.05$) จะเห็นได้ว่าผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับผลิตภัณฑ์สูตรที่ 3

โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความชอบโดยรวมสูงที่สุด คือ อยู่ในระดับคะแนนความชอบปานกลางถึงชอบมาก จึงเลือกสูตรที่ 3 เนื่องจากมีสีขาว กลิ่นหอมนม และเนื้อสัมผัสเนียนนุ่ม จึงนำสูตรนี้มาศึกษาปริมาณของน้ำข้าวกล้องงอกต่อนมสดในเต้าหูนมสดที่เหมาะสมต่อไป

ตารางที่ 4.7 แสดงผลการศึกษสูตรพื้นฐานของเต้าหูนมสดจำนวน 3 สูตร

คุณลักษณะ	ค่าเฉลี่ยคะแนนความชอบ		
	สูตรที่ 1	สูตรที่ 2	สูตรที่ 3
สี	6.40 ± 0.05 ^b	5.43 ± 0.02 ^c	7.87 ± 0.02 ^a
กลิ่น	6.07 ± 0.05 ^b	5.53 ± 0.02 ^b	7.27 ± 0.02 ^a
รสชาติ	6.40 ± 0.01 ^b	5.53 ± 0.05 ^c	7.70 ± 0.01 ^a
ลักษณะเนื้อสัมผัส	6.27 ± 0.02 ^b	5.23 ± 0.02 ^c	7.67 ± 0.02 ^a
ความชอบโดยรวม	6.47 ± 0.02 ^b	5.47 ± 0.02 ^c	7.70 ± 0.02 ^a

หมายเหตุ : ตัวอักษรในแนวนอนต่างกัน หมายถึง ค่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p \leq 0.05$)

4.2.2 ผลจากการศึกษาปริมาณของน้ำข้าวกล้องงอกต่อนมสดในเต้าหูนมสดที่เหมาะสม นำสูตรที่ได้จากการศึกษาสูตรพื้นฐานที่เหมาะสม ไปทำการศึกษาปริมาณของน้ำข้าวกล้องงอกต่อนมสดที่เหมาะสมในการผลิตเต้าหูนมสด ซึ่งปริมาณของน้ำข้าวกล้องงอกมีผลต่อการผลิตในด้าน สี รสชาติ กลิ่น ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยทำการทดลองหาปริมาณของน้ำข้าวกล้องงอกต่อนมสด 3 ระดับ คือ 60:40, 80:20 และ 100:0 ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 3.2 เพื่อหาปริมาณน้ำข้าวกล้องงอกต่อนมสดที่เหมาะสมในการผลิตเต้าหูนมสด

ตารางที่ 4.8 แสดงผลการศึกษาปริมาณน้ำข้าวกล้องงอกต่อนมสดในการผลิตเต้าหูนมสดที่เหมาะสม

คุณลักษณะ	ปริมาณน้ำข้าวกล้องงอกต่อนมสด (กรัม)		
	60 : 40	80 : 20	100 : 0
สี	6.16 ± 0.17 ^b	6.00 ± 0.17 ^b	7.50 ± 0.17 ^a
กลิ่น	6.06 ± 0.16 ^b	5.90 ± 0.16 ^b	7.00 ± 0.16 ^a
รสชาติ	6.10 ± 0.16 ^b	6.06 ± 0.16 ^b	7.33 ± 0.15 ^a
ลักษณะเนื้อสัมผัส	7.06 ± 0.16 ^a	5.86 ± 0.15 ^b	5.76 ± 0.15 ^b
ความชอบโดยรวม	5.90 ± 0.14 ^b	6.26 ± 0.14 ^b	7.03 ± 0.14 ^a

หมายเหตุ: อักษรที่ต่างกันแนวนอนหมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p \leq 0.05$)

จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของปริมาณน้ำข้าวกล้องงอกต่อนมสดทั้ง 3 ระดับ พบว่า ปริมาณน้ำข้าวกล้องงอกที่แตกต่างกันมีผลต่อความชอบในด้านต่างๆกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ($p \leq 0.05$) ดังตารางที่ 4.8 โดยปริมาณน้ำข้าวกล้องงอกต่อนมสดที่ 100:0 ผู้ทดสอบให้การยอมรับความชอบ

ด้าน สี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม ในระดับความชอบปานกลางถึงระดับความชอบมาก เนื่องจากปริมาณน้ำข้าวกล้องงอกต่ออนมสดที่ 100:0 มีปริมาณของน้ำข้าวกล้องงอกมากที่สุด ทำให้มีความหอมของข้าวกล้องงอกมาก และสีขาวครีมจากน้ำข้าวกล้องงอกที่นำมารับประทาน โดยลักษณะเนื้อสัมผัสที่ปริมาณน้ำข้าวกล้องงอกต่ออนมสดที่ 100:0 ผู้บริโภคให้การยอมรับแตกต่างจากปริมาณน้ำข้าวกล้องงอกต่ออนมสดที่ 60:40 และน้ำข้าวกล้องงอกต่ออนมสดที่ 80:20 ตามลำดับ แสดงว่าปริมาณน้ำข้าวกล้องงอกมีผลต่อโดยลักษณะเนื้อสัมผัสของเต้าฮวยนมสด เมื่อปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีเนื้อหยาบ เมื่อใช้ช้อนตักเนื้อที่ได้เป็นเม็ดๆ ตักไปเรื่อยๆจะกลายเป็นของเหลวขึ้น หนืด ไม่นำมารับประทาน น่าจะเกิดจากการสารที่ให้ความคงตัว คือ เจลาตินผง ซึ่งเป็นตัวช่วยในการสร้างโครงสร้างของเต้าฮวยนมสด เมื่อมาผสมกับน้ำข้าวกล้องงอกจึงทำให้ไม่สามารถเกิดโครงสร้างของเจลในผลิตภัณฑ์เต้าฮวยนมสดได้ ผู้วิจัยจึงเลือกสูตรปริมาณน้ำข้าวกล้องงอกต่ออนมสดที่ 100:0 มาศึกษาปริมาณของสารให้ความคงตัวที่เป็นสารที่ทำให้เกิดเจลในผลิตภัณฑ์เต้าฮวยข้าวกล้องงอกต่อไป

4.2.3 ศึกษาปริมาณของสารให้ความคงตัวที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์เต้าฮวยข้าวกล้องงอก นำสูตรที่ได้จากการศึกษาปริมาณน้ำข้าวกล้องงอกต่ออนมสดในการผลิตเต้าฮวยนมสดที่เหมาะสม ไปทำการศึกษาปริมาณของสารให้ความคงตัวที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์เต้าฮวยข้าวกล้องงอก ซึ่งปริมาณของสารให้ความคงตัวมีผลต่อการผลิตในด้าน ลักษณะเนื้อสัมผัส โดยทำการทดลองหาปริมาณของสารให้ความคงตัวที่เหมาะสมในเต้าฮวยข้าวกล้องงอก ระหว่างสารให้ความคงตัว 2 ชนิด คือ ผงวุ้นกับเจลาตินผง โดยใช้ปริมาณสารให้ความคงตัวของผงวุ้นกับเจลาตินผง ที่ 3 ระดับ คือ 100:0, 0:100 และ 50:50 ตามลำดับ เพื่อหาปริมาณของสารให้ความคงตัวที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์เต้าฮวยข้าวกล้องงอก

ตารางที่ 4.9 แสดงผลการศึกษาปริมาณของสารให้ความคงตัวในการผลิตเต้าฮวยข้าวกล้องงอกที่เหมาะสม

คุณลักษณะ	ปริมาณผงวุ้นต่อเจลาตินผง (กรัม)		
	100 : 0	0 :10 0	50 :5 0
สี	8.06±0.16 ^a	6.13±0.16 ^c	6.83±0.16 ^b
กลิ่น	7.03±0.15 ^a	6.33±0.15 ^b	6.90±0.15 ^a
รสชาติ	7.37±0.14 ^a	6.10±0.14 ^c	6.53±0.14 ^b
ลักษณะเนื้อสัมผัส	7.63±0.13 ^a	6.30±0.13 ^c	6.67±0.13 ^b
ความชอบโดยรวม	7.80±0.13 ^a	6.23±0.13 ^c	6.63±0.13 ^b

หมายเหตุ: อักษรที่ต่างกันในแนวนอนหมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ($p \leq 0.05$)

จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของปริมาณสารให้ความคงตัว ผงวุ้นต่อเจลาติน ทั้ง 3 ระดับ พบว่า ปริมาณผงวุ้นที่แตกต่างกันมีผลต่อความชอบในด้านต่างๆกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ($p \leq 0.05$) ดังตารางที่ 4.9 โดยปริมาณผงวุ้นต่อเจลาตินผงที่ 100:0 ผู้ทดสอบให้การยอมรับความชอบด้าน สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ในระดับความชอบปานกลางถึงระดับความชอบ

มาก โดยเฉพาะลักษณะเนื้อสัมผัสของปริมาณผงวุ้นต่อเจลาตินผงที่ 100:0 มีลักษณะเนื้อสัมผัสที่เนียนเรียบมากขึ้น เมื่อใช้ช้อนตักเนื้อที่ได้คล้ายเต้าหูนุ่มสด ตักไปเรื่อยๆ ไม่กลายเป็นของเหลวข้น หนืด น่าจะเกิดจากการสารที่ให้ความคงตัว คือ ผงวุ้น เป็นตัวช่วยในการสร้างโครงสร้างของเต้าหอยข้าวกล้องงอกที่ดี ทำให้เกิดโครงสร้างของเจลที่แข็งแรงขึ้น ส่วนกลิ่นยังมีความหอมของข้าวกล้องงอก และสีขาวครีมจากน้ำข้าวกล้องงอกที่นำมารับประทาน จึงเลือกสูตรที่ใช้ปริมาณของผงวุ้นต่อเจลาตินผงที่ 100:0 กรัม เป็นสารให้ความคงตัวที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์เต้าหอยข้าวกล้องงอก เพื่อนำสูตรที่ดีที่สุดไปวิเคราะห์คุณสมบัติและศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์เต้าหอยข้าวกล้องงอกระหว่างการเก็บรักษาต่อไป

4.2.4 ศึกษาอายุการเก็บรักษาของเต้าหอยข้าวกล้อง นำเต้าหอยข้าวกล้องงอกที่พัฒนาได้มาบรรจุถ้วยพลาสติกชนิดร้อนปิดฝา เก็บรักษาในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ สุ่มทุกสัปดาห์ โดยนำเต้าหอยข้าวกล้องงอกมาวัดคุณภาพในด้านกายภาพ แสดงดังตารางที่ 4.10 จากการวัดค่าสี เต้าหอยข้าวกล้องงอกด้วยระบบ $L^*a^*b^*$ พบว่า ค่าสีเต้าหอยข้าวกล้องงอกคือ L^* (ค่าความสว่าง) เท่ากับ 0.01 a^* (ค่าสีเขียว) เท่ากับ 0.00 b^* (ค่าสีน้ำเงิน) เท่ากับ -0.06 เมื่อเก็บรักษา 1 สัปดาห์ ผลิตภัณฑ์มีค่าสี L^* (ค่าความสว่าง) เท่ากับ 0.01 a^* (ค่าสีเขียว) เพิ่มขึ้น เท่ากับ -0.02 b^* (ค่าสีน้ำเงิน) เท่ากับ -0.02 เมื่อเก็บรักษา 2 สัปดาห์ ผลิตภัณฑ์มีค่าสี L^* (ค่าความสว่าง) เท่ากับ 0.02 a^* (ค่าสีเขียว) เท่ากับ -0.07 b^* (ค่าสีน้ำเงิน) เท่ากับ -0.02 เมื่อเก็บรักษา 3 สัปดาห์ ผลิตภัณฑ์มีค่าสีใกล้เคียงกับเต้าหอยสัปดาห์ที่ 2

ตารางที่ 4.10 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านสีของเต้าหอย

ระยะเวลาการเก็บรักษา (สัปดาห์)	ค่าสี		
	L^* (ความสว่าง)	a^* (ค่าสีเขียว)	b^* (สีน้ำเงิน)
0	0.01	-0.00	-0.06
1	0.01	-0.02	-0.02
2	0.02	-0.07	-0.02
3	0.02	-0.02	-0.06
4	0.03	-0.02	-0.06

จากผลการทดลองจะพบว่า เมื่อผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น จะมีค่าความสว่างและค่าสีน้ำเงินเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับตารางที่ 4.10 เมื่อเก็บไว้นานผลิตภัณฑ์จะมีการเปลี่ยนแปลงสี

จากการวัดค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TSS) เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาในเต้าหู้ยักล้างองก พบว่า ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (total soluble solid) พบว่า ค่าของแข็งที่ละลายได้เริ่มต้นของเต้าหู้ยักล้างองกคือ 13 ° Brix แสดงดังตารางที่ 4.11 ซึ่งเต้าหู้ยักล้างองกมีค่าของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้คงที่อยู่ที่ 2 สัปดาห์ เมื่อสัปดาห์ที่ 3-4 เต้าหู้ยักล้างองกมีค่าของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้เพิ่มขึ้นเป็น 14 ° Brix จากการศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาของเต้าหู้ยักล้างองกซึ่งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งถือว่ายังไม่เกินที่มาตรฐานกำหนด ดังนั้นเต้าหู้ยักล้างองกที่มีอายุการเก็บรักษา 1 เดือนจึงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ตารางที่ 4.11 แสดงผลการวัดค่าทางกายภาพและจุลินทรีย์เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาในผลิตภัณฑ์เต้าหู้ยัก

ระยะเวลาการเก็บรักษา (สัปดาห์)	ค่า (TSS) (° Brix)	จุลินทรีย์ทั้งหมด (โคโลนีต่อกรัม)	ยีสต์และรา (โคโลนีต่อกรัม)
0	13	$< 1 \times 10^3$	< 10
1	13	$< 1 \times 10^3$	< 10
2	13	$< 1 \times 10^3$	< 10
3	14	$< 1 \times 10^3$	< 10
4	14	$< 1 \times 10^3$	< 10

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ต่างกันแถวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p \leq 0.05$)

จากการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่าคะแนนความชอบของเต้าหู้ยักล้างองกเปรียบเทียบกับเต้าหู้ยักจากท้องตลาด พบว่าที่ระยะเวลาการเก็บ 4 สัปดาห์ ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบ ในด้านสี อยู่ในระดับความชอบปานกลาง กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมอยู่ในระดับความชอบเล็กน้อยถึงปานกลาง และเต้าหู้ยักล้างองกจากท้องตลาด ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบ ในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบเล็กน้อยถึงปานกลาง แสดงดังตารางที่ 4.12

เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่า ผู้ทดสอบชิมในคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัส ในด้านสี ไม่มีความแตกต่าง เนื่องจากสีของเต้าหู้ยักล้างองกมีสีน้ำตาลธรรมชาติ ส่วนเต้าหู้ยักจากท้องตลาดมีสีขาวของนมสด ด้านเนื้อสัมผัสความยืดหยุ่นมีความแตกต่าง เนื่องจากเต้าหู้ยักล้างองกเมื่อเก็บรักษานานขึ้นจะมีเนื้อสัมผัสที่แข็งเนื่องจากตัวเต้าหู้ยักคายน้ำออกมา ทำให้ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบเฉลี่ยด้านเนื้อสัมผัสลดลงจนไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ทดสอบ โดยเต้าหู้ยักล้างองก โดยมีความเฉลี่ยของความชอบด้านสี = 7.10, ด้านกลิ่น = 6.57, ด้านรสชาติ = 6.50, ด้านเนื้อสัมผัส = 5.17 และด้านความชอบโดยรวม = 5.53 โดยมีความชอบด้านสี อยู่ในระดับความชอบปานกลาง กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวม อยู่ในระดับบอกไม่ได้ว่าชอบหรือไม่

ตารางที่ 4.12 ค่าคะแนนความชอบเฉลี่ยของเต้าฮวยหลังการเก็บรักษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์

คุณลักษณะ ของผลิตภัณฑ์	คะแนนเฉลี่ย	
	เต้าฮวยข้าวกลี้งงอก	เต้าฮวยจากท้องตลาด
สัปดาห์ที่ 1		
สี	7.43±0.12 ^a	7.23±0.07 ^a
กลิ่น	6.83 ^a ±0.14 ^a	8.47±0.42 ^b
รสชาติ	6.87±0.04 ^a	8.53±0.32 ^a
เนื้อสัมผัส	6.77±0.32 ^a	7.60±0.43 ^a
ความชอบโดยรวม	6.97±0.15 ^a	8.70±0.61 ^a
สัปดาห์ที่ 2		
สี	7.30±0.16 ^a	7.97±0.17 ^a
กลิ่น	7.27±0.04 ^a	7.47±0.34 ^a
รสชาติ	7.50±0.02 ^a	7.33±0.18 ^a
เนื้อสัมผัส	6.17±0.92 ^b	8.37±0.34 ^a
ความชอบโดยรวม	6.53±0.57 ^b	6.63±0.38 ^a
สัปดาห์ที่ 3		
สี	7.10±0.07 ^a	8.97±0.16 ^a
กลิ่น	6.57±0.16 ^a	7.47±0.25 ^a
รสชาติ	7.40±0.02 ^a	8.63±0.17 ^a
เนื้อสัมผัส	6.17±0.32 ^b	7.31±0.23 ^a
ความชอบโดยรวม	6.32±0.47 ^b	7.53±0.18 ^a
สัปดาห์ที่ 4		
สี	7.10±0.25 ^a	6.97±0.17 ^a
กลิ่น	6.57±0.44 ^a	6.47±0.34 ^a
รสชาติ	6.50±0.36 ^a	6.33±0.18 ^a
เนื้อสัมผัส	5.17±0.72 ^b	6.37±0.34 ^a
ความชอบโดยรวม	5.53±0.57 ^b	6.63±0.38 ^a

หมายเหตุ ตัวอักษรในแนวนอนที่ต่างกัน หมายถึง ค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ($p \leq 0.05$)



ภาพที่ 4.4 เต้าฮวยข้าวกล้องงอก



ภาพที่ 4.5 เต้าฮวยข้าวกล้องงอกพร้อมบรรจุภัณฑ์

4.3 ลดช่องข้าวกล้องงอก

4.3.1 ผลการศึกษาร้อยละข้าวกล้องงอกต่อแป้งข้าวเจ้าในกระบวนการผลิตลดช่องข้าวกล้อง โดยวางแผนการทดลองแบบ Rcbd ลดช่องข้าวกล้องงอกที่ปริมาณร้อยละของข้าวกล้องงอกต่อแป้งข้าวเจ้า 3 ระดับที่ 50 60 และ 70 พบว่าที่ปริมาณร้อยละข้าวกล้องงอก 50 60 และ 70 มีคะแนนความชอบเฉลี่ย

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P \leq 0.05$) แสดงดังตารางที่ 4.13 โดยที่ปริมาณร้อยละข้าวกล้องงอก 60 ได้รับการยอมรับมากที่สุด ลอดช่องข้าวกล้องงอกจะเนื้อสัมผัสแข็งขึ้นมากกว่าลอดช่องที่ใช้ข้าวกล้องงอกร้อยละ 50 ส่วนร้อยละข้าวกล้องงอก 70 ลอดช่องข้าวกล้องงอกจะมีลักษณะแข็ง ร่วน ไม่มีความยืดหยุ่น และขาดง่าย โดยลอดช่องข้าวกล้องงอกร้อยละข้าวกล้องงอก 60 มีคะแนนความชอบเฉลี่ยทุกด้านสูงสุดทางด้าน เนื้อสัมผัส สี กลิ่น รสชาติ กลิ่นรส และความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบปาน ทั้งนี้เนื่องจากข้าวกล้องงอกมีปริมาณเส้นใยอาหารมากกว่าข้าวเจ้าทำให้ลอดช่องที่ได้มีลักษณะแข็งเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 4.13 คะแนนความชอบเฉลี่ยของลอดช่องข้าวกล้องที่ปริมาณข้าวกล้องงอกต่อแป้งข้าวเจ้า 3 ระดับ

คุณลักษณะ	ปริมาณข้าวกล้องงอกต่อแป้งข้าวเจ้า (ร้อยละ)		
	50	60	70
สี	6.62± 0.28 ^b	7.55± 0.14 ^a	6.75± 0.35 ^b
กลิ่น	7.23± 0.17 ^a	7.15± 0.82 ^a	7.20± 0.62 ^a
กลิ่นรส	6.88± 0.82 ^a	6.90± 0.84 ^a	6.95± 0.53 ^a
รสชาติ	6.27± 0.42 ^b	8.65± 0.74 ^a	6.22± 0.42 ^b
เนื้อสัมผัส	6.73± 0.53 ^a	6.87± 0.67 ^a	6.72± 0.71 ^a
ความชอบโดยรวม	6.60± 0.23 ^a	6.62± 0.36 ^a	6.57± 0.15 ^a

หมายเหตุ : ตัวอักษรในแนวนอนที่ต่างกัน หมายถึง ค่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P \leq 0.05$)

4.3.2 ศึกษาระยะเวลาในการกวนส่วนผสมที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตลอดช่องข้าวกล้อง โดยวางแผนการทดลองแบบ Rcbd โดยศึกษาระยะเวลาในการกวนส่วนผสมเหมาะสมในกระบวนการผลิตลอดช่องข้าวกล้องงอก 3 ระดับที่ 20 30 และ 40 นาที มีผลต่อคะแนนความชอบ สี รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมของลอดช่องข้าวกล้องงอกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p \leq 0.05$) แสดงผลคะแนนทางประสาทสัมผัสในด้านต่างๆดังตารางที่ 4.14 พบว่าผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสในด้านสี รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม สูตรที่ 1, 2 และ 3 มีความแตกต่างกัน ด้านกลิ่นระยะเวลาในการกวน 30 นาที ลอดช่องข้าวกล้องงอกมีกลิ่นความแตกต่างจากเวลาในการกวน 20 และ 40 นาที เนื่องจากระยะเวลาในการกวนเพิ่มขึ้นจาก 20 เป็น 30 นาที มีคะแนนความชอบทุกปัจจัยมากกว่าลอดช่องข้าวกล้องงอกที่ใช้ระยะเวลาในการกวน 40 นาที อาจเนื่องมาจากระยะเวลาในการกวนเพิ่มขึ้นปริมาณน้ำในลอดช่องก่อนหยอดในน้ำร้อนลดลง ทำให้คะแนนความชอบทุกปัจจัยเพิ่มขึ้น ส่วนลอดช่องข้าวกล้องงอกที่ระยะเวลาในการกวน 40 นาที มีคะแนนทุกปัจจัยต่ำสุดเนื่องจาก ลอดช่องข้าวกล้องงอกมีเนื้อสัมผัสที่แข็งทำให้คะแนนความชอบมีค่าต่ำสุด

ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ยคะแนนความชอบลดช่องข้าวกล้องงอกที่ระยะเวลาในการกวน 3 ระดับ

คุณลักษณะ	ระยะเวลาในการกวน (นาที)		
	20	30	40
สี	6.70± 0.18 ^b	7.30± 0.12 ^a	5.96± 0.42 ^c
กลิ่น	6.83± 0.23 ^b	7.80± 0.38 ^a	6.63± 0.16 ^b
รสชาติ	7.20± 0.41 ^b	7.73± 0.63 ^a	6.33± 0.72 ^c
เนื้อสัมผัส	6.90± 0.36 ^b	7.80± 0.64 ^a	6.13± 0.56 ^c
ความชอบโดยรวม	6.90± 0.87 ^b	7.93± 0.41 ^a	5.10± 0.72 ^c

หมายเหตุ ตัวอักษรในแนวนอนต่างกัน หมายถึง ค่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p \leq 0.05$)

4.3.3 ศึกษาอายุการเก็บรักษา โดยทำการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่ระยะเวลาการเก็บ 4 สัปดาห์

นำลดช่องข้าวกล้องงอกที่พัฒนาได้มาบรรจุด้วยพลาสติกขณะร้อนปิดฝา เก็บรักษาในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ สุ่มทุกสัปดาห์

จากการวัดค่าสีลดช่องข้าวกล้องงอกด้วยระบบ $L^*a^*b^*$ พบว่า ค่าสีลดช่องข้าวกล้องงอก คือ L^* (ค่าความสว่าง) เท่ากับ 22.13 a^* (ค่าสีแดง) เท่ากับ 6.20 b^* (ค่าสีน้ำเงิน) เท่ากับ 24.52 เมื่อเก็บรักษา 1 สัปดาห์ ผลิตกัณฑ์มีค่าสี L^* (ค่าความสว่าง) เท่ากับ 21.68 a^* (ค่าสีแดง) เท่ากับ 6.26 b^* (ค่าสีน้ำเงิน) เท่ากับ 24.35 เมื่อเก็บรักษา 2 สัปดาห์ ผลิตกัณฑ์มีค่าสี L^* (ค่าความสว่าง) เท่ากับ 21.55 a^* (ค่าสีแดง) เท่ากับ 6.28 b^* (ค่าสีน้ำเงิน) เท่ากับ 24.27 เมื่อเก็บรักษา 3 สัปดาห์ ผลิตกัณฑ์มีค่าสีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด L^* (ค่าความสว่าง) เท่ากับ 30.89 a^* (ค่าสีแดงลดลง เท่ากับ 3.83 b^* (ค่าสีน้ำเงิน) เท่ากับ 25.42 และเมื่อเก็บรักษา 4 สัปดาห์ ผลิตกัณฑ์มีค่าสี L^* (ค่าความสว่าง) เท่ากับ 30.89 a^* (ค่าสีแดง) เท่ากับ 3.84 b^* (ค่าสีน้ำเงิน) เท่ากับ 25.44 แสดงดังตารางที่ 4.15 จากผลการทดลองจะพบว่า เมื่อผลิตกัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น จะมีค่าความสว่างและค่าสีน้ำเงินเพิ่มขึ้น ส่วนค่าสีแดงจะลดลง ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับตารางที่ 4.12 เมื่อเก็บไว้นานผลิตกัณฑ์จะมีการเปลี่ยนแปลงสี สาเหตุที่ผลิตกัณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงสีเนื่องมาจากผลิตกัณฑ์ผ่านกระบวนการที่ใช้ความร้อนสูงในการแปรรูปหลายขั้นตอน

ตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านสีของหลอดช่องข้าวกล้องงอก

ระยะเวลาการเก็บรักษา (สัปดาห์)	ค่าสี		
	L* (ความสว่าง)	a* (ค่าสีแดง)	b* (สีเหลือง)
0	22.13	6.20	24.52
1	21.68	6.26	24.35
2	21.55	6.28	24.27
3	30.89	3.84	25.25
4	30.87	3.86	23.26

จากการวัดค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TSS) และค่าความเป็นกรด (pH) เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาในหลอดช่องข้าวกล้องงอกพบว่า ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (total soluble solid) พบว่า ค่าของแข็งที่ละลายได้เริ่มต้นของหลอดช่องข้าวกล้องงอกคือ 37 ° Brix ซึ่งหลอดช่องข้าวกล้องงอกมีค่าของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้คงที่อยู่ที่ 2 สัปดาห์ แสดงดังตารางที่ 4.16 เมื่อสัปดาห์ที่ 3-4 หลอดช่องข้าวกล้องงอกมีค่าของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ลดลงเป็น 36 ° Brix จากการศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาของหลอดช่องข้าวกล้องงอกซึ่งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งจากผลการตรวจสอบพบว่าในตัวอย่างหลอดช่องข้าวกล้องงอก มีค่าความเป็นกรด อยู่ในช่วง 6.09 – 5.94 และมีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด และยีสต์และราไม่เกินกำหนด ซึ่งถือว่ายังไม่เกินที่มาตรฐานกำหนด ดังนั้นหลอดช่องข้าวกล้องงอกที่มีอายุการเก็บรักษา 1 เดือนจึงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ตารางที่ 4.16 แสดงผลการวัดค่าทางกายภาพและจุลินทรีย์เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาในผลิตภัณฑ์หลอดช่องข้าวกล้องงอก

ระยะเวลาการเก็บรักษา (สัปดาห์)	ค่า (TSS) (° Brix)	ค่า pH	จุลินทรีย์ทั้งหมด (โคโลนีต่อกรัม)	ยีสต์และรา (โคโลนีต่อกรัม)
0	37	5.96	$< 1 \times 10^3$	< 10
1	37	5.97	$< 1 \times 10^3$	< 10
2	37	5.94	$< 1 \times 10^3$	< 10
3	36	6.05	$< 1 \times 10^3$	< 10
4	36	6.09	$< 1 \times 10^3$	< 10

จากการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่าคะแนนความชอบของหลอดช่องข้าวกล้องงอกเปรียบเทียบกับหลอดช่องจากท้องตลาด พบว่าที่ระยะเวลาการเก็บ 2 สัปดาห์ ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบในด้านสี อยู่ในระดับความชอบปานกลาง กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมอยู่ในระดับความชอบเล็กน้อยถึงปานกลาง และหลอดช่องข้าวกล้องงอกจากท้องตลาด ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส(ความกรอบ) และความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบเล็กน้อยถึงปานกลาง แสดงดังตารางที่ 4.17

เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่า ผู้ทดสอบชิมในคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัส ในด้านสี ไม่มีความแตกต่าง เนื่องจากสีของหลอดช่องข้าวกล้องงอกมีสีน้ำตาลธรรมชาติ ส่วนหลอดช่องจากท้องตลาดมีสีเขียว ด้านเนื้อสัมผัสความยืดหยุ่นมีความแตกต่าง เนื่องจากหลอดช่องข้าวกล้องงอกเมื่อเก็บรักษานานขึ้นจะมีเนื้อสัมผัสที่ยุ่ย ทำให้ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบเฉลี่ยด้านเนื้อสัมผัสลดลงจนไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ทดสอบ โดยหลอดช่องข้าวกล้องงอก โดยมีค่าเฉลี่ยของความชอบด้านสี = 7.00, ด้านกลิ่น = 6.37, ด้านรสชาติ = 6.24, ด้านเนื้อสัมผัส = 5.02 และด้านความชอบโดยรวม = 5.03 โดยมีความชอบด้านสี อยู่ในระดับความชอบปานกลาง กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวม อยู่ในระดับบอกไม่ได้ว่าชอบหรือไม่

ตารางที่ 4.17 ค่าคะแนนความชอบเฉลี่ยของหลอดช่องข้าวกล้องงอกหลังการเก็บรักษาเป็นเวลา 2 สัปดาห์

คุณลักษณะ ของผลิตภัณฑ์	คะแนนเฉลี่ย	
	หลอดช่องข้าวกล้องงอก	หลอดช่องจากท้องตลาด
สัปดาห์ที่ 1		
สี	7.46±0.08 ^a	7.97±0.27 ^a
กลิ่น	7.52±0.01 ^a	8.47±0.12 ^a
รสชาติ	7.58±0.17 ^a	7.33±0.29 ^a
เนื้อสัมผัส	6.17±0.01 ^b	7.84±0.17 ^a
ความชอบโดยรวม	7.53±0.36 ^b	8.27±0.26 ^a
สัปดาห์ที่ 2		
สี	7.00±0.16 ^a	7.97±0.14 ^a
กลิ่น	6.37±0.23 ^a	7.47±0.57 ^a
รสชาติ	6.24±0.75 ^a	7.23±0.42 ^a
เนื้อสัมผัส	5.02±0.42 ^b	7.38±0.15 ^a
ความชอบโดยรวม	5.03±0.17 ^b	7.67±0.28 ^a

หมายเหตุ ตัวอักษรในแนวนอนที่ต่างกัน หมายถึง ค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ($p \leq 0.05$)



ภาพที่ 4.6 ลอดช่องข้าวกลี้งอกแช่แข็ง



ภาพที่ 4.7 ลอดช่องข้าวกลี้งอกแช่แข็งพร้อมบรรจุภัณฑ์

4.4 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์



ภาพที่ 4.8 ภาพการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้อง



ภาพที่ 4.9 ภาพการออกแบบบรรจุภัณฑ์เต้าฮวย



ภาพที่ 4.10 ภาพการออกแบบบรรจุภัณฑ์ลอดช่อง

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

โครงการวิจัยการประยุกต์ใช้ข้าวกล้องงอกในผลิตภัณฑ์ขนมหวานได้ดำเนินการพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตขนมหวานจำนวน 3 ชนิด ผลการพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตขนมหวานแต่ละชนิดพบว่า การพัฒนา**บัวลอยข้าวกล้องงอกแช่แข็ง** โดยศึกษาอัตราส่วนของข้าวกล้องงอกต่อน้ำในการพรีเจล กับ ปริมาณแป้งข้าวเหนียวในกระบวนการผลิตบัวลอยข้าวกล้องงอก โดยวางแผนการทดลองแบบ Factorial in Rcbd โดยศึกษาอัตราส่วนของข้าวกล้องงอกต่อน้ำในการพรีเจล 2 ระดับที่ 2:3 และ 2 : 4 กับปริมาณแป้งข้าวเหนียว 3 ระดับที่ 25, 30 และ 35 กรัม ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบบัวลอยข้าวกล้องงอกระดับชอบปานกลางที่อัตราส่วนของข้าวกล้องงอกต่อน้ำในการพรีเจล กับ ปริมาณแป้งข้าวเหนียวในกระบวนการผลิตบัวลอยข้าวกล้องงอก ที่ 2:3 กับปริมาณแป้งข้าวเหนียว 3 ระดับที่ 30 กรัม ศึกษาการแช่แข็งและการละลายหลังการแช่แข็งของบัวลอยข้าวกล้องงอก 2 สูตรที่เหมาะสมในการแช่แข็งที่อุณหภูมิ -18°C โดยทำการละลายหลังการแช่แข็งที่อุณหภูมิ 50, 70 และ 90 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการละลายได้แก่ 1 และ 2 นาที พบว่าบัวลอยข้าวกล้องงอกที่ทำการละลายหลังการแช่แข็งที่ระดับความร้อนของเตาไมโครเวฟ 70 เป็นเวลา 2 นาที มีคะแนนความชอบโดยรวมสูงสุดอยู่ในระดับชอบปานกลาง จากนั้นนำบัวลอยข้าวกล้องงอกแช่แข็งมาศึกษาอายุการเก็บรักษาพบว่า บัวลอยข้าวกล้องงอกแช่แข็ง มีอายุการเก็บรักษา 5 เดือน จากการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมี จุลินทรีย์ และทางประสาทสัมผัส บัวลอยข้าวกล้องงอกมีลักษณะสีขาวอมน้ำตาลเล็กน้อย มีกลิ่นหืนเล็กน้อย ยังปลอดภัยในการบริโภค

เต้าฮวยข้าวกล้องงอก จากการศึกษาหาสูตรพื้นฐาน 3 สูตรจากนส.ปวีตรา เมฆภูวดล ในรายวิชาเทคโนโลยีขนมหวาน ประจำปีการศึกษา 2553 ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบเต้าฮวยข้าวกล้องงอกสูงสุดอยู่ในระดับชอบมาก จากนั้นนำเต้าฮวยข้าวกล้องงอกมาศึกษาอัตราส่วนของน้ำข้าวกล้องงอกต่อนมสดในเต้าฮวย 3 ระดับ 60 : 40 , 80 : 20 , และ 100 : 0 จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบเต้าฮวยข้าวกล้องงอกที่อัตราส่วนข้าวกล้องงอกต่อนมสด 100 : 0 สูงสุดอยู่ในระดับชอบมาก จากนั้นทำการศึกษาสารให้ความคงตัวโดยศึกษาอัตราส่วนของผงวุ้นต่อเจลาติน 3 ระดับ ได้แก่ 100:0, 50:50 และ 0:100 จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่าผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบเต้าฮวยข้าวกล้องงอกอยู่ที่ใช้อัตราส่วนของผงวุ้นต่อเจลาติน 100:0 ในระดับชอบมาก โดยเต้าฮวยมีลักษณะสีขาวอมเหลืองเล็กน้อย มีกลิ่นข้าวกล้องงอกเล็กน้อย มีรสหวาน เนื้อสัมผัสของเต้าฮวยมีความเนียนนุ่ม จากการศึกษาอายุการเก็บรักษา 7 วัน จากการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมี จุลินทรีย์ และทางประสาทสัมผัส เต้าฮวยยังมีลักษณะแยกชั้น ซึ่งเป็นลักษณะที่ผู้บริโภคไม่ยอมรับ

หลอดช่องข้าวกล้องงอก ศึกษาการคืนตัวอัตราส่วนของข้าวกล้องงอกต่อแป้งข้าวเจ้าในกระบวนการผลิตหลอดช่องข้าวกล้องงอก จากผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบหลอดช่องข้าวกล้องงอก กับปริมาณแป้งข้าวเจ้า 3 ระดับที่ 80 90 และ 100 กรัม จากการศึกษาอายุการเก็บรักษาหลอดช่องข้าวกล้องงอก มีอายุการเก็บรักษา 7 วัน จากการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมี จุลินทรีย์ และทางประสาทสัมผัส หลอดช่องก็มีกลิ่นหืน และเส้นอยู่ยังไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ควรมีการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปเพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกให้ดียิ่งขึ้น

5.2.2 ควรมีการนำข้าวกล้องงอกไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขนมไทยชนิดอื่นๆ เช่น ขนม น้ำดอกไม้วุ้น หรือ เป็นต้น เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวกล้องงอก