การพัฒนาวิธีการทางเคมีวิเคราะหสาหรับการหาชาตุปรอทที่มีปริมา**หน้**อย โดยวิธีซับสตอยค์โอเมตริค ไอโซโทป ไดลูชั้น

นางสาวมาละตี จริงจิตร



วิทยานิพนธ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชา เคมี

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

W.M. 2520

กุมก 15 เมือนก็มีเพลงกับ อีกา พ.ศ 2502

THE DEVELOPMENT OF AN ANALYTICAL TECHNIQUE FOR THE DETERMI NATION OF TRACES OF MERCURY BY SUBSTOICHIOMETRIC ISOTOPE DILUTION METHOD

MISS MALATEE JINGJIT

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Science

Department of Chemistry

Graduate School

Chulalongkorn University

1977

Thesis Title : The Development of an Analytical Technique for the Determination of Traces of Mercury by Substoichiometric Isotope Dilution Method.

Ву

: Miss Malatee Jingjit

Department : Chemistry

Thesis Advisor : Mr. Suchat Mongkolphantha

Accepted by the Graduate School, Chulalongkorn University in partial fulfillment of the requirements for the Master's degree.

Visid . Cachalmel, Dean of Graduate School

(Professor Dr. Visid Prachuabmoh)

Thesis Comittee

hrawa Charlhum Chairman

(Assistant Professor Dr. Pirawan Bhanthumnavin)

S. Monghelphantha Member

(Mr. Suchat Mongkolphantha)

K. Shirt Member

(Dr. Kantika Sirisena)

M. Amorosith' Member

(Associate Professor Maen Amorasithi)

Copyright of the Graduate School, Chulalongkorn University.

หัวข้อวิทยานิพนน์ : การพัฒนาวิธีการทางเคมีวิเคราะห์สำหรับการหาษาตุ

ปรองที่มีปริมาณน้อย โดยวิธีซับสตอยค์โอเมตริค

ไอโซโทป ไคลูขั้น

ชื่อนี้สึต : นางสาวมาละตี้ จริงจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ สุชาติ มงคลพันธุ์

แผนกวิชา : เคมี

ปีการศึกษา : 2520

บทก**ัก**ยอ

การศึกษาเพื่อพัฒนาวิธีวิเคราะหปรอทปริมาณน้อยในสารตัวอยางทาง
ชีววิทยา กระทำโดยการเยาทาสายสารตัวอยางในบรรยากาศของออก โรน และ
นำมาวิเกราะหปริมาณปรอทกวยวิธีซับสตอยคโอเมตริค ไอโซโทป ไดลูซัน โดย
อาศัยเทคนิคของการสกัด ไดตรวจสอบความเชื่อถือไดของเทคนิคการวิเคราะห
นี้โดยใช้ปรอท-203 เป็นสารติดตาม (tracer) ความแนนอนของเทคนิคการ
วิเคราะหทดสอบได้จากการวิเคราะหปริมาณปรอทในสารตัวอยางมาตรฐาน Kale
ของ Dr. Bowen แห่งสหราชอาณาจักร และสารมาตรฐาน Orchard
Leaves และ Bovine Liver ของ The National Bureau of
Standards สหรัฐอเมริกา ขี้กจากัดตำสุดของวิธีวิเคราะหนี้มีคา 0.005
ส่วนในล้านส่วน

เทคนิคการวิเคราะห์ที่พัฒนาแล้วนี้เป็นวิธีที่งาย รางกำ และสิ้นเปลื่อง คาใช้จายน้อย จึงเหมาะสมอยางยิ่งที่จะนำมาใช้ในงานวิเคราะหปรอทปริมาณ น้อยที่ต้องกระทาเป็นประจา Thesis Title: The Development of an Analytical Technique

for the Determination of Traces of Mercury

by Substoichiometric Isotope Dilution Method.

Name : Miss Malatee Jingjit

Thesis Advisor: Mr. Suchat Mongkolphantha

Department : Chemistry

Academic Year: 1977

ABSTRACT

A procedure has been developed for the quantitative determination of traces of mercury in biological samples. The radiochemical separation method involves the combustion of the samples in an oxygen flask, follow by a substoichiometric isotope dilution method utilizing solvent extraction technique. The method was primarily tested using radiotracer experiments and then by analyzing two already certified Standard Reference Materials and a Bowen Standard Kale Sample. The limit of detection is 0.005 ppm. The devoloped technique is comparatively simple, inexpensive, fast and suitable for routine work.

ACKNOWLEDGEMENTS

The author is especially indebted to Mr. Krivuthi
Sukijbumrung, Director of the Office of Atomic Energy for
Peace, whose generous consideration allowed her to enjoy the
privilege of completing her research work at this office.

The author is extremely grateful to Mr. Suchat

Mongkolphantha for his valuable advice, supervision and
encouragement throughout this work. She would also like to
express her sincere appreciation to the University

Development Commission for granting a fellowship and to her
colleaques at the Office of Atomic Energy for Peace especially
Mr. Pathom Yamkate who has shown interest and given assistance
from the beginning till—the end of this work.

CONTENTS

| | | | PAGE |
|-----------|----------------|--------------------------------------|------|
| ABSTRACT | (IN | THAI) | iv |
| ABSTRACT | • • • • | •••••• | * |
| ACKNOWLED | G E MEN | TS | vi |
| LIST OF T | ABLES | | İx |
| LIST OF F | IGURE | S | х |
| CHAPTER | | ~÷ | |
| I. | INTR | ODUCTION | . 1 |
| II. | THEO | RY | • 7 |
| | 2.1 | Isotope Dilution Technique | • 7 |
| | 2.2 | Senstivity, Limitation, Accuracy and | |
| | | Precision | . 11 |
| | 2.3 | Solvent Extraction with Dithizone | . 13 |
| JII. | EXPE | RIMENTAL | . 18 |
| | 3.1 | Materials | . 18 |
| | 3.2 | Apparatus | . 21 |
| | 3.3 | Procedure | . 24 |
| | 3.4 | Radiomercury Measurement | . 27 |
| | 3.5 | Mercury Determination | . 27 |
| | 3.6 | Analytical Scheme | . 30 |
| IV. | RESU. | LTS | . 31 |
| | 4.1 | Determination of the effect of pH | . 31 |
| | 4.2 | Determination of the effect of zinc | |
| | | dithizonate chelating on mercury | . 31 |

| | | PAGE | | |
|--------------|--|----------|--|--|
| 4.3 | Determination of the effect of time for | | | |
| | reaching equilibrium | 31 | | |
| 4.4 | Determination of the selectivity of | | | |
| | substoichiometric extraction of mercury | 32 | | |
| 4.5 | Determination of the effect of masking agent | | | |
| | on substoichiometric extraction of mercury | 32 | | |
| 4.6 | Determination of experimental reproducibility | | | |
| | of substoichiometric extraction of mercury | 32 | | |
| 4.7 | Determination of the reliability of | | | |
| | substoichiometric extraction of mercury | 32 | | |
| 4.8 | Determination of the effect of amount of | | | |
| | hydroxylamine hydrochloride on substoichiometric | | | |
| | extraction of mercury | 33 | | |
| 4.9 | Determination of the reproducibility of the | | | |
| | developed technique | 33 | | |
| 4.10 | Determination of the reliability of the | | | |
| | developed technique | 33 | | |
| V. DISCU | SSION | 46 | | |
| VI. CONC | CLUSTON AND RECOMMENDATION | 48 | | |
| 6.1 | Conclusion | 48 | | |
| 6.2 | Recommendation | 49 | | |
| BIBLIOGRAPHY | | | | |
| VITA | | 50 61 | | |
| W L'U'A | | D.I | | |

LIST OF TABLES

| TABLE | | PAGE |
|-------|--|------|
| 2-1 | Masking agents in dithizone reactions | 16 |
| 4-1 | Effect of pH on the extraction of mercury with | |
| | zinc dithizonate | 34 |
| 4-2 | Effect of zinc dithizonate chelating on 0.6466 | |
| | microgram of mercury | 34 |
| 4-3 | Effect of time for reaching equilibrium on the | |
| | extraction of mercury | 37 |
| 4-4 | Selectivity of substoichiometric extraction of | |
| | mercury in the presence of micro-amount of | |
| | different foreign metals | 39 |
| 4-5 | Selectivity of substoichiometric extraction of | |
| | mercury in the presence of macro-amount of | |
| | different foreign metals | 40 |
| 4-6 | Effect of EDTA on selectivity of substoichiometric | : |
| | extraction of mercury | 41 |
| 4-7 | The experimental reproducibility of | |
| | substoichiometric extraction of mercury | 42 |
| 4-8 | The reliability of substoichiometric extraction | |
| | of mercury | 42 |
| 4-9 | Effect of hydroxylamine hydrochloride on the | |
| | substoichiometric extraction of combustion | |
| | product of mercury | 43 |
| 4-20 | The experimental reproducibility of the developed | |
| | technique | 44 |
| 4-11 | The reliability of the developed technique | 45 |

LIST OF FIGURES

| FIGUR | E | PAGE |
|-------|--|------|
| 3-1 | Single Channel Analyzer | 22 |
| 3-2 | Mechanical Shaker | 22 |
| 3-3 | Combustion Flask with Platinum Holder | 23 |
| 3-4 | Analytical Scheme | 30 |
| 4-1 | Effect of pH on the extraction of mercury with | |
| | zinc dithizonate | 35 |
| 4-2 | Effect of zinc dithizonate chelating on | |
| | 0.6466 microgram of mercury | 36 |
| 4-3 | Effect of time for reaching equilibrium on the | |
| | extraction of mercury | 38 |
| | | |
| | | |