




ภาคผนวก




ภาพผนวกที่ 1 ลักษณะการย้อมติดสีของเชื้อ *Ustilago scitaminea* ภายในเนื้อเยื่ออ้อย หลังทำการปลูกเชื้อโดยวิธีการฉีด sporidia suspension เป็นเวลา 1 วัน ในอ้อย 4 พันธุ์




ภาพผนวกที่ 2 ลักษณะการย้อมติดสีของเชื้อ *Ustilago scitaminea* ภายในเนื้อเยื่ออ้อย หลังทำการปลูกเชื้อโดยวิธีการฉีด sporidia suspension เป็นเวลา 3 วัน ในอ้อย 4 พันธุ์




ภาพผนวกที่ 3 ลักษณะการย้อมติดสีของเชื้อ *Ustilago scitaminea* ภายในเนื้อเยื่ออ้อย หลังทำการปลูกเชื้อโดยวิธีการฉีด sporidia suspension เป็นเวลา 5 วัน ในอ้อย 4 พันธุ์




ภาพผนวกที่ 4 ลักษณะการย้อมติดสีของเชื้อ *Ustilago scitaminea* ภายในเนื้อเยื่ออ้อย หลังทำการปลูกเชื้อโดยวิธีการฉีด sporidia suspension เป็นเวลา 7 วัน ในอ้อย 4 พันธุ์



ภาพผนวกที่ 5 ลักษณะการย้อมติดสีของเชื้อ *Ustilago scitaminea* ภายในเนื้อเยื่ออ้อย หลังทำการปลูกเชื้อโดยวิธีการฉีด sporidia suspension เป็นเวลา 14 วันในอ้อย 4 พันธุ์



ภาพผนวกที่ 6 ลักษณะการย้อมติดสีของเชื้อ *Ustilago scitaminea* ภายในเนื้อเยื่ออ้อย หลังทำการปลูกเชื้อโดยวิธีการฉีด sporidia suspension เป็นเวลา 21 วันในอ้อย 4 พันธุ์



ภาพผนวกที่ 7 ลักษณะการย้อมติดสีของเชื้อ *Ustilago scitaminea* ภายในเนื้อเยื่ออ้อย หลังทำการปลูกเชื้อโดยวิธีการฉีด sporidia suspension เป็นเวลา 28 วันในอ้อย 4 พันธุ์