

การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศเชอร์รี่เพื่อเพิ่มความหวานด้วยวิธีผสมกลับ
ร่วมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุลชนิด ดีแคปส์ และ สนิปส์
ในการคัดเลือก

Cherry Tomato Backcross Breeding to Increase Sweetness
by dCAPS and SNPs Markers in Assisted Selection

ต้นสัก โรจน์คำลือ

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

อรอุบล ชมเดช* และ ภูมิพัฒน์ ทองอยู่

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

จุลภาค ชุ้นวงศ์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Tonsak Rojkhamlue

Department of Horticulture, Faculty of Agriculture Kamphaeng Sean,

Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus

Ornubol Chomdej* and Pumipat Thongyoo

Center for Agricultural Biotechnology, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus

Julapark Chunwongse

Center of Excellence on Agricultural Biotechnology: (AG-BIO/MHESI)

Received: June 1, 2023 ; Revisions: October 31, 2023 ; Accepted: January 4, 2024

บทคัดย่อ

มะเขือเทศเชอร์รี่เป็นมะเขือเทศที่รับประทานผลสด รสชาติจึงมีความสำคัญต่อการบริโภค จึงทำการปรับปรุงสายพันธุ์เชอร์รี่ 154 ที่มีค่าความหวานอยู่ที่ 6-8 องศาบริกซ์ ($^{\circ}$ Brix) ให้มีความหวานขึ้นจากการผสมกลับกับสายพันธุ์ Wva700 ที่มีค่าความหวานอยู่ที่ 9-11 $^{\circ}$ Brix โดยปกติการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีผสมกลับเพื่อการถ่ายทอดลักษณะที่สนใจ 1-2 ลักษณะจากพันธุ์ให้เข้าสู่พันธุ์รับที่เป็นพืชพันธุ์ดีจะใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ 5-6 ชั่วรุ่น งานวิจัยนี้จึงใช้เทคนิค Kompetitive Allele Specific PCR โดยอาศัยเครื่องหมายโมเลกุลชนิดสนิปส์ 200 ตำแหน่ง ที่กระจายในทุกๆ 5 cM ของจีโนมมะเขือเทศและวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม Flapjack เพื่อช่วยคัดเลือกพื้นฐานพันธุ์กรรม

(genetic background) ในทุกรุ่นของการผสมกลับ พร้อมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุลชนิด ดีแคปส์ เพื่อช่วยคัดเลือกยีนความหวาน (*LIN5*) จากการผสมกลับระหว่างมะเขือเทศเชอร์รี่ 154 กับมะเขือเทศสายพันธุ์ Wva700 ผลการศึกษาพบว่า รุ่น BC₁F₁ มีสัดส่วนการกระจายตัวของพันธุ์รับหรือเปอร์เซ็นต์ความเหมือนแม่อยู่ที่ 64-91% รุ่น BC₂F₁ ที่ 81-91% และรุ่น BC₃F₁ ที่ 91-99.6% โดยคัดเลือกต้นที่ต้องการจากค่าความหวานและเปอร์เซ็นต์ความเหมือนแม่ รุ่น BC₁F₁ ได้เลือกต้นที่มีความหวาน 8.3°Brix และมีสัดส่วนของพันธุ์รับที่ 88.1% รุ่น BC₂F₁ ได้เลือกต้นที่มีความหวาน 9.6°Brix และมีสัดส่วนของพันธุ์รับที่ 89.8% และรุ่น BC₃F₁ ได้เลือกต้นที่มีความหวาน 7.6°Brix และมีสัดส่วนของพันธุ์รับที่ 95.6% ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการคัดเลือกต้นที่มีสัดส่วนของพันธุ์รับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยได้ในรุ่นแรกๆ ทำให้มีความแม่นยำในการคัดเลือกลักษณะที่ต้องการสูง และลดระยะเวลาที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์แบบผสมกลับได้

คำสำคัญ: มะเขือเทศ; การปรับปรุงพันธุ์แบบผสมกลับโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือก; เครื่องหมายสนิปส์; ความหวาน

Abstract

Cherry154 is typically consumed fresh, so the taste is essentially required. To enhance their sweetness, the Cherry154 contained a sweetness value at 6-8° Brix was subjected to backcrossing with Wva700 which contained 9-11° Brix. Normally, Backcross breeding is used to transfer 1-2 traits of interest from a donor parent to a recurrent parent. This process takes 5-6 generations to fix genetic background from one to another variety. This research used the Kompetitive Allele Specific PCR technique by 200 SNPs marker-assisted backcrossing in each generation to aid in genetic background selection, covering every 5 cM on the tomato genome and analyzing data with the Flapjack program. It also used a dCAPs marker to select the *LIN5* gene in order to increase sweetness from backcrossing between Cherry154 and Wva700. The results showed plants in BC₁F₁ had various recurrent parent percentage (RPP) values from 64-91%, BC₂F₁ had RPP values varied from 91-81% and BC₃F₁ were 91-99.6%. Plant in each generation were selected based on their sweetness and high value on RPP percentage. Therefore, the plant contained 8.3 °Brix with 88.1% at BC₁F₁, 9.6°Brix with 89.8% at BC₂F₁, and 7.6 °Brix with 95.6% RPP at BC₃F₁ were chosen. It is indicated that a background selection using marker-assisted backcrossing allows plant breeding programs to be potentially precise for trait selection, time-saving, and meeting consumer needs.

Keywords: Tomato; Backcross breeding with marker-assisted selection; SNP markers; Sweetness

1. บทนำ

มะเขือเทศเชอรี่ 154 เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งแต่ปี 2540 เป็นสายพันธุ์ผสมเปิด ผลขนาดเล็ก ทรงรี เมื่อสุกจะมีสีแดงและมีความกรอบ มีลักษณะเด่นคือ ทนร้อน สามารถปลูกได้ดีในประเทศไทย เนื่องจากมะเขือเทศเชอรี่ 154 เป็นมะเขือเทศที่รับประทานผลสด รสชาติจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญต่อความต้องการของผู้บริโภค มะเขือเทศเชอรี่ 154 มีค่าความหวานที่ประมาณ 6-8 °Brix โดยประเมินจากการวัดของแข็งที่ละลายน้ำได้ (soluble solid content, SSC) Fridman *et al.*, 2004 ได้รายงานว่ายีน *LIN5* เป็นยีนหลัก (major gene) ที่ควบคุมลักษณะ SSC ที่ตำแหน่ง °Brix 9-2-5 บนโครโมโซม 9 ทำหน้าที่ผลิต enzyme hydrolase สำหรับย่อยน้ำตาลซูโครสให้เป็นน้ำตาลกลูโคสและฟรุกโตส Noisang (2018) ได้พัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด Derived Cleaved Amplified Polymorphic Sequences (dCAPS) เพื่อใช้คัดแยกอัลลีลของยีน *LIN5* ที่เกี่ยวข้องกับ Sucrose invertase จากการศึกษาความแตกต่างของอัลลีลมะเขือเทศ 11 สายพันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนและห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด InDel3477913 สามารถใช้แยกอัลลีลของยีน *LIN5* ในมะเขือเทศออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีอัลลีลที่มาจาก *Solanum lycopersicum* var. *cerasiforme* (*LIN5-cera*) และกลุ่มที่มีอัลลีลที่มาจาก *S. pimpinellifolium* (*LIN5-pimp*) โดยมะเขือเทศสายพันธุ์ Wva700 จัดอยู่ในกลุ่มที่มีอัลลีล *LIN5-cera* และมะเขือเทศเชอรี่ 154 จัดอยู่ในกลุ่มที่มีอัลลีล *LIN5-pimp* จากนั้นจึงนำมะเขือเทศทั้งสองสายพันธุ์มาผสมกลับเพื่อให้มะเขือเทศเชอรี่ 154 มีความหวานเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มอัลลีล *LIN5-cera*

การปรับปรุงพันธุ์แบบผสมกลับ (backcross breeding) เป็นวิธีการปรับปรุงพันธุ์ที่ให้ผลลัพธ์ที่คาดการณ์และทำได้ โดยเป็นการถ่ายทอดลักษณะที่สนใจจากพันธุ์หนึ่งไปสู่อีกพันธุ์หนึ่ง จากการผสมระหว่างพันธุ์ให้ (donor parent) กับพันธุ์รับ (recurrent parent) หลายชั่วอายุ ซึ่งการผสมกลับในแต่ละครั้ง พันธุกรรมของพันธุ์ให้จะลดลงครั้งหนึ่ง จึงนิยมผสมกลับอย่างน้อย 5-6 ครั้ง เพื่อให้มีสัดส่วนของสายพันธุ์ปรับปรุงเข้าใกล้พันธุ์รับมากที่สุด ในทางทฤษฎีประชากรลูกผสมกลับในรุ่น BC_1F_1 จะมีเปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยความเหมือนแม่ที่ 75% แต่การใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกชิ้นส่วนโครโมโซมของพันธุ์รับ (marker-assisted backcrossing) ในการปรับปรุงพันธุ์แบบผสมกลับนั้น สามารถคัดเลือกต้นที่มีลักษณะที่ต้องการและมีความเหมือนแม่ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยได้ (Frisch *et al.*, 1999; Hasan *et al.*, 2015) และสอดคล้องกับรายงานของ Lasuk (2011) ที่ศึกษาการคัดเลือกชิ้นส่วนโครโมโซมของพันธุ์รับโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลชนิด Simple Sequence Repeat (SSR) 80 ตำแหน่ง ในการคัดเลือกลูกผสมกลับระหว่างมะเขือเทศสายพันธุ์สีดาทิพย์ 3 และมะเขือเทศสายพันธุ์ Wva700 พบว่า รุ่น BC_1F_1 มีสัดส่วนของพันธุ์รับตั้งแต่ 30-80% รุ่น BC_2F_1 มีสัดส่วนของพันธุ์รับอยู่ระหว่าง 65-80% และในรุ่น BC_3F_1 สามารถคัดเลือกลูกผสมกลับที่มีสัดส่วนของพันธุ์รับได้ตั้งแต่ 95-100%

ปัจจุบันมีการใช้เทคนิค Kompetitive Allele Specific PCR (KASP) ในการคัดเลือกชิ้นส่วนโครโมโซมของพันธุ์รับ โดยเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตรวจวิเคราะห์เครื่องหมายโมเลกุลชนิด Single Nucleotide Polymorphism (SNPs) ที่มีความแตกต่างกันของนิวคลีโอไทด์เพียง 1 ตำแหน่ง หรือความแตกต่างกันของชิ้นส่วนที่มีการแทรกหรือขาดหายไปของนิวคลีโอไทด์ช่วงสั้นๆ เรียกว่า insertion /deletion หรือ indel โดยใช้หลักการ

fluorescence based genotyping assay ซึ่งเป็นวิธีที่มีความแม่นยำ ถูกต้อง รวดเร็ว และมีระบบรองรับการตรวจตัวอย่างที่มีจำนวนมากพร้อมๆ กัน (Lifomics, 2020) การคัดเลือกชิ้นส่วนโครโมโซมของพันธุ์รับในการปรับปรุงพันธุ์แบบผสมกลับสามารถลดระยะเวลาของการผสมกลับลงได้ อีกทั้งยังส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง (Barone, 2004) งานวิจัยนี้จึงทำการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศด้วยการผสมกลับระหว่างเชอร์รี่ 154 และ Wva700 เพื่อเพิ่มความหวานจากการเพิ่มอัลลีลของยีน *LIN5-cera* ด้วยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลชนิด dCAP และคัดเลือกชิ้นส่วนโครโมโซมของพันธุ์รับด้วยเทคนิค KASP จากการใช้เครื่องหมายโมเลกุลชนิด SNPs เพื่อให้สามารถเลือกต้นพันธุ์รับที่มีความหวานและมีเปอร์เซ็นต์ความเหมือนแม่ได้อย่างรวดเร็ว

2. วิธีการ

2.1 สายพันธุ์มะเขือเทศและแผนการปรับปรุงพันธุ์: ผสมมะเขือเทศสายพันธุ์เชอร์รี่ 154 (*Solanum lycopersicum* L.) ที่เป็นพันธุ์รับที่มีค่าของแข็งที่ละลายน้ำได้ที่ 6-8 องศาบริกซ์ กับมะเขือเทศสายพันธุ์ Wva700 (*Solanum lycopersicum* var. *cerasiforme*) ที่เป็นพันธุ์ให้ที่มีค่าของแข็งที่ละลายน้ำได้ที่ 9-11 องศาบริกซ์ เมื่อได้ลูกผสมรุ่นที่ 1 (F₁) นำมาผสมกลับเข้าหาพันธุ์รับเพื่อให้ได้ลูกผสมกลับตั้งแต่รุ่นที่ 1 (BC₁F₁) จนถึงลูกผสมรุ่นที่ 3 (BC₃F₁) ตามแผนผังการปรับปรุงพันธุ์ (Figure 1)




Figure1 Breeding program for cherry tomato backcrossing to increase sweetness by dCAPS and SNPs markers in assisted selection

2.2 การสกัดดีเอ็นเอ: เพาะเมล็ดลูกผสมกลับในวัสดุปลูก เมื่อต้นกล้าอายุประมาณ 2 สัปดาห์ สกัดดีเอ็นเอด้วยวิธีของ Fulton *et al.* (1995) ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณดีเอ็นเอด้วยเครื่อง NANODROP 8000 Spectrophotometer (Thermo Fisher Scientific)

2.3 การใช้เครื่องหมายโมเลกุลสำหรับคัดเลือกยีนเป้าหมาย (Foreground selection with dCAPS): คัดเลือก

ลูกผสมด้วยเครื่องหมายโมเลกุลชนิด Derived Cleaved Amplified Polymorphic Sequences (dCAPS) dSNP3477433 ที่จำเพาะต่อยีน *LIN5* ซึ่งเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำตาลภายในผลของมะเขือเทศ Noisang *et al.* (2019) คัดเลือกเฉพาะต้นที่เป็นเฮเทอโรไซกัส อัลลีลของยีน *LIN5* ระหว่าง *S. pimpinellifolium* ที่ได้จากสายพันธุ์เชอร์รี่ 154 (*LIN5-pimp*) และ *S. lycopersicum var. cerasiforme* (*LIN5-cera*) โดยใช้ไพรเมอร์ ดังนี้

Forward primer: 5'-ACAACCCGTTGATCGTCCCTGATAT-3'

Reverse primer: 5' GTCGATTCTCAATCCCTTCC-3'

2.4 การใช้เครื่องหมายโมเลกุลสำหรับคัดเลือกชิ้นส่วนโครโมโซมของพันธุ์รับ (Background selection with SNPs): สกัดดีเอ็นเอปริมาณ 3.75 นาโนกรัม จากต้นที่ถูกคัดเลือกด้วยเครื่องหมายโมเลกุลที่จำเพาะต่อยีนเป้าหมาย (*LIN5*) เพื่อตรวจสอบ genome background ด้วยเครื่องหมายโมเลกุลชนิดสไนป์ส์ จำนวน 200 ตำแหน่ง ที่กระจายในทุกๆ 5 cM ของจีโนมมะเขือเทศด้วยเทคนิค KASP (Smith and Maughan, 2015) โดยการหาลำดับเบสดีเอ็นเอจากบริษัท Straits Biotech ประเทศสิงคโปร์ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม Flapjack version 1.19.09.04; 4th September 2019 (Milne *et al.*, 2010) เพื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์ความเหมือนแม่ (Recurrent Parent Percentage, RPP)

2.4 การวัดค่าความหวานผล: เลือกผลที่เกิดจากกิ่งที่ 2-5 ที่เจริญมาจากกิ่งหลัก (main stem) และเป็นผลที่ 3 จากโคนข้อ โดยแบ่งการเก็บเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะ immature (IM) อายุผล 14 วันหลังการผสม ระยะ mature green (MG) อายุผล 27 วันหลังการผสม ระยะ breaker (BK) อายุผล 42 วันหลังการผสม และระยะ ripening (RP) อายุผล 57 วันหลังการผสม

2.5 หลักการคัดเลือกต้นที่ต้องการ: คัดเลือกต้นที่เป็นเฮเทอโรไซกัสอัลลีลของยีน *LIN5* และมีเปอร์เซ็นต์ความเหมือนแม่สูง ร่วมกับการคัดเลือกต้นที่มีลักษณะที่ดีทางการเกษตร ได้แก่ ขนาดผล รูปร่างผล สีผล ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย (semi-determinate type) และค่าปริมาณความหวานจากการวัด SSC โดยเปรียบเทียบกับสายพันธุ์พ่อและแม่ในแปลงปลูก

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์

งานวิจัยได้ปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล dSNP3477433 ที่จำเพาะต่อยีน *LIN5* (Foreground selection with dCAPS) เพื่อเพิ่มลักษณะความหวาน จากการผสมกลับของสายพันธุ์ Wva700 (*Solanum lycopersicum var. cerasiforme*) กับสายพันธุ์เชอร์รี่ 154 (*Solanum lycopersicum* L.) ที่เป็นพันธุ์รับ โดยในการคัดเลือกได้เลือกเฉพาะต้นที่ให้ผลเป็นเฮเทอโรไซโกตของอัลลีล *LIN5-pimp* (419 bp.) จากมะเขือเทศสายพันธุ์เชอร์รี่ 154 และ *LIN5-cera* (394 bp.) จากมะเขือเทศสายพันธุ์ Wva700 ดังช่องที่ 2, 7, 8, 10, 12 และ 13 (Figure 2) เพื่อย้ายปลูกสำหรับคัดเลือกพี่น้องอื่นๆ ต่อในแปลงปลูก ได้แก่ ขนาดผล รูปร่างผล สีผล ลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย (semi-determinate type) และค่าปริมาณความหวานจากการวัด SSC โดยในรุ่น BC₁F₁ คัดเลือกมา 70 ต้นจาก 189 ต้น BC₂F₁ คัดเลือกมา 92 ต้น จาก 200 ต้น และ BC₃F₁ คัดเลือกมา 92 ต้น

จาก 200 ต้น เพื่อส่งวิเคราะห์ genome background ของพันธุ์รับด้วยเครื่องหมายโมเลกุลชนิดสนิปส์ (Background selection with SNPs)

ผลการวิเคราะห์ genome background ด้วยเทคนิค KASP ด้วยเครื่องหมายโมเลกุลชนิดสนิปส์ 200 ตำแหน่งที่ครอบคลุมทุก 5cM ทั่วทั้งจีโนม ในรุ่น BC₁F₁ จำนวน 70 ต้น มีเครื่องหมายโมเลกุลชนิด สนิปส์ที่สามารถแยกความแตกต่าง (polymorphic) ระหว่างสายพันธุ์ Wva700 กับ สายพันธุ์เซอร์รี่154 จำนวน 20 เครื่องหมาย จากทั้งหมด 200 เครื่องหมาย และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Flapjack พบว่ามีการกระจายตัวของเปอร์เซ็นต์ความเหมือนแม่ (Recurrent Parent Percentage, RPP) ที่ 64-91% โดยพบต้นที่มี RPP ในช่วง 60-65% จำนวน 4 ต้น, RPP 66-70% จำนวน 8 ต้น, RPP 71-75% จำนวน 9 ต้น, RPP 76-80% จำนวน 31 ต้น, RPP 81-85% จำนวน 6 ต้น, RPP 86-90% จำนวน 10 ต้น และ RPP 90-95% จำนวน 2 ต้น (Figure 3) ซึ่งเมื่อคัดเลือก ร่วมกับปริมาณความหวานและลักษณะที่ดีทางการเกษตร เช่น ขนาดผล รูปร่างผล สีผล และลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย (semi-determinate type) แล้ว ได้คัดเลือกได้ต้นที่ดีที่สุดไว้ปรับปรุงพันธุ์ต่อ โดยเป็นต้นที่มีความหวานอยู่ที่ 8.3 °Brix และมี RPP เท่ากับ 88.1% (Table 1, Figure 3 และ Figure 5c)

ผลการวิเคราะห์ของประชากรรุ่น BC₂F₁ จำนวน 92 ต้นพบว่ามีเครื่องหมายโมเลกุลชนิดสนิปส์ ที่สามารถแยกความแตกต่างได้ 88 เครื่องหมาย จากทั้งหมด 200 เครื่องหมาย (20 เครื่องหมายเดิมจากเครื่องหมายโมเลกุลที่สามารถแยกความแตกต่างได้ในรุ่น BC₁F₁ รวมกับ 180 เครื่องหมายที่ตำแหน่งของสนิปส์ใหม่) และเมื่อวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยโปรแกรม Flapjack พบว่ามีการกระจายตัวของเปอร์เซ็นต์ความเหมือนแม่ที่ 81-91% โดยพบต้นที่มี RPP ในช่วง 81-85% จำนวน 37 ต้น และต้นที่มีเปอร์เซ็นต์ความเหมือนแม่ในช่วง 86-91% จำนวน 55 ต้น (Figure 4) ซึ่งเมื่อคัดเลือกร่วมกับปริมาณความหวานและลักษณะที่ดีทางการเกษตร ได้เลือกได้ต้นที่มีความหวาน 9.6°Brix และมี RPP เท่ากับ 89.8% ไว้ปรับปรุงพันธุ์ต่อ (Table 1, Figure 4 และ Figure 5d)




Figure 2 Detection of LIN5 gene using marker dSNP3477433 on a 3% agarose gel electrophoresis (Lane 1: DNA Ladders 1 Kb, Lane 2-13: Progenies from a cross between Cherry154 (LIN5-pimp; 419 bp.) and Wva700 (LIN5-cera; 394 bp.)




Figure 3 Distribution of 70 tomato lines at BC₁F₁ generation varies from 64- 91% Recurrent Parent Percentage (RPP). Arrow indicated selected line contained 88.1% RPP.




Figure 4 Distribution of 92 tomato lines at BC₂F₁ generation varies from 81- 91% Recurrent Parent Percentage (RPP). Arrow indicated selected line contained 89.8% RPP.

ผลการวิเคราะห์ของประชากรรุ่น BC₃F₁ พบว่ามีเครื่องหมายโมเลกุลชนิดสนิปส์ ที่สามารถแยกความแตกต่างได้ 123 เครื่องหมาย จากทั้งหมด 200 เครื่องหมาย (88 เครื่องหมายเดิม จากเครื่องหมายโมเลกุลที่สามารถแยกความแตกต่างได้ในรุ่น BC₂F₁ รวมกับ 112 เครื่องหมายที่ตำแหน่งของสนิปส์ใหม่) และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Flapjack พบว่า มีการกระจายตัวของเปอร์เซ็นต์ความเหมือนแม่ที่ 91-99.6% โดยพบต้นที่มีเปอร์เซ็นต์

ความเหมือนแมโนช่วง 91-95% จำนวน 47 ต้น และต้นที่มีเปอร์เซ็นต์ความเหมือนแมโนช่วง 96-99.6% จำนวน 45 ต้น (Figure 5) ซึ่งเมื่อคัดเลือกร่วมกับปริมาณความหวานและลักษณะที่ดีทางการเกษตร ได้คัดเลือกได้ต้นที่มีความหวาน 7.6°Brix และมี RPP เท่ากับ 95.6% (Table 1, Figure 5 และ Figure 5e)

ค่าเฉลี่ยความแข็งที่ละลายน้ำได้ (SSC) ที่ใช้เป็นตัวแทนของการวัดความหวานของผลมะเขือเทศ พบว่าในสายพันธุ์ที่ใช้เป็นพ่อแม่ ได้แก่ เซอร์รี่154 และ Wva700 มีค่านี้ลดลงค่อนข้างมากในการปลูกเพื่อคัดเลือกในรุ่น BC₃ โดยสายพันธุ์เซอร์รี่154 ลดลงจาก 9.3°Brix ในรุ่น BC₁F₁ และ 9.4°Brix ในรุ่น BC₂F₁ เป็น 6.4°Brix ในรุ่น BC₃F₁ และสายพันธุ์ Wva700 มีค่าเฉลี่ย SSC ลดลงจาก 9.9°Brix ในรุ่น BC₁F₁ และ BC₂F₁ เป็น 6.5°Brix ในรุ่น BC₃F₁ ส่วน ส่วนต้นลูกผสมกลับที่คัดเลือกในรุ่น BC₃F₁ มีค่า Brix ที่แตกต่างกันในแต่ละรุ่น และต่ำที่สุดในรุ่น BC₃ โดยเท่ากับ 7.6°Brix (Table 1)

Table 1 Tomato selected line in each generation from backcrossing between Cherry154 and Wva700. Ten Fruits were selected from each line for SSC testing at the ripening stage.

Gen.	Lines	Type	RPP (%)	SSC (°Brix) ± S.D.	Weight (g) ± S.D.	W: L ratio (cm.)
BC ₁	1	Semi-determinate	88.1	8.3 ± 1.1	7.9 ± 0.8	0.8
	CH154	Semi-determinate	100	9.3 ± 0.7	13.4 ± 1.7	0.7
	Wva700	Indeterminate	0	9.9 ± 1.1	3.3 ± 0.3	1.0
BC ₂	1-10-72	Semi-determinate	89.8	9.6 ± 0.4	7.7 ± 1.0	0.73
	CH154	Semi-determinate	100	9.4 ± 0.5	12.0 ± 0.8	0.73
	Wva700	Indeterminate	0	9.9 ± 1.1	2.6 ± 0.3	0.98
BC ₃	1-10-72-41	Semi-determinate	95.6	7.6 ± 1.3	10.4 ± 1.3	0.71
	CH154	Semi-determinate	100	6.4 ± 0.7	11.6 ± 1.5	0.65
	Wva700	Indeterminate	0	6.5 ± 0.8	2.5 ± 0.3	1.03

3.1 วิจัยผลการทดลอง

การปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีผสมกลับเป็นการถ่ายทอดลักษณะที่สนใจเข้าสู่พืชพันธุ์ดีให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในงานวิจัยนี้คือความหวานที่ควบคุมโดยยีนซูโครสอินเวอร์เทส (*LIN5*) จากมะเขือเทศ *Solanum lycopersicum* var. *cerasiform* สายพันธุ์ Wva700 (*LIN5-cera*) มาผสมกลับกับมะเขือเทศสายพันธุ์เซอร์รี่154 (*LIN5-pimp*) เพื่อเพิ่มความหวานพบว่าเมื่อเปรียบเทียบค่าความหวานทางสถิติ พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในการคัดเลือกรุ่น BC₁ และรุ่น BC₂ ทั้งในสายพันธุ์เซอร์รี่154 และ Wva700 แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในรุ่น BC₃ ทั้งนี้เนื่องจากช่วงเวลาที่ย้ายปลูกเพื่อคัดเลือกในรุ่น BC₃ มีสภาพอากาศไม่เหมาะสม มีฝนตกสลับกับอากาศร้อนและหนาว ทำให้มะเขือเทศปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ค่าของแข็งที่ละลายน้ำได้ที่ได้ในรุ่น BC₃ มีค่าที่แตกต่างไปจากสภาวะปกติ




Figure 5 Distribution of 92 tomato lines at BC₃F₁ generation varies from 91-99.6% Recurrent Parent Percentage (RPP). Arrow indicated selected line contained 95.6% RPP.



Figure 6 Tomato fruit images of parents and selected lines in each generation from backcrossing between Cherry154 and Wva700. Cherry154 (5a); Wva700 (5b); BC₁F₁ (5c); BC₂F₁ (5d) and BC₃F₁ (5e)

ดังนั้นการปลูกทดสอบแต่ละครั้งจึงต้องมีการปลูกสายพันธุ์เปรียบเทียบไว้เพื่ออ้างอิงเสมอซึ่งการทดสอบครั้งนี้ได้ปลูกสายพันธุ์พ่อและแม่ที่เป็นสายพันธุ์แท้ไว้เพื่อเปรียบเทียบ ส่วนในสายพันธุ์ลูกผสมพบว่า รุ่น BC₃มีค่าความหวานต่ำที่สุดที่ 7.6°Brix และความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับรุ่น BC₂ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับรุ่น BC₁ ทั้งนี้อาจเนื่องจากต้นที่คัดเลือกไว้ในแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันในระดับดีเอ็นเอ และยังไม่มีความสม่ำเสมอ ความแตกต่างนั้นจึงไม่สามารถบอกได้ว่ามาจากสภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียว (Table 2)

Table 2 Mean comparison for soluble solid content in the same tomato variety/line among each generation; (A) Cherry154 (B) Wva700 and (C) Backcross. Any two means having the same letter are not significantly different at the 5% level of significance.

(A) CH154		(B) Wva700		(C) Backcross	
Generation	°Brix	Generation	°Brix	Generation	°Brix
BC ₁	9.3 ^a	BC ₁	9.9 ^a	BC ₁	8.3 ^b
BC ₂	9.4 ^a	BC ₂	9.9 ^a	BC ₂	9.5 ^a
BC ₃	6.4 ^b	BC ₃	6.5 ^b	BC ₃	7.6 ^b

การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์จากการใช้เครื่องหมายโมเลกุลชนิดสนิปส์ ด้วยเทคนิค KASP ในรุ่น BC₁F₁ พบว่ามีเครื่องหมายโมเลกุลที่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์ได้เพียง 20 เครื่องหมายจากจำนวนเครื่องหมายที่เลือกทั้งหมด 200 เครื่องหมาย ในขณะที่รุ่น BC₂F₁ พบว่ามีเพิ่มขึ้นอีก 68 เครื่องหมาย จาก 180 เครื่องหมายที่เลือกขึ้นใหม่ รวมเป็น 88 เครื่องหมาย และในรุ่น BC₃F₁ เพิ่มขึ้นอีก 35 เครื่องหมาย จาก 112 เครื่องหมายที่เลือกขึ้นใหม่ รวมเป็น 123 เครื่องหมาย เนื่องจากเครื่องหมายโมเลกุลที่เลือกใช้มาจากฐานข้อมูลของบริษัทผู้ให้บริการ จึงไม่จำเพาะกับประชากรที่ใช้ในงานวิจัย ทำให้ตรวจพบโพลิมอร์ฟิซึมระหว่างสายพันธุ์พ่อและแม่สูงนัก และทำให้เปอร์เซ็นต์ความเหมือนแม่ไม่ได้มีการกระจายตัวแบบปกติ (normal distribution) ในประชากรทดสอบ (Figure 3) Whalen *et al.* (2019) ได้ทำการการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการไม่ทราบข้อมูลจีโนไทป์ของพ่อแม่กับการทราบข้อมูลจีโนไทป์ของพ่อหรือแม่เพียงข้างเดียว พบว่าการมีหลังสามารถเพิ่มความแม่นยำในการกำหนดพ่อแม่ และลดการเกิดผลบวกลวง (false positives) ได้ดีกว่ากรณีแรก ดังนั้นการทราบข้อมูลจีโนไทป์ของสายพันธุ์พ่อและแม่ ทำให้กำหนดเครื่องหมายโมเลกุลที่มีความจำเพาะต่อประชากร และสามารถใช้แยกความแตกต่างของสายพันธุ์ที่ศึกษาได้แม่นยำมากขึ้น ส่งผลให้ได้ลูกผสมที่ต้องการรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุ์ และได้สายพันธุ์ใหม่ที่ตรงตามความต้องการของนักปรับปรุงพันธุ์

ประสิทธิภาพของเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อช่วยคัดเลือกในการปรับปรุงพันธุ์แบบผสมกลับขึ้นกับหลายปัจจัย ได้แก่ ขนาดของประชากรในแต่ละรุ่น ระยะห่างของเครื่องหมายโมเลกุลกับยีนเป้าหมาย และจำนวนของเครื่องหมายโมเลกุลที่ใช้ในการคัดเลือกขึ้นส่วนโครโมโซมของพันธุ์รับ (Hasan *et al.*, 2015) จากตัวอย่างประชากรของ Hospital (2003) พบว่าการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก foreground และ background นั้นทำให้ได้

ต้นที่มีเปอร์เซ็นต์ความเหมือนแม่ได้รวดเร็วว่าการคัดเลือกจากการผสมกลับแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว โดยลูกผสมกลับในรุ่น BC₁-BC₄ มีเปอร์เซ็นต์ความเหมือนแม่ที่ 79%, 92.2%, 98% และ 99% ตามลำดับ Frisch *et al.* (2014) ได้จำลองการทดลองเพื่อหากลยุทธ์ในการคัดเลือกข้าวโพดด้วยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลจากการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดแบบผสมกลับด้วยโปรแกรม PLABSIM พบว่าค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความเหมือนแม่ใน BC₁ เท่ากับ 74% BC₂ เท่ากับ 86.1% และ BC₃ เท่ากับ 92.4% งานวิจัยนี้จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hospital (2003) กับ Frisch *et al.* (2014) ที่คัดเลือกโดยอาศัยการคัดเลือกจีโนมสำหรับ foreground และ background เพื่อให้ได้ต้นที่มีลักษณะที่ต้องการและมีเปอร์เซ็นต์ความเหมือนแม่สูง ด้วยเทคนิค KASP พบว่าในทุกรุ่นที่ทำการคัดเลือกจาก BC₁-BC₃ สามารถคัดเลือกต้นที่ตรงกับความต้องการ และมีค่า RPP ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยทางทฤษฎีของต้นที่เกิดจากการผสมกลับ โดยเฉพาะถ้าสามารถคัดเลือกได้ต้นที่มี RPP ที่สูงได้ตั้งแต่ในรุ่นแรก ๆ ของการผสม จะสามารถลดจำนวนรุ่น (generation) ของการผสมกลับได้ (Barone, 2004; Lübberstedt *et al.*, 2023) โดยลูกผสมกลับในรุ่น BC₁F₁ ที่คัดเลือกมีเปอร์เซ็นต์ความเหมือนแม่ที่ 88.1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยทางทฤษฎีที่ 75 เปอร์เซ็นต์ ลูกผสมกลับในรุ่น BC₂F₁ ที่คัดเลือกมีเปอร์เซ็นต์ความเหมือนแม่ที่ 89.8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยทางทฤษฎีที่ 87.5 เปอร์เซ็นต์ และลูกผสมกลับในรุ่น BC₃F₁ มีเปอร์เซ็นต์ความเหมือนแม่ที่ 95.6 เปอร์เซ็นต์ มีค่าที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยทางทฤษฎีที่ 93.75 เปอร์เซ็นต์ (Figure 7)




Figure 7 Recurrent Parent Percentage; RPP comparison in each generation from tomato backcrossing between cherry154 and Wva700. (Conv.= theoretical proportion of the recurrent parent genome from backcrossing, Max. MAB= maximum value RPP from molecular-assisted backcrossing, Min. MAB= minimum value RPP from molecular-assisted backcrossing, Mean. MAB=mean value RPP from molecular-assisted backcrossing and MAB selected = RPP from selected plant)

ปัจจุบันเทคโนโลยีในการศึกษาลำดับเบสจีโนมและทรานสคริปโตมของมะเขือเทศมีแนวโน้มที่ก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่ใช้เทคนิคพีซีอาร์ เช่น เครื่องหมายโมเลกุลชนิดสปีส์ และการใช้เทคโนโลยี genotyping by sequencing (GBS) อนาคตคาดว่าจะมีเครื่องหมายโมเลกุลใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นพร้อมใช้ และสามารถเข้าถึงได้ ให้กับนักวิจัยและนักปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศในอนาคต (Foolad and Panthee, 2012) ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์จีโนมที่ลดลง แต่ยังคงมีต้นทุนที่สูงกว่าการปรับปรุงพันธุ์แบบผสมกลับด้วยวิธีมาตรฐาน จากรายงาน National Human Genome Research ในการวิเคราะห์ลำดับเบส 1 ล้านเบส มีต้นทุนประมาณ 3 แสนบาท ในปี ค.ศ. 2001 และลดลงเหลือไม่ถึง 3 บาท ในปี 2019 (National Human Genome Research Institute, 2019) ซึ่งคาดว่าในอนาคตอันใกล้ การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อช่วยในการคัดเลือกอาจมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีมาตรฐาน จากค่าแรงงานที่สูงขึ้นเรื่อยๆ Rojkhamlue (2019) ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีผสมกลับแบบต่างๆ พบว่า การปรับปรุงพันธุ์แบบผสมกลับด้วยวิธี whole genome marker-assisted selection โดยใช้ marker-assisted selected (MAS) ร่วมกับ marker-assisted backcrossing (MAB) พบว่ามีต้นทุนที่สูงกว่าการปรับปรุงพันธุ์แบบผสมกลับด้วยวิธีมาตรฐานที่ร้อยละ 26.82 แต่สามารถลดเวลาการปรับปรุงพันธุ์ลงได้ครึ่งหนึ่ง จากความแม่นยำที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ที่ลดลง ส่งผลให้ต้นทุนที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลลดลง น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการนำเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์โมเลกุลสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการปรับปรุงพันธุ์พืชของประเทศไทย

4. สรุป

การปรับปรุงพันธุ์แบบผสมกลับระหว่างสายพันธุ์เชอรี 154 (*Solanum lycopersicum* L.) กับสายพันธุ์ Wva700 (*Solanum lycopersicum* var. *cerasiforme*) โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลชนิดดีแคปส์ เพื่อช่วยคัดเลือกยีนความหวาน (*LIN5*) และชนิดสปีส์ในการคัดเลือก genome background ของประชากรลูกผสมกลับทั้ง 3 รุ่น ทำให้คัดเลือกต้นที่มีเปอร์เซ็นต์ความเหมือนแม่ได้สูงกว่าต้นที่เป็นค่าเฉลี่ยทางทฤษฎี และได้ลูกผสมที่มีลักษณะที่ต้องการ ลดระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ลงได้

5. References

- Barone, A. (2004). Molecular marker-assisted selection for potato breeding. *Amer.J.of Potato Res.*, 81, 111-117.
- Foolad, M.R., & Panthee, D.R. (2012). Marker-Assisted Selection in Tomato Breeding. *Critical Reviews in Plant Sciences*, 31(2), 93-123.
- Fridman, E., Carrari, F., Liu, Y.S., Fernie, A.R., & Zamir, D. (2004). Zooming in on a quantitative trait for tomato yield using interspecific introgressions. *Science*, 305 1786–1789.

- Frisch, M., Bohn, M., & Melchinger, A.E. (1999). Comparison of selection strategies for marker-assisted backcrossing of a gene. *Crop Sci.*, 39, 1295–1301.
- Fulton, T., Chunwongse, J., Tanksley, S.D., Masaphy, S., Levanon, D., Henis, Y., & Kelly, S.L.(1995). Microprep protocol for extraction of DNA from tomato and other herbaceous plants. *Plant Mol. Biol. Rep.*, 13(3), 207-209.
- Hasan, M.M., Rafii, M.Y., Ismail, M.R., Mahmood, M., Rahim, H.A., Alam, M.A., Ashkani, S., Malek, M.A., & Latif, M.A. (2015). Marker-assisted backcrossing: A useful method for rice improvement. *Biotechnol. Biotechnol.*, Equip. 29, 237–254.
- Hospital, F. (2003). *Marker-assisted breeding*. In: H.J. Newbury, editor. *Plant molecular breeding*. Location: Oxford and Boca Raton: Blackwell Publishing and CRC Press, p.30-59.
- Lasuk, R. (2011). Use of molecular markers in tomato breeding to increase soluble solid content and multiple disease resistances. (Master Thesis). Kasetsart University, Bangkok, Thailand. 87p. (in Thai).
- Lifomics (2020). *KASP genotyping*. Retrieved from <https://www.lifomics.com/kasp.html>, May 10, 2020. (in Thai)
- Lübberstedt, T., Beavis, W., & Suza, W. (2023). Marker Assisted Backcrossing. Retrieved from W. P. Suza, & K. R. Lamkey (Eds.), *Molecular Plant Breeding*. Location: Iowa State University Digital Press.
- Milne, I., Shaw, P., Stephen, G., Bayer, M., Cardle, L., Thomas, W., Flavell, A.J., & Marshall, D. (2010). Flapjack-graphical genotype visualization. *Bioinformatics*, 26(24), 3133-3134.
- National Human Genome Research Institute. (2019). *The Cost of Sequencing a Human Genome*. Retrieved from <https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/Sequencing-Human-Genome-cost>, January 10, 2020.
- Noisang J., Luengwilai K., & Chunwongse J. (2019). The development of InDel marker for selection of Lin5 gene associated with sucrose invertase in tomato. *King Mongkut's Agricultural Journal*, 37(2), 190-199.
- Noisang, J. (2018). Study of allele variation in *Lin5* gene associated with soluble solid content and breeding for increasing sugar content in cherry tomato. (Master). Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 62p.
- Rojkhamlue, T. (2019). Cherry tomato breeding to increase sweetness and cost comparison of backcross breeding methods. (Master). Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 71p. (in Thai)
- Smith, S.M., & Maughan P. J. (2015). *SNP genotyping using KASPar assays*. Location: Humana Press, New York.

Whalen, A., Gorjanc, G., & Hickey J.M. (2019). Parentage assignment with genotyping-by-sequencing data. *J Anim Breed Genet*, 136(2), 102–112.