

บทที่ 6

การหาค่าเหมาะสมแบบฝูงอนุภาคโดยใช้ความรู้เชิงลบ

(Particle Swarm Optimization Algorithm with Negative Knowledge : PSONK)

เนื้อหาในบทนี้จะนำเสนออัลกอริทึมแบบใหม่ที่เรียกว่าการหาค่าเหมาะสมแบบฝูงอนุภาคโดยใช้ความรู้เชิงลบ (Particle Swarm Optimization Algorithm with Negative Knowledge : PSONK) ซึ่งเป็นการประยุกต์การคัดเลือกคำตอบ โดยใช้หลักความน่าจะเป็น ในบทนี้จะเสนอหลักการวิธีอัลกอริทึม แนวคิด ลักษณะการตัดทอนคำตอบอัลกอริทึมและตัวอย่างอัลกอริทึมแบบฝูงอนุภาคโดยใช้ความรู้เชิงลบ

6.1 แนวคิดวิธีการหาค่าเหมาะสมแบบฝูงอนุภาคโดยใช้ความรู้เชิงลบ

วิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบฝูงอนุภาคโดยใช้ความรู้เชิงลบ (PSONK) เป็นวิธีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากวิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบฝูงอนุภาค (PSO) ซึ่งมีการพัฒนาโดยใช้ความรู้เชิงลบในกระบวนการหาคำตอบ จากเดิมการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบฝูงอนุภาค (PSO) จะทำการคัดเลือกคำตอบที่ดีที่สุด (Lbest) ในแต่ละฝูง และคำตอบที่ดีที่สุด (Gbest) ในประชากรทั้งหมดเพื่อนำคำตอบที่ได้มาทำการปรับปรุงทิศทางการเคลื่อนที่ แต่การหาค่าเหมาะสมแบบฝูงอนุภาคโดยใช้ความรู้เชิงลบจะทำการหาคำตอบที่แย่ที่สุด (Lworst) ในแต่ละฝูงและคำตอบที่แย่ที่สุด (Gworst) ในประชากรทั้งหมด มาใช้ร่วมกับคำตอบที่ดีที่สุด (Lbest) ในแต่ละฝูง และคำตอบที่ดีที่สุด (Gbest) ในประชากรทั้งหมดเพื่อนำมาปรับปรุงทิศทางการเคลื่อนที่ในการหาคำตอบที่ดีต่อไป จนกว่าจะพบคำตอบที่ดีที่สุด

6.2 ขั้นตอนการทำงานการหาค่าเหมาะสมแบบฝูงอนุภาคโดยใช้ความรู้เชิงลบ ในการแก้ปัญหาสมมูลสายการประกอบลักษณะด้วยที่มีสถานีนงานแบบขนาน

บทนี้เสนอวิธีการหาค่าเหมาะสมแบบฝูงอนุภาคโดยใช้ความรู้เชิงลบ (Particle Swarm Optimization with Negative Knowledge: PSONK) มาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งวิธีการนี้พัฒนามาจากวิธี PSO โดยการหาคำตอบที่ดีที่สุดและแย่ที่สุด โดยนำหลักการความน่าจะเป็นมาประยุกต์ใช้เพื่อหาค่าที่เหมาะสมต่อไป จนกว่าจะพบคำตอบที่ดีที่สุด

ขั้นตอนการทำงานของวิธีการหาค่าเหมาะสมแบบฝูงอนุภาคโดยใช้ความรู้เชิงลบ สามารถแบ่งได้ดังนี้

1. การเตรียมข้อมูล (Data Input)

ในการเตรียมข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ในการหาค่าที่เหมาะสมแบบฝูงอนุภาคโดยความรู้เชิงลบเพื่อใช้แก้ปัญหาการจัดสมดุลจะใช้จำนวนผลิตภัณฑ์ แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ เวลาการทำงาน และเวลาที่ใช้จะใช้เวลาเฉลี่ยในแต่ละชั้นงาน

2. การสร้างสตริงคำตอบเบื้องต้น (Representation & Initialization)

สร้างตารางความน่าจะเป็นในการเลือกงานแรก (First Walk Probability Matrix) ขนาด $1 \times n$ โดยมีค่าความน่าจะเป็นเริ่มต้นเท่ากันทั้งหมดเท่ากับ $\frac{1}{n}$

ตารางความน่าจะเป็นร่วม (Joint Probability Matrix) และตารางความเร็วของอนุภาค (Velocity Matrix) มีขนาด $n \times n$ เมื่อ n คือจำนวนชั้นงานทั้งหมด โดย Joint Probability Matrix มีค่าความน่าจะเป็นร่วมเท่ากับ $\frac{1}{(n-1)}$ ยกเว้นในแนวทแยงมุมจะมีค่าเท่ากับ 0 ส่วนค่า Velocity Matrix เริ่มต้นจะมีเท่ากับ 0 ทั้งหมด (Zero Matrix) และจึงทำการสร้างสตริงคำตอบเบื้องต้น โดยใช้ตารางความน่าจะเป็นในการเลือกงานแรก เพื่อหาลำดับงานแรก และใช้ตารางความน่าจะเป็นร่วมในการหาค่าลำดับอื่นๆ โดยทำการสร้างให้ครบทุกอนุภาคที่กำหนดในแต่ละฝูง ซึ่งสตริงคำตอบที่ได้จะต้องไม่ผิดกับความสัมพันธ์งานก่อนและหลัง

3. การประเมินค่า (Evaluation)

คำนวณหาค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ต้องการ ในที่นี้จะใช้ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ได้แก่ จำนวนสถานีงานที่มีสถานีขนาน จำนวนสถานีงาน ความสมดุลระหว่างสถานีงานและความสมดุลภายในสถานีงานของประชากรคำตอบ

4. การหาค่าที่เหมาะสม (Pareto Based Approach)

การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในงานวิจัยนี้จะใช้เทคนิควิธีเชิงกลุ่มที่ดีที่สุด ที่มีการจัดลำดับแบบ Goldberg (1989) หรือ Non-dominated Sorting เป็นการกำหนดค่าความแข็งแรงให้คำตอบที่ได้จากประชากรทั้งหมด โดยจะถูกจัดแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มที่มีค่าน้อยที่สุดจะเป็นกลุ่มที่ดีที่สุด



5. การคัดเลือกคำตอบ (Selection)

คัดเลือกคำตอบโดยการเรียงค่าความแข็งแรงที่ได้จากน้อยไปมาก โดยทำการเลือกสตริงที่ได้ในจากการกำหนดค่าความแข็งแรง (Fitness Value) ให้แก่สตริงคำตอบ จะใช้วิธีการจัดอันดับแบบ Goldberg (1989) เพื่อจะนำมาคัดเลือกหาสตริงคำตอบที่ดีในแต่ละฝูง (Local Best Solution : Lbest) ซึ่งจะพิจารณาจำนวนสถานีนงานที่น้อยที่สุด และคัดเลือกหาสตริงคำตอบที่แย่ในแต่ละฝูง (Local Worst Solution : Lworst) ซึ่งจะพิจารณาจำนวนสถานีนงานที่มากที่สุด โดยพิจารณาจาก Front ของคำตอบที่ได้จากการ Non-dominated Sorting ในแต่ละฝูง และหาสตริงคำตอบที่ดีของประชากร (Global Best Solution : Gbest) ซึ่งจะพิจารณาจำนวนสถานีนงานที่น้อยที่สุดและสตริงคำตอบที่แย่ของประชากร (Global Worst Solution : Gworst) ซึ่งจะพิจารณาจำนวนสถานีนงานที่มากที่สุด โดยพิจารณาจาก Front ของคำตอบที่ได้จากการ Non-dominated Sorting จากการรวมกันของสตริงคำตอบของทุกฝูง และทำการเก็บค่า Gbest ที่ได้

6. การปรับปรุงตารางความน่าจะเป็น (Update Probability Matrix)

การปรับปรุงค่าตารางการเคลื่อนที่เป็นขั้นตอนที่ทำให้มีการเพิ่มโอกาสในการเลือกคำตอบที่ดี และลดโอกาสการเลือกคำตอบที่แย่ โดยมีหลักการดังนี้

$$V_{(i,j)} = wV_{(i-1,j)} + c_1r_1D_1 + c_2r_2D_2 \tag{6.1}$$

$$X_{(i,j)} = X_{(i-1,j)} + V_{(i,j)} \tag{6.2}$$

- เมื่อ $V_{(i,j)}$ คือ ทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคในฝูงที่ j รอบที่ i
- $X_{(i,j)}$ คือ ค่าความน่าจะเป็นร่วมของเส้นทางการเดินทางของอนุภาคในฝูงที่ j รอบที่ i
- r_1 และ r_2 คือ ค่าสุ่มในช่วง (0, 1)
- c_1 และ c_2 คือ ค่าสัมประสิทธิ์การเรียนรู้ (Learning Factor)
- w คือ น้ำหนักการหน่วง (Inertia Weight)
- D_1 และ D_2 คือ การปรับปรุงค่าความน่าจะเป็นโดยใช้คำตอบในส่วนของ Local และ Global ตามลำดับ

โดยแบ่งออกเป็นการปรับปรุงตารางความน่าจะเป็นในการเลือกงานแรก (First Walk Probability Matrix) และการปรับปรุงตารางทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค (Velocity Matrix) ดังนี้

6.1 การปรับปรุงตารางความน่าจะเป็นในการเลือกงานแรก (First Walk Probability Matrix)

ทำการปรับปรุง First Walk Probability Matrix โดยดูงานที่ถูกเลือกเป็นอันดับแรก ด้วยการเพิ่มค่าความน่าจะเป็นในการเลือกงานลำดับแรกเท่ากับ $Cr/(n-1)$ ในสตริงคำตอบที่ดี และลดค่าความน่าจะเป็นในการเลือกงานอื่น ๆ เท่ากับ $Cr/(n-1)^2$ ส่วนในสตริงคำตอบที่แย่จะทำการลดค่าความน่าจะเป็นในการเลือกงานลำดับแรก เท่ากับ $Cr/(n-1)$ และเพิ่มค่าความน่าจะเป็นในการเลือกงานอื่น ๆ เท่ากับ $Cr/(n-1)^2$

6.2 การปรับปรุงตารางทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค (Velocity Matrix)

ค่าจากการเคลื่อนที่ (Velocity) จะขึ้นอยู่กับค่า Lbest, Lworst, Gbest และ Gworst ซึ่งใช้การให้รางวัลและการลงโทษที่ค่าสุ่ม โดยเพิ่มค่าแก่คู่ลำดับในสตริงที่ดี เท่ากับ $r/(t-2)$ และลดค่าคู่ลำดับอื่นๆ เท่ากับ $r/(t-2)^2$ จากนั้นทำการอัปเดต Velocity Matrix โดยดูจากลำดับงานที่อยู่ติดกัน ด้วยการเพิ่มค่าแก่คู่ลำดับในสตริงคำตอบที่ดี เท่ากับ $Cr/(n-2)$ และลดค่ากับคู่ลำดับอื่นๆ เท่ากับ $Cr/(n-2)^2$ ส่วนในสตริงคำตอบที่แย่จะทำได้เหมือนกันแต่ใช้การลดค่าแก่คู่ลำดับที่ติดกันในสตริงคำตอบ และเพิ่มค่าคู่ลำดับอื่นๆ แทน

6.3 การปรับปรุงตารางความน่าจะเป็นร่วม (Joint Probability Matrix)


การเพิ่มค่าความน่าจะเป็นให้แก่คู่ลำดับในสตริงคำตอบในการปรับปรุงตารางทิศทางการเคลื่อนที่ (Velocity Matrix) โดยใช้สมการที่ (6.2) ในการปรับปรุงเพื่อสุ่มหาสตริงคำตอบในรอบต่อไป

7. เทคนิคการเก็บค่าที่ดีที่สุด (Strategies to Maintain Elitist Solution in the Population)

นำคำตอบที่ได้จากการเก็บค่าที่ดีที่สุดของประชากรไปเปรียบเทียบกับคำตอบที่ได้จากการเก็บค่าที่ดีที่สุดของประชากรในรอบก่อนหน้า โดยจะนำคำตอบที่ได้มาหา Non-dominated Sorting เพื่อหาค่าคำตอบที่ดีที่สุด และทำการเก็บค่าที่ได้จากกลุ่มคำตอบที่มีค่าน้อยที่สุดเพื่อนำไปใช้ในรอบต่อไป

8. สิ้นสุดกระบวนการ (Stopping Criteria)

เมื่อการคำนวณตามขั้นตอนครบแล้ว ดูว่าครบตามจำนวนเจนเนอเรชันที่กำหนดหรือไม่ ถ้าไม่ครบให้วนใหม่ซ้ำอีกจนกว่าจะครบตามเจนเนอเรชันที่กำหนด เมื่อครบกำหนดแล้วจึงนำคำตอบที่ได้จากการเก็บค่าที่ดีที่สุดมาเป็นคำตอบที่ดีที่สุด



รูปที่ 6.1 โครงสร้างของอัลกอริทึม PSONK

6.3 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้วิธีการหาค่าเหมาะสมแบบฝูงอนุภาคโดยใช้ความรู้เชิงลบในการแก้ปัญหาสมดุลสายการประกอบลักษณะตัวยูที่มีสถานงานแบบขนาน


จากขั้นตอนของวิธีการหาค่าเหมาะสมแบบฝูงอนุภาคโดยใช้ความรู้เชิงลบในการแก้ปัญหาสมดุลสายการประกอบลักษณะตัวยูที่มีสถานงานแบบขนาน จากที่ได้นำเสนอขั้นตอนมาทั้งหมด สามารถนำมาทดลองใช้แก้ปัญหาตัวอย่างของสายการผลิตแบบผสมของปัญหา Jackson (1956) มีงานทั้งหมด 11 งาน จำนวนชนิดของผลิตภัณฑ์ 3 ชนิด ได้แก่ A, B และ C มีรอบเวลาในการทำงานในแต่ละสถานงานเท่ากับ 6 ซึ่งมีความสัมพันธ์ของแต่ละงานดังนี้

6.3.1 การเตรียมข้อมูล (Data Input)

6.3.1.1 พารามิเตอร์ที่เหมาะสมของ PSONK ที่ใช้ในตัวอย่าง


- 1. จำนวนอนุภาคในแต่ละฝูง (Number of Particles in each Swarm) กำหนดให้มีค่าเท่ากับ 3
- 2. จำนวนฝูง (Number of Swarms) กำหนดให้มีค่าเท่ากับ 2
- 3. น้ำหนักการหน่วง (Inertia Weight : w) กำหนดให้มีค่าเท่ากับ 1
- 4. ค่าสัมประสิทธิ์การเรียนรู้ (Learning Factor : C_1, C_2) กำหนดให้มีค่าเท่ากับ 0.1

6.3.1.2 การสร้างแผนภาพความสัมพันธ์รวม (Combined Relations Precedence Diagram) แสดงได้ดังรูปที่ 6.2



แผนภาพความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ A

แผนภาพความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ B



แผนภาพความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ C

แผนภาพความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์รวม A, B, C

รูปที่ 6.2 การสร้างแผนภาพความสัมพันธ์รวม (Combined Relations Precedence Diagram)

ของปัญหาตัวอย่างขนาด 11 ชิ้นงานของ Jackson (1956) (ต่อ)

6.3.1.3 การหาเวลาทำงานเฉลี่ยในแต่ละชิ้นงาน จากปัญหาตัวอย่างขนาด 11 ชิ้นงานของ Jackson (1956) ได้ทำการประยุกต์เวลาการทำงานจากเดิมงานที่ 4 มีเวลาการทำงานของผลิตภัณฑ์ B เท่ากับ 7 และผลิตภัณฑ์ A, C มีค่าเท่ากับ 0 เนื่องจากเวลาการทำงานของผลิตภัณฑ์ B เกินรอบเวลาในการทำงานในแต่ละสถานี (Cycle Time = 6) งานที่ 4 จึงสามารถมีสถานีขนานได้ จึงทำการปรับค่าเวลาการทำงานของผลิตภัณฑ์ในงานที่ 4 จากเดิมที่มีเวลาการทำงานของผลิตภัณฑ์ A เท่ากับ 7 ผลิตภัณฑ์ B เท่ากับ 0 และผลิตภัณฑ์ C เท่ากับ 0 ให้มีเวลาการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่สูงที่สุดคือ 7 ทั้งหมด ดังนั้นงานที่ 4 จะมีเวลาการทำงานของผลิตภัณฑ์ A, B และ C เท่ากับ 7 จากนั้นจึงทำการจัดงานลงสถานีงานโดยใช้ค่าเฉลี่ยเวลาการทำงานของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้จากเวลาที่ได้ทำการปรับแล้ว (Modified Time Model) ดังตารางที่ 6.1

ตารางที่ 6.3 ความสัมพันธ์ของชั้นงานในการทำงานข้างหลัง (Precedence Matrix Back)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0

6.3.2 การสร้างสตริงคำตอบเบื้องต้น

การสร้างประชากรเบื้องต้น ขั้นตอนนี้จะทำการเลือกชั้นงานมาจากตารางความน่าจะเป็นร่วม (Matrix Join Probability) และตารางความน่าจะเป็นสำหรับการเลือกงานอันดับแรก (First Walk Matrix Probability) เพื่อใช้ในการเลือกงานในอันดับแรก

ขั้นตอนที่ 1 สร้างเมทริกซ์ของประชากรเริ่มต้นเพื่อใช้ในการเลือกงานแรกในการจัดลำดับ การสร้างตารางความน่าจะเป็นสำหรับการเลือกงานอันดับแรก (First Walk Matrix Probability) จะมีขนาดเท่ากับ $1 \times n = 1 \times 11$ โดย n คือจำนวนชั้นงานทั้งหมด และมีค่าความน่าจะเป็นเริ่มต้นเท่ากันทั้งหมด ซึ่งมีค่าเท่ากับ $1/n = 1/11 = 0.0909$

ตารางที่ 6.4 ค่าความน่าจะเป็นเริ่มต้น (First Walk Matrix Probability)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909

การสร้างตารางทิศทางการเคลื่อนที่ (Velocity Matrix) จะมีขนาดเท่ากับ $n \times n = 11 \times 11$ โดย n คือจำนวนชั้นงานทั้งหมด มีค่าความน่าจะเป็นร่วมเท่ากับ 0

การสร้างตารางความน่าจะเป็นร่วม (Matrix Join Probability) จะมีขนาดเท่ากับ $n \times n = 11 \times 11$ โดย n คือจำนวนชิ้นงานทั้งหมด เส้นทแยงมุมของตารางความน่าจะเป็นร่วมจะมีค่าเท่ากับ 0 และมีค่าความน่าจะเป็นร่วมเท่ากับ $1/(n - 1) = 1/10 = 0.1$

ตารางที่ 6.5 ตารางความน่าจะเป็นร่วม (Matrix Join Probability)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
3	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
4	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
5	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1
8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.1
9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.1
10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.1
11	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-

ขั้นตอนที่ 2 สร้างสตริงคำตอบจากเมทริกซ์แรกตามจำนวนอนุภาคในแต่ละฝูง โดยมีวิธีการสร้างสตริงคำตอบดังนี้

สตริงคำตอบที่ 1: ลำดับงานที่ 1


1. ทำการเลือกงานจากความสัมพันธ์ของชิ้นงานในการทำงานข้างหน้า (Precedence Matrix Front) ในตารางที่ 6.2 และความสัมพันธ์ของชิ้นงานในการทำงานข้างหลัง (Precedence Matrix Back) ในตารางที่ 6.3 ที่มีผลรวมของคอลัมน์เท่ากับ 0 พบว่าชิ้นงานที่ไม่มีงานก่อนหน้าในตารางที่ 6.2 คือชิ้นงานที่ 1 และในตารางที่ 6.3 คืองานที่ 11 เป็นชิ้นงานที่สามารถเลือกได้

2. ชิ้นงานที่สามารถเลือกลงลำดับงานที่ 1 ได้คือชิ้นงานที่ 1 และ 11 พิจารณาจากตารางความน่าจะเป็นในการเลือกงานแรกในตารางที่ 6.4 พบว่าชิ้นงานที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.0909 และ 11 มีค่าเท่ากับ 0.0909 ทำการสุ่มเลือกงาน โดยใช้วิธีการสุ่มเลือกแบบลูเลต (Roulette Wheel Selection) ของ Goldberg (1989) โดยทำการสุ่มค่ามา 1 ตัวเพื่อเลือกชิ้นงานที่จะลงในลำดับที่ 1 ได้คือชิ้นงานที่ 11 จึงนำชิ้นงานที่ 11 ซึ่งเป็นชิ้นงานที่สามารถทำได้แบบย้อนกลับมาจัดลำดับเป็นชิ้นงานแรก

3. ปรับปรุงตารางของชั้นงานในการทำงานข้างหน้า (Precedence Matrix Font) โดยทำการเปลี่ยนเป็น 0 ในแถวที่ 11 ทั้งแถว และให้คอลัมน์ที่ 11 เป็น 1 ทั้งหมด ส่วนในตารางความสัมพันธ์ของชั้นงานในการทำงานข้างหลัง (Precedence Matrix Back) ทำการเปลี่ยนให้คอลัมน์ที่ 11 เป็น 1 ทั้งหมดและในแถวที่ 11 ให้เปลี่ยนเป็น 0 ทั้งแถว

ตารางที่ 6.6 ความน่าจะเป็นในการถูกเลือกงาน

ชั้นงาน	ค่าความน่าจะเป็นในการเลือกงาน	ค่าความน่าจะเป็นในการถูกเลือก	ค่าความน่าจะเป็นสะสม
1	0.0909	0.5000	0.5000
11	0.0909	0.5000	1
รวม	0.1818	1	



รูปที่ 6.3 วงล้อรูเล็ต

ตารางที่ 6.7 ความสัมพันธ์ของชั้นงานในการทำงานข้างหน้า (Precedence Matrix Font) ทำการปรับปรุงครั้งที่ 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

ตารางที่ 6.8 ความสัมพันธ์ของชั้นงานในการทำงานข้างหลัง (Precedence Matrix Back) ทำการปรับปรุงครั้งที่ 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

4. จะได้สตริงคำตอบที่ 1 ในลำดับงานที่ 1 คือ 11

ตารางที่ 6.10 ความสัมพันธ์ของชั้นงานในการทำงานข้างหลัง (Precedence Matrix Back) ทำการปรับปรุงครั้งที่ 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
8	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
9	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

4. จะได้สตริงคำตอบที่ 1 ในลำดับงานที่ 2 คือ 11, 1

ทำซ้ำขั้นตอนเดิมจนกระทั่งงานทุกงานถูกกำหนดลงในสตริงคำตอบของลำดับชั้นงานโดยสามารถสรุปเป็นตารางการคัดเลือกของลำดับชั้นงานที่ 1 ได้ดังนี้

ตารางที่ 6.11 การคัดเลือกลำดับชั้นงานในสตริงที่ 1

No	ลำดับชั้นงานข้างหน้า	ลำดับชั้นงานข้างหลัง	Selected
1	1	11	11
2	1	9, 10	1
3	2, 3, 4, 5	9, 10	4
4	2, 3, 5	9, 10	2
5	3, 5, 6	9, 10	10
6	3, 5, 6	8, 9	9
7	5, 6	7, 8	3
8	5, 6	7, 8	7
9	5, 6	5, 8	5
10	6	8	8
11	6	6	6

ทำการหาลำดับชั้นงานในการทำงานทั้งหมด จะได้สตริงลำดับงานทั้ง 6 ตัว ดังนี้

First Swarm:

String 11 = [11 1 4 2 10 9 3 7 5 8 6]
String 12 = [1 2 5 11 4 6 8 10 9 7 3]
String 13 = [1 5 2 6 4 11 9 8 7 10 3]

Second Swarm:

String 21 = [1 4 2 3 5 11 7 9 6 10 8]
String 22 = [11 10 1 4 8 9 6 5 2 3 7]
String 23 = [1 3 4 11 5 7 10 9 2 6 8]

จากลำดับงานที่ 1 จะทำการจัดลงสถานีงาน เพื่อคำนวณหาค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ โดยมีรอบเวลาในการทำงาน (Cycle Time) เท่ากับ 6 วิธีการจัดสรรงานลงในสถานีงานนั้นจะต้องพิจารณาว่ามีชั้นงานใดที่สามารถมีสถานีงานแบบขนานได้ จากตารางที่ 6.11 พบว่างานที่ 4 สามารถจัดเป็นสถานีงานแบบขนานได้ 1 สถานีเนื่องจากเวลาการทำงานของงานที่ 4 มีเวลาการทำงานเท่ากับ 7 ซึ่งเกินรอบเวลาการทำงานที่กำหนด (Cycle Time) จึงทำการเพิ่มสถานีงานอีก 1 สถานี (สถานีงานแบบขนาน) เมื่อสถานีงานนั้นมีงานที่ 4 ทำงานอยู่ในสถานี (ในที่นี้จะกำหนดให้สถานีการทำงานไม่เกิน 2 สถานีงานเมื่อรวมกับสถานีงานที่เป็นแบบขนาน) และจะมีรอบเวลาการทำงานเท่ากับ 12 โดยจะทำการจัดสรรสถานีงานได้ดังนี้

ตารางที่ 6.12 การคัดเลือกลงสถานีงานของสตริงคำตอบที่ 1


ชั้นงาน	เวลางานเฉลี่ย	เวลาเริ่มการทำงาน	เวลารวม	สถานีงานที่	Cycle Time
11	4	0	4	1	6
1	6	4	10	เกินเวลา	
1	6	0	6	2	6
4*	7	0	7	3	12
2	2	7	9	3	
10	3.3333	9	12.3333	เกินเวลา	
10	3.3333	0	3.3333	4	6
9	3.3333	3.3333	6.6666	เกินเวลา	

ตารางที่ 6.12 การคัดเลือกลงสถานีงานของสตริงคำตอบที่ 1 (ต่อ)

ชั้นงาน	เวลางานเฉลี่ย	เวลาเริ่มการทำงาน	เวลารวม	สถานีงานที่	Cycle Time
9	3.3333	0	3.3333	5	6
3	3.3333	3.3333	6.6666	เกินเวลา	
3	3.3333	0	3.3333	6	6
7	3	3.3333	6.3333	เกินเวลา	
7	3	0	3	7	6
5	1	3	4	7	
8	4	4	8	เกินเวลา	
8	4	0	4	8	6
6	1.3333	4	5.3333	8	

*เนื่องจากงานที่ 4 สามารถมีสถานีงานขนานได้ 1 สถานีงาน Cycle Time จะเท่ากับ 12

จากตารางที่ 6.12 จะได้สถานีงานทั้งหมด 8 สถานีงาน (มี 1 สถานีงานเป็นสถานีขนาน) ดังรูปที่ 6.4



รูปที่ 6.4 สายการประกอบตัวตู้ที่มีสถานีงานขนานของสตริงคำตอบที่ 1

เมื่อจัดชั้นงานลงสถานีงาน จึงทำการคำนวณหาค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ ในงานวิจัยนี้จะทำการหาค่าวัตถุประสงค์ทั้งหมด 3 วัตถุประสงค์ คือ จำนวนสถานีงานมีจำนวนน้อยที่สุด ความสมดุลระหว่างสถานีงานและความสมดุลภายในสถานีงาน ดังนี้

กำหนดให้

- LL คือ จำนวนสถานีงานทั้งหมด (รวมสถานีงานขนานด้วย)
- M คือ จำนวนผลิตภัณฑ์

- D_m

คือ ความต้องการของผลิตภัณฑ์ m
- q_m

คือ อัตราส่วนของผลิตภัณฑ์ m ในสายการประกอบ
- $$q_m = \frac{D_m}{\sum_{m=1}^M D_m} ; 0 \leq q_m \leq 1 \text{ and } \sum_{m=1}^M q_m = 1$$
- s_{km}

คือ เวลาว่างงานของผลิตภัณฑ์ m ในสถานีนงาน k
- IT

คือ เวลาว่างงานเฉลี่ยของสายการประกอบ $IT = \sum_{k=1}^{LL} \sum_{m=1}^M q_m s_{km}$
- S_{km}

คือ สัดส่วนของเวลาว่างงานในสถานีนงาน k ในผลิตภัณฑ์ m
- $$S_{km} = \begin{cases} 0 & \text{if } \sum_{m=1}^M q_m s_{km} \\ \frac{q_m s_{km}}{\sum_{m=1}^M q_m s_{km}}, & \text{ortherwise} \end{cases}$$

1. จำนวนสถานีนงานน้อยที่สุดน้อยที่สุด

$$f_1(X) = \text{Minimum } N_w$$

(6.3)

2. ความสมดุลระหว่างสถานีนงาน

$$f_2(X) = \text{Minimum } B_b = \frac{LL}{LL-1} \sum_{k=1}^{LL} \left[\frac{\sum_{m=1}^M q_m s_{km}}{IT} - \frac{1}{LL} \right]^2$$

(6.4)

3. ความสมดุลภายในสถานีนงาน

$$f_3(X) = \text{Minimum } B_w = \frac{M}{LL(M-1)} \sum_{k=1}^{LL} \sum_{m=1}^M \left(S_{km} - \frac{1}{M} \right)^2$$

(6.5)

สตริงคำตอบที่ 1 จะมีสถานีนงานทั้งหมดเท่ากับ 9

$$f_1(X) = \text{Minimum } N_w = 9$$

ความสมดุลระหว่างสถานีนงานในวัตถุประสงค์ที่ 2 มีวิธีการคำนวณดังนี้

- ค่า LL จะมีค่าเท่ากับ $N_w = 9$
- กำหนดให้ค่า D_m มีค่าเท่ากับ $D_A = 1, D_B = 1, D_C = 1$
- ค่า q_m มีวิธีการคำนวณดังนี้

ผลิตภัณฑ์ A

$$q_A = \frac{1}{(1+1+1)} = 0.3333$$

ผลิตภัณฑ์ B $q_B = \frac{1}{(1+1+1)} = 0.3333$

ผลิตภัณฑ์ C $q_C = \frac{1}{(1+1+1)} = 0.3333$

ค่า s_{km} เป็นการหาเวลาว่างงานในสถานี่งานแต่ละผลิตภัณฑ์สามารถหาได้ดังนี้

ตารางที่ 6.13 ตารางการหาค่า s_{km}

สถานี งาน	งาน	Cycle Time	s_{km}			$q_m s_{km}$			$\sum_{m=1}^M q_m s_{km}$
			A	B	C	A	B	C	
1	11	6	2	2	2	0.66	0.66	0.66	1.98
2	1	6	0	0	0	0	0	0	0
3	2, 4	12	3	3	3	0.99	0.99	0.99	2.97
4	10	6	1	1	0	0.33	0.33	0	0.66
5	9	6	1	0	1	0.33	0	0.33	0.66
6	3	6	1	1	0	0.33	0.33	0	0.66
7	5, 7	6	2	2	2	0.66	0.66	0.66	1.98
8	6, 8	6	0	0	4	0	0	1.32	1.32

ค่า $IT = \sum_{k=1}^{LL} \sum_{m=1}^M q_m s_{km}$

$= [1.98 + 0 + 2.97 + 0.66 + 0.66 + 0.66 + 0.66 + 1.98 + 1.32] = 10.23$

หาค่า $\left[\frac{\sum_{m=1}^M q_m s_{km}}{IT} - \frac{1}{LL} \right]^2$ ทุกสถานีงาน

สถานีงานที่ 1 : $\left[\frac{1.98}{10.23} - \frac{1}{9} \right]^2 = 0.0068$

สถานีงานที่ 2 : $\left[\frac{0}{10.23} - \frac{1}{9} \right]^2 = 0.0123$

สถานีงานที่ 3 : $\left[\frac{2.97}{10.23} - \frac{1}{9} \right]^2 = 0.0321$

สถานีงานที่ 4 : $\left[\frac{0.66}{10.23} - \frac{1}{9} \right]^2 = 0.0022$

สถานีงานที่ 5 : $\left[\frac{0.66}{10.23} - \frac{1}{9} \right]^2 = 0.0022$

สถานีงานที่ 6 : $\left[\frac{0.66}{10.23} - \frac{1}{9} \right]^2 = 0.0022$

สถานีงานที่ 7 : $\left[\frac{1.98}{10.23} - \frac{1}{9} \right]^2 = 0.0068$

สถานีงานที่ 8 : $\left[\frac{1.32}{10.23} - \frac{1}{9} \right]^2 = 0.0003$

ดังนั้น $\sum_{k=1}^{LL} \left[\frac{\sum_{m=1}^M q_m s_{km}}{IT} - \frac{1}{LL} \right]^2 = 0.0649$

ดังนั้นค่าวัตถุประสงค์ที่ 2 จะมีค่าเท่ากับ

$B_b = \frac{9}{9-1} \times 0.0649 = 0.0730$

$f_2(X) = \text{Minimum } B_b = 0.0730$

ความสมดุลภายในสถานีงานในวัตถุประสงค์ที่ 3 มีวิธีการคำนวณดังนี้

ตารางที่ 6.14 ตารางการคำนวณค่า B_w

สถานีงาน	งาน	$\left(S_{km} - \frac{1}{M} \right)^2$			Total
		A	B	C	
1	11	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	1	0.1111	0.1111	0.1111	0.3333
3	2, 4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	10	0.0278	0.0278	0.1111	0.1667
5	9	0.0278	0.1111	0.0278	0.1667
6	3	0.0278	0.0278	0.1111	0.1667
7	5, 7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	6, 8	0.1111	0.1111	0.4444	0.6667

ดังนั้นค่าวัตถุประสงค์ที่ 3 จะมีค่าเท่ากับ

$$B_w = \frac{3}{9(3-1)} \times (0 + 0.3333 + 0 + 0.1667 + 0.1667 + 0.1667 + 0 + 0.6667)$$
$$f_3(X) = \text{Minimum } B_w = 0.2500$$

- จากสตริงลำดับงานที่ 1 จะได้
- 1. Task Sequence 1 = [11 1 4 2 10 9 3 7 5 8 6]
 - 2. มีจำนวนสถานีงานทั้งหมด 9 สถานีงาน (รวม 1 สถานีงานขนาน) มีลำดับงาน
ชั้นในแต่ละสถานี และเวลาการทำงานดังนี้

ตารางที่ 6.15 สถานีงานในสตริงคำตอบที่ 1

สถานีงาน	งานในสถานี	เวลาในการทำงานในสถานี
1	11	4
2	1	6
3 (มีสถานีงานขนาน)	2, 4	9
4	10	3.3333
5	9	3.3333
6	3	3.3333
7	5, 7	4
8	6, 8	5.3333

- 3. ความสมดุลระหว่างสถานีงานมีค่าเท่ากับ 0.0730
 - 4. ความสมดุลภายในสถานีงานมีค่าเท่ากับ 0.2500
- วัตถุประสงค์ของลำดับชั้นงานที่ได้จากสตริงคำตอบทั้ง 6 ตัวมีดังนี้

ตารางที่ 6.16 ตารางการคำนวณค่าวัตถุประสงค์ทั้ง 3 วัตถุประสงค์

ฝูงที่	สตริงคำตอบที่	จำนวน สถานีงาน	ความสมดุลระหว่าง สถานีงาน	ความสมดุลภายใน สถานีงาน
1	1	9	0.0730	0.2500
	2	9	0.0941	0.2500
	3	9	0.1440	0.3056

ตารางที่ 6.16 ตารางการคำนวณค่าวัตถุประสงค์ทั้ง 3 วัตถุประสงค์ (ต่อ)

ฝูงที่	สตริงคำตอบที่	จำนวน สถานีนงาน	ความสมดุระหว่าง สถานีนงาน	ความสมดุภายใน สถานีนงาน
2	1	9	0.0799	0.3078
	2	8	0.0717	0.4688
	3	8	0.0760	0.4688

6.3.3 การคัดเลือกสตริงคำตอบ

การกำหนดค่าความแข็งแรง (Fitness Value) ให้กับสตริงคำตอบจะใช้วิธีการจัดอันดับแบบ Goldberg (1989) โดยค่าอันดับที่ได้นี้จะเป็ค่าความแข็งแรงไม่แท้จริง (Dummy Fitness Value) ในขั้นตอนนี้จะได้เส้นขอบเขตกลุ่มคำตอบที่ดี (Frontier) ออกมาหลายกลุ่มตามค่า Dummy Fitness ซึ่งมีการประเมินค่าดังนี้


6.3.3.1 การคัดเลือก Local Best Solution

ทำการหาค่าที่ดีที่สุด (Lbest) ในแต่ละฝูง โดยพิจารณาจาก Front ของคำตอบที่ได้จำ Non-Dominated Sorting

1. Local Best Solution ฝูงที่ 1 ซึ่งมีการคัดเลือกค่าดังนี้

ขั้นที่ 1 จำนวนสถานีนงานของสตริงคำตอบในฝูงที่ 1 เท่ากันจึงไม่ทำการพิจารณาวัตถุประสงค์นี้

ขั้นที่ 2 พิจารณาค่าความแข็งแรง (Fitness Value) ให้กับสตริงคำตอบที่ได้ทำการเลือกจำนวนสถานีนงานที่น้อยที่สุดแล้วจะได้ค่าดังรูปที่ 6.5 และตารางที่ 6.17



รูปที่ 6.5 ค่า Dummy Fitness ของสตริงคำตอบในฝูงที่ 1

ตารางที่ 6.17 Non-Dominated Sorting ของ Local ในฝูงที่ 1

สตริงคำตอบที่	ความสมดุลง่ายระหว่างสถาน่งาน	ความสมดุลง่ายภายในสถาน่งาน	Front	Crowding Distance	Local
1	0.0730	0.2500	1	Infinity	Lbest
2	0.0941	0.2500	2	Infinity	-
3	0.1440	0.3056	3	Infinity	-

2. Local Best Solution ฝูงที่ 2 ซึ่งมีการคัดเลือกค่าดังนี้

ขั้นที่ 1 จำนวนสถาน่งานของสตริงคำตอบในฝูงที่ 2 ไม่เท่ากันจึงการพิจารณาวัตถุประสงคนี้ก่อน

ตารางที่ 6.18 ค่าจากการคำนวณวัตถุประสงคในฝูงที่ 2


สตริงคำตอบที่	จำนวนสถาน่งาน	ความสมดุลง่ายระหว่างสถาน่งาน	ความสมดุลง่ายภายในสถาน่งาน
1	9	0.0799	0.3078
2	8	0.0717	0.4688
3	8	0.0760	0.4688

ทำการคัดเลือกจำนวนสถานีนงานที่น้อยที่สุดเพื่อทำการหา Local Best Solution

ตารางที่ 6.19 จำนวนสถานีนงานที่น้อยที่สุดในฝูงที่ 2

สตริงคำตอบที่	จำนวน สถานีนงาน	ความสมดุระหว่าง สถานีนงาน	ความสมดุลภายใน สถานีนงาน
2	8	0.0717	0.4688
3	8	0.0760	0.4688

ขั้นที่ 2 พิจารณาค่าความแข็งแรง (Fitness Value) ให้กับสตริงคำตอบที่ได้ทำการเลือกจำนวนสถานีนงานที่น้อยที่สุดแล้วจะได้ค่าดังรูปที่ 6.6 และตารางที่ 6.20



รูปที่ 6.6 ค่า Dummy Fitness ของสตริงคำตอบในฝูงที่ 2

ตารางที่ 6.20 Non-Dominated Sorting ของ Local ในฝูงที่ 2

สตริง คำตอบที่	ความสมดุ ระหว่างสถานีนงาน	ความสมดุ ภายในสถานีนงาน	Front	Crowding Distance	Local
2	0.0717	0.4688	1	Infinity	Lbest
3	0.0760	0.4688	2	Infinity	-


6.3.3.2 การคัดเลือก Local Worst Solution

ทำการหาค่าที่ดีที่สุด (Lworst) ในแต่ละฝูง โดยพิจารณาจาก Front ของคำตอบที่ได้จาก Non-Dominated Sorting

1. Local Worst Solution ฝูงที่ 1 ซึ่งมีการคัดเลือกค่านี้นี้

ขั้นที่ 1 จำนวนสถานีนงานของสตริงคำตอบในฝูงที่ 1 เท่ากันจึงไม่ทำการพิจารณาวัตถุประสงค์นี้

ขั้นที่ 2 พิจารณาค่าความแข็งแรง (Fitness Value) ให้กับสตริงคำตอบที่ได้ทำการเลือกจำนวนสถานีนงานที่น้อยที่สุดแล้วจะได้ค่าดังรูปที่ 6.7 และตารางที่ 6.21



รูปที่ 6.7 ค่า Dummy Fitness ของสตริงคำตอบในฝูงที่ 1

ตารางที่ 6.21 Non-Dominated Sorting ของ Local ในฝูงที่ 1

สตริง คำตอบที่	ความสมดุล ระหว่างสถานีนงาน	ความสมดุล ภายในสถานีนงาน	Front	Crowding Distance	Local
1	0.0730	0.2500	1	Infinity	-
2	0.0941	0.2500	2	Infinity	-
3	0.1440	0.3056	3	Infinity	Lworst

2. Local Worst Solution ฟังก์ชันที่ 2 ซึ่งมีการคัดเลือกค่าดังนี้

ขั้นที่ 1 จำนวนสถานีนงานของสตริงคำตอบในฟังก์ชันที่ 2 ไม่เท่ากันจึงการพิจารณาวัตถุประสงคนี้ก่อน

ตารางที่ 6.22 ค่าจากการคำนวณวัตถุประสงคในฟังก์ชันที่ 2


สตริงคำตอบที่	จำนวน สถานีนงาน	ความสมดุระหว่าง สถานีนงาน	ความสมดุภายใน สถานีนงาน
1	9	0.0799	0.3078
2	8	0.0717	0.4688
3	8	0.0760	0.4688

ทำการคัดเลือกจำนวนสถานีนงานที่มากที่สุดเพื่อทำการหา Local Worst Solution

ตารางที่ 6.23 จำนวนสถานีนงานที่มากที่สุดในฟังก์ชันที่ 2

สตริงคำตอบที่	จำนวน สถานีนงาน	ความสมดุระหว่าง สถานีนงาน	ความสมดุภายใน สถานีนงาน
1	9	0.0799	0.3078

ขั้นที่ 2 พิจารณาค่าความแข็งแรง (Fitness Value) ให้กับสตริงคำตอบที่ได้ทำการเลือกจำนวนสถานีนงานที่น้อยที่สุดแล้วจะได้ค่าดังรูปที่ 6.8 และตารางที่ 6.24



รูปที่ 6.8 ค่า Dummy Fitness ของสตริงคำตอบในฝูงที่ 2

ตารางที่ 6.24 Non-Dominated Sorting ของ Local ในฝูงที่ 2

สตริง คำตอบที่	ความสมดุล ระหว่างสถานีนงาน	ความสมดุล ภายในสถานีนงาน	Front	Crowding Distance	Local
1	0.0799	0.3078	1	Infinity	Lworst

6.3.3.3 การคัดเลือก Global Best Solution

ทำการหาค่าที่ดีที่สุด (Gbest) จากประชากรทั้งหมด โดยพิจารณาจาก Front ของคำตอบที่ได้จาก Non-Dominated Sorting

ขั้นที่ 1 จำนวนสถานีนงานของสตริงคำตอบไม่เท่ากันจึงทำการพิจารณาวัตถุประสงคนี้ก่อน

ตารางที่ 6.25 ตารางการคำนวณค่าวัตถุประสงคทั้ง 3 วัตถุประสงค

ฝูงที่	สตริงคำตอบที่	จำนวน สถานีนงาน	ความสมดุลระหว่าง สถานีนงาน	ความสมดุลภายใน สถานีนงาน
1	1	9	0.0730	0.2500
	2	9	0.0941	0.2500
	3	9	0.1440	0.3056

ตารางที่ 6.25 ตารางการคำนวณค่าวัตถุประสงค์ทั้ง 3 วัตถุประสงค์ (ต่อ)


ฝูงที่	สตริงคำตอบที่	จำนวน สถานีนงาน	ความสมดุระหว่าง สถานีนงาน	ความสมดุภายใน สถานีนงาน
2	1	9	0.0799	0.3078
	2	8	0.0717	0.4688
	3	8	0.0760	0.4688

ทำการคัดเลือกจำนวนสถานีนงานที่น้อยที่สุดเพื่อทำการหา Global Best Solution

ตารางที่ 6.26 จำนวนสถานีนงานที่น้อยที่สุด

ฝูงที่	สตริงคำตอบที่	จำนวน สถานีนงาน	ความสมดุระหว่าง สถานีนงาน	ความสมดุภายใน สถานีนงาน
2	2	8	0.0717	0.4688
	3	8	0.0760	0.4688

ขั้นที่ 2 พิจารณาค่าความแข็งแรง (Fitness Value) ให้กับสตริงคำตอบที่ได้ทำการเลือกจำนวนสถานีนงานที่น้อยที่สุดแล้วจะได้ค่าดังรูปที่ 6.9 และตารางที่ 6.27



รูปที่ 6.9 ค่า Dummy Fitness ของประชากรทั้งหมด

ตารางที่ 6.27 Non-Dominated Sorting ของ Global

ฝูงที่	สตริงคำตอบที่	ความสมดุระหว่าง สถานีนงาน	ความสมดุล ภายในสถานีนงาน	Front	Crowding Distance	Local
2	2	0.0717	0.4688	1	Infinity	Gbest
	3	0.0760	0.4688	2	Infinity	-

6.3.3.4 การคัดเลือก Global Worst Solution

ทำการหาค่าที่ดี่ที่สุด (Gworst) จากประชากรทั้งหมด โดยพิจารณาจาก Front ของคำตอบที่ได้จาก Non-Dominated Sorting

ขั้นที่ 1 จำนวนสถานีนงานของสตริงคำตอบไม่เท่ากันจึงทำการพิจารณาวัตถุประสงคนี้ก่อน

ตารางที่ 6.28 ตารางการคำนวณค่าวัตถุประสงค์ทั้ง 3 วัตถุประสงค์


ฝูงที่	สตริงคำตอบที่	จำนวน สถานีนงาน	ความสมดุระหว่าง สถานีนงาน	ความสมดุลภายใน สถานีนงาน
1	1	9	0.0730	0.2500
	2	9	0.0941	0.2500
	3	9	0.1440	0.3056
2	1	9	0.0799	0.3078
	2	8	0.0717	0.4688
	3	8	0.0760	0.4688

ทำการคัดเลือกจำนวนสถานีนงานที่น้อยที่สุดเพื่อทำการหา Global Best Solution

ตารางที่ 6.29 จำนวนสถานีนงานที่มากที่สุด

ฝูงที่	สตริงคำตอบที่	จำนวน สถานีนงาน	ความสมดุระหว่าง สถานีนงาน	ความสมดุลภายใน สถานีนงาน
1	1	9	0.0730	0.2500
	2	9	0.0941	0.2500
	3	9	0.1440	0.3056
2	1	9	0.0799	0.3078

ขั้นที่ 2 พิจารณาค่าความแข็งแรง (Fitness Value) ให้กับสตริงคำตอบที่ได้ทำการเลือกจำนวนสถานงานที่น้อยที่สุดแล้วจะได้ค่าดังรูปที่ 6.10 และตารางที่ 6.30



รูปที่ 6.10 ค่า Dummy Fitness ของประชากรทั้งหมด

ตารางที่ 6.30 Non-Dominated Sorting ของ Global

ฝูงที่	สตริงคำตอบที่	ความสมดุระหว่างสถานงาน	ความสมดุลภายในสถานงาน	Front	Crowding Distance	Local
1	1	0.0730	0.2500	1	Infinity	-
2	1	0.0799	0.3078	2	Infinity	-
1	2	0.0941	0.2500	2	Infinity	-
1	3	0.1440	0.3056	3	Infinity	Gworst

6.3.3.5 การเก็บค่าที่ดีที่สุด

เทคนิคการเก็บค่าที่ดีที่สุด จะทำการเก็บสตริงคำตอบที่ได้จากการหาค่า Global Best Solution ของประชากรทั้งหมด โดยจะทำการเก็บค่าไว้ดำเนินการในรอบถัดไป

สตริงคำตอบของฝูงใน Local Best ในฝูงที่ 1

String 1 = [11 1 4 2 10 9 3 7 5 8 6]

สตริงคำตอบของฝูงใน Local Best ในฝูงที่ 2

String 3 = [11 10 1 4 8 9 6 5 2 3 7]

สตริงคำตอบของฝูงใน Local Worst ในฝูงที่ 1

String 3 = [1 5 2 6 4 11 9 8 7 10 3]

สตริงคำตอบของฝูงใน Local Worst ในฝูงที่ 2

String 1 = [1 4 2 3 5 11 7 9 6 10 8]

สตริงคำตอบที่ดีที่สุด Global Best ของประชากรทั้งหมด

(ฝูงที่ 2) String 2 = [11 10 1 4 8 9 6 5 2 3 7]

สตริงคำตอบที่แย่ที่สุด Global Worst ของประชากรทั้งหมด

(ฝูงที่ 1) String 3 = [1 5 2 6 4 11 9 8 7 10 3]

6.3.4 การปรับปรุงตาราง

การปรับปรุงตารางตำแหน่งของอนุภาค (Position Matrix) และตารางทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค (Velocity Matrix) จะใช้สตริงคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละฝูง (Lbest) และสตริงคำตอบที่ดีของประชากรทั้งหมด (Gbest) ในการปรับปรุงดังนี้

6.3.4.1 การปรับปรุงในฝูงที่ 1

6.3.4.1.1 ตารางความน่าจะเป็นในการเลือกงานแรก

ทำการอัปเดต First Walk Probability Matrix โดยดูจากงานที่ถูกเลือกเป็นอันดับแรก ด้วยการเพิ่มค่าความน่าจะเป็นในการเลือกงานลำดับแรกเท่ากับ $Cr/(n-1) = 0.1/(11-1) = 0.01$ ในสตริงคำตอบที่ดี และลดค่าความน่าจะเป็นในการเลือกงานอื่น ๆ เท่ากับ $Cr/(n-1)^2 = 0.001$ ส่วนในสตริงคำตอบที่แย่จะทำการลดค่าความน่าจะเป็นในการเลือกงานลำดับแรก เท่ากับ $Cr/(n-1)$ และเพิ่มค่าความน่าจะเป็นในการเลือกงานอื่น ๆ เท่ากับ $Cr/(n-1)^2$ โดยมีวิธีดังนี้

1. Local Best Solution ฝูงที่ 1

String 1 = [11 1 4 2 10 9 3 7 5 8 6]

ทำการเพิ่มค่าความน่าจะเป็นในการเลือกงานลำดับแรกคืองานที่ 11 เท่ากับ $Cr/(n-1) = 0.1/(11-1) = 0.01$ ซึ่งจะอัปเดตเป็น $0.0909 + 0.01 = 0.1009$ และจะลดงานอื่นๆ เท่ากับ $Cr/(n-1)^2 = 0.001$ ซึ่งจะอัปเดตเป็น $0.0909 - 0.001 = 0.0899$ ดังตารางดังนี้

การเพิ่มค่าความน่าจะเป็นจากสตริงคำตอบที่ 11

ตำแหน่งที่ (1,11) มีค่าเท่ากับ $0.0909 + 0.01 = 0.1009$

การลดค่าความน่าจะเป็นจากสตริงคำตอบที่ 11

ตำแหน่งที่ (1,1) มีค่าเท่ากับ $0.0909 - 0.001 = 0.0899$

ตำแหน่งที่ (1,2) มีค่าเท่ากับ $0.0909 - 0.001 = 0.0899$

ตำแหน่งที่ (1,3) มีค่าเท่ากับ $0.0909 - 0.001 = 0.0899$

ตำแหน่งที่ (1,4) มีค่าเท่ากับ $0.0909 - 0.001 = 0.0899$

ตำแหน่งที่ (1,5) มีค่าเท่ากับ $0.0909 - 0.001 = 0.0899$

ตำแหน่งที่ (1,6) มีค่าเท่ากับ $0.0909 - 0.001 = 0.0899$

ตำแหน่งที่ (1,7) มีค่าเท่ากับ $0.0909 - 0.001 = 0.0899$

ตำแหน่งที่ (1,8) มีค่าเท่ากับ $0.0909 - 0.001 = 0.0899$

ตำแหน่งที่ (1,9) มีค่าเท่ากับ $0.0909 - 0.001 = 0.0899$

ตำแหน่งที่ (1,10) มีค่าเท่ากับ $0.0909 - 0.001 = 0.0899$

ตารางที่ 6.31 ตารางการปรับปรุงความน่าจะเป็นสำหรับการเลือกงานอันดับแรก (First Walk Matrix Probability) ของฝูงที่ 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.0899	0.0899	0.0899	0.0899	0.0899	0.0899	0.0899	0.0899	0.0899	0.0899	0.1009

2. Local Worst Solution ฝูงที่ 1

String 3 = [1 5 2 6 4 11 9 8 7 10 3]

ทำการลดค่าความน่าจะเป็นในการเลือกงานลำดับแรกคือ 1 เท่ากับ $Cr/(n-1) = 0.1/(11-1) = 0.01$ และจะเพิ่มงานอื่นๆ เท่ากับ $Cr/(n-1)^2 = 0.001$ ซึ่งจะอัปเดต ดังนี้

การเพิ่มค่าความน่าจะเป็นจากสตริงคำตอบที่ 3

ตำแหน่งที่ (1,1) มีค่าเท่ากับ $0.0899 - 0.01 = 0.0799$

การลดค่าความน่าจะเป็นจากสตริงคำตอบที่ 3

ตำแหน่งที่ (1,2) มีค่าเท่ากับ $0.0899 + 0.001 = 0.0909$

ตำแหน่งที่ (1,3) มีค่าเท่ากับ $0.0899 + 0.001 = 0.0909$

ตำแหน่งที่ (1,4) มีค่าเท่ากับ $0.0899 + 0.001 = 0.0909$

ตำแหน่งที่ (1,5) มีค่าเท่ากับ $0.0899 + 0.001 = 0.0909$

ตำแหน่งที่ (1,6) มีค่าเท่ากับ $0.0899 + 0.001 = 0.0909$

ตำแหน่งที่ (1,7) มีค่าเท่ากับ $0.0899 + 0.001 = 0.0909$

ตำแหน่งที่ (1,8) มีค่าเท่ากับ $0.0899 + 0.001 = 0.0909$

ตำแหน่งที่ (1,9) มีค่าเท่ากับ $0.0899 + 0.001 = 0.0909$

ตำแหน่งที่ (1,10) มีค่าเท่ากับ $0.0899 + 0.001 = 0.0909$

ตำแหน่งที่ (1,11) มีค่าเท่ากับ $0.1009 + 0.001 = 0.1009$

ตารางที่ 6.32 ตารางการปรับปรุงความน่าจะเป็นสำหรับการเลือกงานอันดับแรก (First Walk Matrix Probability) ของฝูงที่ 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.0799	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.1019

3. Global Best Solution

String 2 = [11 10 1 4 8 9 6 5 2 3 7]

ทำการเพิ่มค่าความน่าจะเป็นในการเลือกงานลำดับแรกคืองานที่ 11 เท่ากับ $Cr/(n-1) = 0.1/(11-1) = 0.01$ และจะลดงานอื่นๆ เท่ากับ $Cr/(n-1)^2 = 0.001$ ดังนี้

การเพิ่มค่าความน่าจะเป็นจากสตริงคำตอบที่ 2

ตำแหน่งที่ (1,11) มีค่าเท่ากับ $0.1019 + 0.01 = 0.1119$

การลดค่าความน่าจะเป็นจากสตริงคำตอบที่ 2

ตำแหน่งที่ (1,1) มีค่าเท่ากับ $0.0799 - 0.001 = 0.0789$

ตำแหน่งที่ (1,2) มีค่าเท่ากับ $0.0909 - 0.001 = 0.0899$

ตำแหน่งที่ (1,3) มีค่าเท่ากับ $0.0909 - 0.001 = 0.0899$
ตำแหน่งที่ (1,4) มีค่าเท่ากับ $0.0909 - 0.001 = 0.0899$
ตำแหน่งที่ (1,5) มีค่าเท่ากับ $0.0909 - 0.001 = 0.0899$
ตำแหน่งที่ (1,6) มีค่าเท่ากับ $0.0909 - 0.001 = 0.0899$
ตำแหน่งที่ (1,7) มีค่าเท่ากับ $0.0909 - 0.001 = 0.0899$
ตำแหน่งที่ (1,8) มีค่าเท่ากับ $0.0909 - 0.001 = 0.0899$
ตำแหน่งที่ (1,9) มีค่าเท่ากับ $0.0909 - 0.001 = 0.0899$
ตำแหน่งที่ (1,10) มีค่าเท่ากับ $0.0909 - 0.001 = 0.0899$

ตารางที่ 6.33 ตารางการปรับปรุงความน่าจะเป็นสำหรับการเลือกงานอันดับแรก (First Walk Matrix Probability) ของฝูงที่ 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.0789	0.0899	0.0899	0.0899	0.0899	0.0899	0.0899	0.0899	0.0899	0.0899	0.1119

4. Global Worst Solution

String 3 = [1 5 2 6 4 11 9 8 7 10 3]

ทำการลดค่าความน่าจะเป็นในการเลือกงานลำดับแรกคือ 1
เท่ากับ $Cr/(n-1) = 0.1/(11-1) = 0.01$ และจะเพิ่มงานอื่นๆ เท่ากับ $Cr/(n-1)^2 = 0.001$ ซึ่งจะ
อัปเดต ดังนี้

การเพิ่มค่าความน่าจะเป็นจากสตริงคำตอบที่ 3

ตำแหน่งที่ (1,1) มีค่าเท่ากับ $0.0789 - 0.01 = 0.0689$

การลดค่าความน่าจะเป็นจากสตริงคำตอบที่ 3

ตำแหน่งที่ (1,2) มีค่าเท่ากับ $0.0899 + 0.001 = 0.0909$
ตำแหน่งที่ (1,3) มีค่าเท่ากับ $0.0899 + 0.001 = 0.0909$
ตำแหน่งที่ (1,4) มีค่าเท่ากับ $0.0899 + 0.001 = 0.0909$
ตำแหน่งที่ (1,5) มีค่าเท่ากับ $0.0899 + 0.001 = 0.0909$
ตำแหน่งที่ (1,6) มีค่าเท่ากับ $0.0899 + 0.001 = 0.0909$
ตำแหน่งที่ (1,7) มีค่าเท่ากับ $0.0899 + 0.001 = 0.0909$
ตำแหน่งที่ (1,8) มีค่าเท่ากับ $0.0899 + 0.001 = 0.0909$

ตำแหน่งที่ (1,9) มีค่าเท่ากับ $0.0899 + 0.001 = 0.0909$
ตำแหน่งที่ (1,10) มีค่าเท่ากับ $0.0899 + 0.001 = 0.0909$
ตำแหน่งที่ (1,11) มีค่าเท่ากับ $0.1119 + 0.001 = 0.1129$

ตารางที่ 6.34 ตารางการปรับปรุงความน่าจะเป็นสำหรับการเลือกงานอันดับแรก (First Walk Matrix Probability) ของฝูงที่ 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.0689	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.1129

ดังนั้นตารางที่ 6.34 จะเป็นตารางความน่าจะเป็นในการเลือกงานแรก (First Walk Matrix Probability) ของฝูงที่ 1 หลังจากปรับปรุงคำตอบแล้ว

6.3.4.1.2 การปรับปรุงตารางทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค

การปรับปรุงตารางทิศทางการเคลื่อนที่ (Velocity Matrix) จะขึ้นอยู่กับค่า Lbest, Lworst, Gbest และ Gworst ซึ่งใช้การให้รางวัลและการลงโทษที่ค่า โดยเพิ่มค่าแก่คู่ลำดับในสตริงที่ดี เท่ากับ $r/(t-2)$ และลดค่าคู่ลำดับอื่นๆ เท่ากับ $r/(t-2)^2$

ทำการอัปเดต Velocity Matrix โดยดูจากลำดับงานที่อยู่ติดกัน ด้วยการเพิ่มค่าแก่คู่ลำดับในสตริงคำตอบที่ดี เท่ากับ $Cr/(n-2) = 0.0111$ และลดค่ากับคู่ลำดับอื่นๆ เท่ากับ $Cr/(n-2)^2 = 0.0012$ ส่วนในสตริงคำตอบที่แย่จะทำงานเช่นเดียวกันแต่ใช้การลดค่าแก่คู่ลำดับที่ติดกันในสตริงคำตอบ และเพิ่มค่าคู่ลำดับอื่นๆ แทน

1. Local Best Solution ฝูงที่ 1

String 1 = [11 1 4 2 10 9 3 7 5 8 6]

ทำการเพิ่มค่าความน่าจะเป็นในคู่ลำดับ (11, 1), (1,4), (4,2), ..., (8,6) เท่ากับ $Cr/(n-2) = 0.0111$ ซึ่งจะอัปเดตเป็น $0 + 0.0111 = 0.0111$ (สำหรับคู่ลำดับ (11, 1)) และจะลดงานคู่ลำดับอื่นๆ เท่ากับ $Cr/(n-2)^2 = 0.0012$ ซึ่งจะอัปเดตเป็น $0 - 0.0012 = -0.0012$

การเพิ่มค่าความน่าจะเป็นแก่คู่ลำดับ (11,1) จากสตริงคำตอบที่ 1
ตำแหน่งที่ (11,1) มีค่าเท่ากับ $0 + 0.0111 = 0.0111$

การลดค่าความน่าจะเป็นแก่คู่ลำดับอื่นๆ จากสตริงคำตอบที่ 1

- ตำแหน่งที่ (11,2) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
- ตำแหน่งที่ (11,3) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
- ตำแหน่งที่ (11,4) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
- ตำแหน่งที่ (11,5) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
- ตำแหน่งที่ (11,6) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
- ตำแหน่งที่ (11,7) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
- ตำแหน่งที่ (11,8) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
- ตำแหน่งที่ (11,9) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
- ตำแหน่งที่ (11,10) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
- ตำแหน่งที่ (11,11) มีค่าเท่ากับ 0

การเพิ่มค่าความน่าจะเป็นแก่คู่ลำดับ (1,4) จากสตริงคำตอบที่ 1

- ตำแหน่งที่ (1,4) มีค่าเท่ากับ $0 + 0.0111 = 0.0111$

การลดค่าความน่าจะเป็นแก่คู่ลำดับอื่นๆ จากสตริงคำตอบที่ 1

- ตำแหน่งที่ (1,1) มีค่าเท่ากับ 0
- ตำแหน่งที่ (1,2) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
- ตำแหน่งที่ (1,3) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
- ตำแหน่งที่ (1,5) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
- ตำแหน่งที่ (1,6) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
- ตำแหน่งที่ (1,7) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
- ตำแหน่งที่ (1,8) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
- ตำแหน่งที่ (1,9) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
- ตำแหน่งที่ (1,10) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
- ตำแหน่งที่ (1,11) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$

การเพิ่มค่าความน่าจะเป็นแก่คู่ลำดับ (4,2) จากสตริงคำตอบที่ 1

- ตำแหน่งที่ (4,2) มีค่าเท่ากับ $0 + 0.0111 = 0.0111$

การลดค่าความน่าจะเป็นแก่คู่ลำดับอื่นๆ จากสตริงคำตอบที่ 1

- ตำแหน่งที่ (4,1) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
- ตำแหน่งที่ (4,3) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$

ตำแหน่งที่ (4,4) มีค่าเท่ากับ 0
ตำแหน่งที่ (4,5) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
ตำแหน่งที่ (4,6) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
ตำแหน่งที่ (4,7) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
ตำแหน่งที่ (4,8) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
ตำแหน่งที่ (4,9) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
ตำแหน่งที่ (4,10) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
ตำแหน่งที่ (4,11) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
ทำการปรับปรุงตารางจนครบทุกคู่ลำดับจะได้ดังนี้

ตารางที่ 6.35 ตารางการปรับปรุงทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค (Velocity Matrix) ของฝูงที่ 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-0.0012	-0.0012	0.0111	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012
2	-0.0012	-	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	0.0111	-0.0012
3	-0.0012	-0.0012	-	-0.0012	-0.0012	-0.0012	0.0111	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012
4	-0.0012	0.0111	-0.0012	-	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012
5	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-	-0.0012	-0.0012	0.0111	-0.0012	-0.0012	-0.0012
6	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
7	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	0.0111	-0.0012	-	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012
8	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	0.0111	-0.0012	-	-0.0012	-0.0012	-0.0012
9	-0.0012	-0.0012	0.0111	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-	-0.0012	-0.0012
10	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	0.0111	-	-0.0012
11	0.0111	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-

2. Local Worst Solution ฝูงที่ 1

String 3 = [1 5 2 6 4 11 9 8 7 10 3]

ทำการการลดค่าแก่คู่ลำดับที่ติดกันในสตริงคำตอบ ในคู่ลำดับ (1,5), (5,2), (2,6), ..., (10,3) ในตาราง Velocity Matrix เท่ากับ $Cr/(n-2) = 0.0111$ และจะเพิ่มค่าให้กับคู่ลำดับอื่นๆ เท่ากับ $Cr/(n-2)^2 = 0.0012$ ดังตาราง

การเพิ่มความน่าจะเป็นแก่คู่ลำดับ (1,5) จากสตริงคำตอบที่ 3
ตำแหน่งที่ (1,5) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 - 0.0111 = -0.0123$

การลดค่าความน่าจะเป็นแก่คู่ลำดับอื่นๆ จากสตรึงคำตอบที่ 3

ตำแหน่งที่ (1,1) มีค่าเท่ากับ 0

ตำแหน่งที่ (1,2) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (1,3) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (1,4) มีค่าเท่ากับ $0.0111 + 0.0012 = 0.0123$

ตำแหน่งที่ (1,6) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (1,7) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (1,8) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (1,9) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (1,11) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

การเพิ่มค่าความน่าจะเป็นแก่คู่ลำดับ (5,2) จากสตรึงคำตอบที่ 3

ตำแหน่งที่ (5,2) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 - 0.0111 = 0.0123$

การลดค่าความน่าจะเป็นแก่คู่ลำดับอื่นๆ จากสตรึงคำตอบที่ 3

ตำแหน่งที่ (5,1) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (5,3) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (5,4) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (5,5) มีค่าเท่ากับ 0

ตำแหน่งที่ (5,6) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (5,7) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (5,8) มีค่าเท่ากับ $0.0111 + 0.0012 = 0.0123$

ตำแหน่งที่ (5,9) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (5,10) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (5,11) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

การเพิ่มค่าความน่าจะเป็นแก่คู่ลำดับ (2,6) จากสตรึงคำตอบที่ 3

ตำแหน่งที่ (2,6) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 - 0.0111 = -0.0123$

การลดค่าความน่าจะเป็นแก่คู่ลำดับอื่นๆ จากสตรึงคำตอบที่ 3

ตำแหน่งที่ (2,1) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (2,2) มีค่าเท่ากับ 0

ตำแหน่งที่ (2,3) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (2,4) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$
ตำแหน่งที่ (2,5) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$
ตำแหน่งที่ (2,7) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$
ตำแหน่งที่ (2,8) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$
ตำแหน่งที่ (2,9) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$
ตำแหน่งที่ (2,10) มีค่าเท่ากับ $0.0111 + 0.0012 = 0.0123$
ตำแหน่งที่ (2,11) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$
ทำการปรับปรุงตารางจนครบทุกคู่ลำดับจะได้ดังนี้

ตารางที่ 6.36 ตารางการปรับปรุงทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค (Velocity Matrix) ของฝูงที่ 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	0	0	0.0123	-0.0123	0	0	0	0	0	0
2	0	-	0	0	0	-0.0123	0	0	0	0.0123	0
3	-0.0012	-0.0012	-	-0.0012	-0.0012	-0.0012	0.0111	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012
4	0	0.0123	0	-	0	0	0	0	0	0	-0.0123
5	0	-0.0123	0	0	-	0	0	0.0123	0	0	0
6	0.0012	0.0012	0.0012	-0.0111	0.0012	-	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012
7	0	0	0	0	0.0123	0	-	0	0	-0.0123	0
8	0	0	0	0	0	0.0123	-0.0123	-	0	0	0
9	0	0	0.0123	0	0	0	0	-0.0123	-	0	0
10	0	0	-0.0123	0	0	0	0	0	0.0123	-	0
11	0.0123	0	0	0	0	0	0	0	-0.0123	0	-

3. Global Best Solution

String 2 = [11 10 1 4 8 9 6 5 2 3 7]

ทำการเพิ่มค่าความน่าจะเป็นในคู่ลำดับ (11,10), (10,1), (1,4), ..., (3,7) เท่ากับ $Cr/(n-2) = 0.0111$ และจะลดงานคู่ลำดับอื่นๆ เท่ากับ $Cr/(n-2)^2 = 0.0012$ ดังนี้

การเพิ่มค่าความน่าจะเป็นแก่คู่ลำดับ (11,10) จากสูตรคำตอบที่ 2

ตำแหน่งที่ (11,10) มีค่าเท่ากับ $0 + 0.0111 = 0.0111$

การลดค่าความน่าจะเป็นแก่คู่ลำดับอื่นๆ จากสตริงคำตอบที่ 2

ตำแหน่งที่ (11,1) มีค่าเท่ากับ $0.0123 - 0.0012 = 0.0111$

ตำแหน่งที่ (11,2) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$

ตำแหน่งที่ (11,3) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$

ตำแหน่งที่ (11,4) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$

ตำแหน่งที่ (11,5) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$

ตำแหน่งที่ (11,6) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$

ตำแหน่งที่ (11,7) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$

ตำแหน่งที่ (11,8) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$

ตำแหน่งที่ (11,9) มีค่าเท่ากับ $-0.0123 - 0.0012 = -0.0135$

ตำแหน่งที่ (11,11) มีค่าเท่ากับ 0

การเพิ่มค่าความน่าจะเป็นแก่คู่ลำดับ (10,1) จากสตริงคำตอบที่ 2

ตำแหน่งที่ (10,1) มีค่าเท่ากับ $0 + 0.0111 = 0.0111$

การลดค่าความน่าจะเป็นแก่คู่ลำดับอื่นๆ จากสตริงคำตอบที่ 2

ตำแหน่งที่ (10,2) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$

ตำแหน่งที่ (10,3) มีค่าเท่ากับ $-0.0123 - 0.0012 = -0.0135$

ตำแหน่งที่ (10,4) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$

ตำแหน่งที่ (10,5) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$

ตำแหน่งที่ (10,6) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$

ตำแหน่งที่ (10,7) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$

ตำแหน่งที่ (10,8) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$

ตำแหน่งที่ (10,9) มีค่าเท่ากับ $0.0123 - 0.0012 = 0.0111$

ตำแหน่งที่ (10,10) มีค่าเท่ากับ 0

ตำแหน่งที่ (10,11) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$

การเพิ่มค่าความน่าจะเป็นแก่คู่ลำดับ (1,4) จากสตริงคำตอบที่ 2

ตำแหน่งที่ (1,4) มีค่าเท่ากับ $0.0123 + 0.0111 = 0.0234$

การลดค่าความน่าจะเป็นแก่คู่ลำดับอื่นๆ จากสตริงคำตอบที่ 2

ตำแหน่งที่ (1,1) มีค่าเท่ากับ 0

ตำแหน่งที่ (1,2) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$

ตำแหน่งที่ (1,3) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
ตำแหน่งที่ (1,5) มีค่าเท่ากับ $-0.0123 - 0.0012 = -0.0135$
ตำแหน่งที่ (1,6) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
ตำแหน่งที่ (1,7) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
ตำแหน่งที่ (1,8) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
ตำแหน่งที่ (1,9) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
ตำแหน่งที่ (1,10) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$
ตำแหน่งที่ (1,11) มีค่าเท่ากับ $0 - 0.0012 = -0.0012$

ทำการปรับปรุงตารางจนครบทุกคู่ลำดับจะได้ดังนี้

ตารางที่ 6.37 ตารางการปรับปรุงทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค (Velocity Matrix) ของฝูงที่ 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-0.0012	-0.0012	0.0234	-0.0135	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012
2	-0.0012	-	0.0111	-0.0012	-0.0012	-0.0135	-0.0012	-0.0012	-0.0012	0.0111	-0.0012
3	-0.0024	-0.0024	-	-0.0024	-0.0024	-0.0024	0.0222	-0.0024	-0.0024	-0.0024	-0.0024
4	-0.0012	0.0111	-0.0012	-	-0.0012	-0.0012	-0.0012	0.0111	-0.0012	-0.0012	-0.0135
5	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-	-0.0012	-0.0012	0.0111	-0.0012	-0.0012	-0.0012
6	0	0	0	-0.0123	0.0123	-	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0.0123	0	-	0	0	-0.0123	0
8	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	0.0111	-0.0135	-	0.0111	-0.0012	-0.0012
9	-0.0012	-0.0012	0.0111	-0.0012	-0.0012	0.0111	-0.0012	-0.0135	-	-0.0012	-0.0012
10	0.0111	-0.0012	-0.0135	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	0.0111	-	-0.0012
11	0.0111	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0135	0.0111	-

4. Global Worst Solution

String 3 = [1 5 2 6 4 11 9 8 7 10 3]

ทำการการลดค่าแก่คู่ลำดับที่ติดกันในสตริงคำตอบ ในคู่ลำดับ (1,5), (5,2), (2,6), ..., (10,3) ในตาราง Velocity Matrix เท่ากับ $Cr/(n-2) = 0.0111$ และจะเพิ่มค่าให้กับคู่ลำดับอื่นๆ เท่ากับ $Cr/(n-2)^2 = 0.0012$ ดังนี้

การเพิ่มค่าความน่าจะเป็นแก่คู่ลำดับ (1,5) จากสตริงคำตอบที่ 13

ตำแหน่งที่ (1,5) มีค่าเท่ากับ $-0.0135 - 0.0111 = -0.0246$

การลดค่าความน่าจะเป็นแก่คู่ลำดับอื่นๆ จากสตรึงคำตอบที่ 13

ตำแหน่งที่ (1,1) มีค่าเท่ากับ 0

ตำแหน่งที่ (1,2) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (1,3) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (1,4) มีค่าเท่ากับ $0.0234 + 0.0012 = 0.0246$

ตำแหน่งที่ (1,6) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (1,7) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (1,8) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (1,9) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (1,10) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (1,11) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

การเพิ่มค่าความน่าจะเป็นแก่คู่ลำดับ (5,2) จากสตรึงคำตอบที่ 13

ตำแหน่งที่ (5,2) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 - 0.0111 = -0.0123$

การลดค่าความน่าจะเป็นแก่คู่ลำดับอื่นๆ จากสตรึงคำตอบที่ 13

ตำแหน่งที่ (5,1) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (5,3) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (5,4) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (5,5) มีค่าเท่ากับ 0

ตำแหน่งที่ (5,6) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (5,7) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (5,8) มีค่าเท่ากับ $0.0111 + 0.0012 = 0.0123$

ตำแหน่งที่ (5,9) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (5,10) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (5,11) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

การเพิ่มค่าความน่าจะเป็นแก่คู่ลำดับ (2,6) จากสตรึงคำตอบที่ 13

ตำแหน่งที่ (2,6) มีค่าเท่ากับ $-0.0135 - 0.0111 = -0.0246$

การลดค่าความน่าจะเป็นแก่คู่ลำดับอื่นๆ จากสตรึงคำตอบที่ 13

ตำแหน่งที่ (2,1) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (2,2) มีค่าเท่ากับ 0

ตำแหน่งที่ (2,3) มีค่าเท่ากับ $0.0111 + 0.0012 = 0.0123$

ตำแหน่งที่ (2,4) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (2,5) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (2,7) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (2,8) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (2,9) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ตำแหน่งที่ (2,10) มีค่าเท่ากับ $0.0111 + 0.0012 = 0.0123$

ตำแหน่งที่ (2,11) มีค่าเท่ากับ $-0.0012 + 0.0012 = 0$

ทำการปรับปรุงตารางจนครบทุกคู่ลำดับจะได้ดังนี้

ตารางที่ 6.38 ตารางการปรับปรุงทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค (Velocity Matrix) ของฝูงที่ 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	0	0	0.0246	-0.0246	0	0	0	0	0	0
2	0	-	0.0123	0	0	-0.0246	0	0	0	0.0123	0
3	-0.0024	-0.0024	-	-0.0024	-0.0024	-0.0024	0.0222	-0.0024	-0.0024	-0.0024	-0.0024
4	0	0.0123	0	-	0	0	0	0.0123	0	0	-0.0246
5	0	-0.0123	0	0	-	0	0	0.0123	0	0	0
6	0.0012	0.0012	0.0012	-0.0234	0.0135	-	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012
7	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0135	0.0012	-	0.0012	0.0012	-0.0234	0.0012
8	0	0	0	0	0	0.0123	-0.0246	-	0.0123	0	0
9	0	0	0.0123	0	0	0.0123	0	-0.0246	-	0	0
10	0.0123	0	-0.0246	0	0	0	0	0	0.0123	-	0
11	0.0123	0	0	0	0	0	0	0	-0.0246	0.0123	-

ดังนั้นตารางที่ 6.38 จะเป็นตารางความน่าจะเป็นในการเลือกงานแรก (First Walk Matrix Probability) ของฝูงที่ 1 หลังจากปรับปรุงคำตอบแล้ว

6.3.4.1.3 ตารางการปรับปรุงตารางความน่าจะเป็นร่วม

การปรับปรุงตารางความน่าจะเป็นร่วม (Joint Probability Matrix) สามารถคำนวณได้จากสมการที่ (6.2) ดังนี้

ตารางที่ 6.39 ตาราง Joint Probability Matrix ของฝูงที่ 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	0.1000	0.1000	0.1246	0.0754	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
2	0.1000	-	0.1123	0.1000	0.1000	0.0754	0.1000	0.1000	0.1000	0.1123	0.1000
3	0.0976	0.0976	-	0.0976	0.0976	0.0976	0.1222	0.0976	0.0976	0.0976	0.0976
4	0.1000	0.1123	0.1000	-	0.1000	0.1000	0.1000	0.1123	0.1000	0.1000	0.0754
5	0.1000	0.0877	0.1000	0.1000	-	0.1000	0.1000	0.1123	0.1000	0.1000	0.1000
6	0.1012	0.1012	0.1012	0.0766	0.1135	-	0.1012	0.1012	0.1012	0.1012	0.1012
7	0.1012	0.1012	0.1012	0.1012	0.1135	0.1012	-	0.1012	0.1012	0.0766	0.1012
8	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1123	0.0754	-	0.1123	0.1000	0.1000
9	0.1000	0.1000	0.1123	0.1000	0.1000	0.1123	0.1000	0.0754	-	0.1000	0.1000
10	0.1123	0.1000	0.0754	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1123	-	0.1000
11	0.1123	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.0754	0.1123	-

6.3.4.2 การปรับปรุงในฝูงที่ 2

6.3.4.2.1 ตารางความน่าจะเป็นในการเลือกงานแรก

ทำการอัปเดต First Walk Probability Matrix โดยดูจากงานที่ถูกเลือกเป็นอันดับแรก ด้วยการเพิ่มค่าความน่าจะเป็นในการเลือกงานลำดับแรกเท่ากับ $Cr/(n-1) = 0.1/(11-1) = 0.01$ ในสตริงคำตอบที่ดี และลดค่าความน่าจะเป็นในการเลือกงานอื่น ๆ เท่ากับ $Cr/(n-1)^2 = 0.001$ ส่วนในสตริงคำตอบที่แย่จะทำการลดค่าความน่าจะเป็นในการเลือกงานลำดับแรก เท่ากับ $Cr/(n-1)$ และเพิ่มค่าความน่าจะเป็นในการเลือกงานอื่น ๆ เท่ากับ $Cr/(n-1)^2$ โดยมีวิธีดังนี้

1. Local Best Solution ฝูงที่ 2

String 3 = [11 10 1 4 8 9 6 5 2 3 7]

2. Local Worst Solution ฝูงที่ 2

String 1 = [1 4 2 3 5 11 7 9 6 10 8]

3. Global Best Solution

String 2 = [11 10 1 4 8 9 6 5 2 3 7]

4. Global Worst Solution

String 3 = [1 5 2 6 4 11 9 8 7 10 3]

ตารางที่ 6.40 ตารางความน่าจะเป็นสำหรับการเลือกงานอันดับแรก (First Walk Matrix Probability) ของฝูงที่ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.0689	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.1129

6.3.4.2.2 การปรับปรุงตารางทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค

การปรับปรุงตารางทิศทางการเคลื่อนที่ (Velocity Matrix) จะขึ้นอยู่กับค่า Lbest, Lworst, Gbest และ Gworst ซึ่งใช้การให้รางวัลและการลงโทษที่ค่า โดยเพิ่มค่าแก่คู่ลำดับในสตริงที่ดี เท่ากับ $r/(t-2)$ และลดค่าคู่ลำดับอื่นๆ เท่ากับ $r/(t-2)^2$

ทำการอัปเดต Velocity Matrix โดยดูจากลำดับงานที่อยู่ติดกัน ด้วยการเพิ่มค่าแก่คู่ลำดับในสตริงคำตอบที่ดี เท่ากับ $Cr/(n-2) = 0.0111$ และลดค่ากับคู่ลำดับอื่นๆ เท่ากับ $Cr/(n-2)^2 = 0.0012$ ส่วนในสตริงคำตอบที่แย่จะทำเช่นเดียวกันแต่ใช้การลดค่าแก่คู่ลำดับที่ติดกันในสตริงคำตอบ และเพิ่มค่าคู่ลำดับอื่นๆ แทน

1. Local Best Solution ฝูงที่ 2

String 3 = [11 10 1 4 8 9 6 5 2 3 7]

2. Local Worst Solution ฝูงที่ 2

String 1 = [1 4 2 3 5 11 7 9 6 10 8]

3. Global Best Solution

String 2 = [11 10 1 4 8 9 6 5 2 3 7]

4. Global Worst Solution

String 3 = [1 5 2 6 4 11 9 8 7 10 3]

ตารางที่ 6.41 ตารางทิศทางเคลื่อนที่ของอนุภาค (Velocity Matrix) ของฝูงที่ 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0	0	0	0.0123	-0.0123	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0.0123	0	0	-0.0123	0	0	0	0	0
3	-0.0012	-0.0012	0	-0.0012	-0.0136	-0.0012	0.0235	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012
4	0	-0.0123	0	0	0	0	0	0.0247	0	0	-0.0123
5	0	0.0123	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.0123
6	0	0	0	-0.0123	0.0247	0	0	0	0	-0.0123	0
7	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0	0.0025	-0.0099	-0.0099	0.0025
8	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0136	0	0.0235	-0.0012	-0.0012
9	0	0	0	0	0	0.0123	0	-0.0123	0	0	0
10	0.0247	0	-0.0123	0	0	0	0	-0.0123	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	-0.0123	0	-0.0123	0.0247	0

6.3.4.2.3 ตารางการปรับปรุงตารางความน่าจะเป็นร่วม

การปรับปรุงตารางความน่าจะเป็นร่วม (Joint Probability Matrix) สามารถคำนวณได้จากสมการที่ (6.2) ดังนี้

ตารางที่ 6.42 ตาราง Joint Probability Matrix ของฝูงที่ 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	0.1000	0.1000	0.1123	0.0877	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
2	0.1000	-	0.1123	0.1000	0.1000	0.0877	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
3	0.0988	0.0988	-	0.0988	0.0864	0.0988	0.1235	0.0988	0.0988	0.0988	0.0988
4	0.1000	0.0877	0.1000	-	0.1000	0.1000	0.1000	0.1247	0.1000	0.1000	0.0877
5	0.1000	0.1123	0.1000	0.1000	-	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.0877
6	0.1000	0.1000	0.1000	0.0877	0.1247	-	0.1000	0.1000	0.1000	0.0877	0.1000
7	0.1025	0.1025	0.1025	0.1025	0.1025	0.1025	-	0.1025	0.0901	0.0901	0.1025
8	0.0988	0.0988	0.0988	0.0988	0.0988	0.0988	0.0864	-	0.1235	0.0988	0.0988
9	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1123	0.1000	0.0877	-	0.1000	0.1000
10	0.1247	0.1000	0.0877	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.0877	0.1000	-	0.1000
11	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.0877	0.1000	0.0877	0.1247	-

6.3.6 การสร้างสตริงเบื้องต้นในรอบที่ 2

ขั้นตอนที่ 1 จากรอบที่ 1 จะได้ตารางความน่าจะเป็นสำหรับการเลือกงานอันดับแรก (First Walk Matrix Probability) และ การสร้างตารางความน่าจะเป็นร่วม (Matrix Join Probability) สำหรับการสร้างสตริงในแต่ละฝูง

ตารางที่ 6.43 ตารางความน่าจะเป็นสำหรับการเลือกงานอันดับแรก (First Walk Matrix Probability) ของฝูงที่ 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.0689	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.1129

ตารางที่ 6.44 ตารางความน่าจะเป็นสำหรับการเลือกงานอันดับแรก (First Walk Matrix Probability) ของฝูงที่ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.0689	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.1129

ตารางที่ 6.45 ตารางทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค (Velocity Matrix) ฝูงที่ 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	0	0	0.0246	-0.0246	0	0	0	0	0	0
2	0	-	0.0123	0	0	-0.0246	0	0	0	0.0123	0
3	-0.0024	-0.0024	-	-0.0024	-0.0024	-0.0024	0.0222	-0.0024	-0.0024	-0.0024	-0.0024
4	0	0.0123	0	-	0	0	0	0.0123	0	0	-0.0246
5	0	-0.0123	0	0	-	0	0	0.0123	0	0	0
6	0.0012	0.0012	0.0012	-0.0234	0.0135	-	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012
7	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0135	0.0012	-	0.0012	0.0012	-0.0234	0.0012
8	0	0	0	0	0	0.0123	-0.0246	-	0.0123	0	0
9	0	0	0.0123	0	0	0.0123	0	-0.0246	-	0	0
10	0.0123	0	-0.0246	0	0	0	0	0	0.0123	-	0
11	0.0123	0	0	0	0	0	0	0	-0.0246	0.0123	-

ตารางที่ 6.46 ตารางทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค (Velocity Matrix) ของฟองที่ 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0	0	0	0.0123	-0.0123	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0.0123	0	0	-0.0123	0	0	0	0	0
3	-0.0012	-0.0012	0	-0.0012	-0.0136	-0.0012	0.0235	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012
4	0	-0.0123	0	0	0	0	0	0.0247	0	0	-0.0123
5	0	0.0123	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.0123
6	0	0	0	-0.0123	0.0247	0	0	0	0	-0.0123	0
7	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0	0.0025	-0.0099	-0.0099	0.0025
8	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0136	0	0.0235	-0.0012	-0.0012
9	0	0	0	0	0	0.0123	0	-0.0123	0	0	0
10	0.0247	0	-0.0123	0	0	0	0	-0.0123	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	-0.0123	0	-0.0123	0.0247	0

ตารางที่ 6.47 ตาราง Joint Probability Matrix ของฟองที่ 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	0.1000	0.1000	0.1246	0.0754	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
2	0.1000	-	0.1123	0.1000	0.1000	0.0754	0.1000	0.1000	0.1000	0.1123	0.1000
3	0.0976	0.0976	-	0.0976	0.0976	0.0976	0.1222	0.0976	0.0976	0.0976	0.0976
4	0.1000	0.1123	0.1000	-	0.1000	0.1000	0.1000	0.1123	0.1000	0.1000	0.0754
5	0.1000	0.0877	0.1000	0.1000	-	0.1000	0.1000	0.1123	0.1000	0.1000	0.1000
6	0.1012	0.1012	0.1012	0.0766	0.1135	-	0.1012	0.1012	0.1012	0.1012	0.1012
7	0.1012	0.1012	0.1012	0.1012	0.1135	0.1012	-	0.1012	0.1012	0.0766	0.1012
8	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1123	0.0754	-	0.1123	0.1000	0.1000
9	0.1000	0.1000	0.1123	0.1000	0.1000	0.1123	0.1000	0.0754	-	0.1000	0.1000
10	0.1123	0.1000	0.0754	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1123	-	0.1000
11	0.1123	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.0754	0.1123	-



ตารางที่ 6.48 ตาราง Joint Probability Matrix ของฝูงที่ 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	0.1000	0.1000	0.1123	0.0877	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
2	0.1000	-	0.1123	0.1000	0.1000	0.0877	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
3	0.0988	0.0988	-	0.0988	0.0864	0.0988	0.1235	0.0988	0.0988	0.0988	0.0988
4	0.1000	0.0877	0.1000	-	0.1000	0.1000	0.1000	0.1247	0.1000	0.1000	0.0877
5	0.1000	0.1123	0.1000	0.1000	-	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.0877
6	0.1000	0.1000	0.1000	0.0877	0.1247	-	0.1000	0.1000	0.1000	0.0877	0.1000
7	0.1025	0.1025	0.1025	0.1025	0.1025	0.1025	-	0.1025	0.0901	0.0901	0.1025
8	0.0988	0.0988	0.0988	0.0988	0.0988	0.0988	0.0864	-	0.1235	0.0988	0.0988
9	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1123	0.1000	0.0877	-	0.1000	0.1000
10	0.1247	0.1000	0.0877	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.0877	0.1000	-	0.1000
11	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.0877	0.1000	0.0877	0.1247	-

ขั้นตอนที่ 2 สร้างสตริงคำตอบจากเมทริกซ์ตามจำนวนอนุภาคในแต่ละฝูงโดยตารางความน่าจะเป็นในการเลือกงานแรก (First Walk Probability Matrix) หางานลำดับแรก และตารางความน่าจะเป็นร่วม (Joint Probability Matrix) ในงานลำดับถัดไป โดยสร้างให้ครบทุกอนุภาคในแต่ละฝูง ซึ่งสตริงคำตอบที่ได้จะต้องไม่ขัดกับความสัมพันธ์ก่อน-หลังของภาระงาน ในแต่ละฝูงจะได้สตริงคำตอบ ดังนี้

First Swarm:

- String 1 = [11 9 7 4 5 10 1 2 6 8 3]
- String 2 = [11 10 1 5 4 2 3 8 6 7 9]
- String 3 = [11 10 1 5 4 2 6 3 8 9 7]

Second Swarm:

- String 1 = [11 9 10 7 1 8 6 4 5 2 3]
- String 2 = [11 1 3 2 9 4 7 6 5 8 10]
- String 3 = [11 10 9 8 7 3 5 4 1 6 2]

จากลำดับงานที่ 1 จะทำการจัดลงสถานีนาน เพื่อคำนวณหาค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ โดยมีรอบเวลาในการทำงาน (Cycle Time) เท่ากับ 6 วิธีการจัดสรรงานลงในสถานีนานนั้นจะต้องพิจารณาว่ามีชิ้นงานใดที่สามารถมีสถานีนานแบบขนานได้ จากตารางที่ 6.9 พบว่างานที่ 4 สามารถจัดเป็นสถานีนานแบบขนานได้ 1 สถานีเนื่องจากเวลาการทำงานของงานที่ 4 ในผลิตภัณฑ์ชนิด B มีเวลาการทำงานเท่ากับ 7 ซึ่งเกินรอบเวลาการทำงานที่กำหนด (Cycle Time)


จึงทำการเพิ่มสถานีงานอีก 1 สถานี (สถานีงานแบบขนาน) เมื่อสถานีงานนั้นมียานที่ 4 ทำงานอยู่ในสถานี (ในที่นี้จะกำหนดให้สถานีการทำงานไม่เกิน 2 สถานีงานเมื่อรวมกับสถานีงานที่เป็นแบบขนาน) และจะมีรอบเวลาการทำงานเท่ากับ 12 โดยจะทำการจัดสรรสถานีงานได้ดังนี้

ตารางที่ 6.49 การคัดเลือกลงสถานีงานของสตริงคำตอบที่ 1

ชั้นงาน	เวลางานเฉลี่ย	เวลาเริ่มการทำงาน	เวลารวม	สถานีงานที่	Cycle Time
11	4	0	4	1	6
9	3.3333	4	7.3333	เกินเวลา	
9	3.3333	0	3.3333	2	6
7	3	3	6.3333	เกินเวลา	
7	3	0	3	3	12
4*	7	7	10	3	
5	1	10	11	3	
10	3.3333	11	14.3333	เกินเวลา	
10	3.3333	0	3.3333	4	6
1	6	3.3333	9.3333	เกินเวลา	
1	6	0	6	5	6
2	2	0	2	6	6
6	1.3333	2	3.3333	6	
8	4	3.3333	7.3333	เกินเวลา	
8	4	0	4	7	6
3	3.3333	4	7.3333	เกินเวลา	
3	3.3333	0	3.3333	8	6

*เนื่องจากงานที่ 4 สามารถมีสถานีงานขนานได้ 1 สถานีงาน Cycle Time จะเท่ากับ 12

จากตารางที่ 6.45 จะได้สถานีงานทั้งหมด 9 สถานีงาน (มี 1 สถานีงานเป็นสถานีขนาน) ดังรูปที่ 6.11



รูปที่ 6.11 สายการประกอบตัวที่มีสถานีนงานขนานของสตริงคำตอบที่ 1

เมื่อจัดชั้นงานลงสถานีนงาน จึงทำการคำนวณหาค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ ในงานวิจัยนี้จะทำการหาค่าวัตถุประสงค์ทั้งหมด 3 วัตถุประสงค์ คือ จำนวนสถานีนงานมีจำนวนน้อยที่สุด ความสมดุลระหว่างสถานีนงานและความสมดุลภายในสถานีนงาน ดังนี้

ตารางที่ 6.50 ตารางการคำนวณค่าวัตถุประสงค์ทั้ง 3 วัตถุประสงค์

ฝูงที่	สตริงคำตอบที่	จำนวน สถานีนงาน	ความสมดุลระหว่าง สถานีนงาน	ความสมดุลภายใน สถานีนงาน
1	1	9	0.1184	0.2014
	2	9	0.0730	0.2500
	3	9	0.1440	0.3056
2	1	9	0.0730	0.2500
	2	8	0.1084	0.5313
	3	9	0.1011	0.2847

6.3.7 การคัดเลือกสตริงคำตอบ

การกำหนดค่าความแข็งแรง (Fitness Value) ให้กับสตริงคำตอบจะใช้วิธีการจัดอันดับแบบ Goldberg (1989) โดยค่าอันดับที่ได้นี้จะเป็ค่าความแข็งแรงไม่แท้จริง (Dummy Fitness Value) ในขั้นตอนนี้จะได้เส้นขอบเขตกลุ่มคำตอบที่ดี (Frontier) ออกมาหลายกลุ่มตามค่า Dummy Fitness ซึ่งมีการประเมินค่าดังนี้


6.3.7.1 การคัดเลือก Local Best Solution

ทำการหาค่าที่ดีที่สุด (Lbest) ในแต่ละฝูง โดยพิจารณาจาก Front ของคำตอบที่ได้จาก Non-Dominated Sorting

1. Local Best Solution ฝูงที่ 1 ซึ่งมีการคัดเลือกค่าดังนี้

ขั้นที่ 1 จำนวนสถานีนงานของสตริงคำตอบในฝูงที่ 1 เท่ากันจึงไม่ทำการพิจารณาวัตถุประสงค์นี้

ขั้นที่ 2 พิจารณาค่าความแข็งแรง (Fitness Value) ให้กับสตริงคำตอบที่ได้ทำการเลือกจำนวนสถานีนงานที่น้อยที่สุดแล้วจะได้ค่าดังรูปที่ 6.12 และตารางที่ 6.51



รูปที่ 6.12 ค่า Dummy Fitness ของสตริงคำตอบในฝูงที่ 1

ตารางที่ 6.51 Non-Dominated Sorting ของ Local ในฝูงที่ 1

สตริงคำตอบที่	ความสมดุลระหว่างสถานีนงาน	ความสมดุลภายในสถานีนงาน	Front	Crowding Distance	Local
2	0.0730	0.2500	1	Infinity	Lbest
1	0.1184	0.2014	1	Infinity	Lbest
3	0.1440	0.3056	2	Infinity	-

2. Local Best Solution ฟังก์ชันที่ 2 ซึ่งมีการคัดเลือกค่าดังนี้

ขั้นที่ 1 จำนวนสถานีนงานของสตริงคำตอบในฟังก์ชันที่ 2 ไม่เท่ากันจึงการพิจารณาวัตถุประสงคนี้ก่อน

ตารางที่ 6.52 ค่าจากการคำนวณวัตถุประสงค์ทั้ง 3 วัตถุประสงค์ในฟังก์ชันที่ 2


สตริงคำตอบที่	จำนวนสถานีนงาน	ความสมดุระหว่าง สถานีนงาน	ความสมดุภายใน สถานีนงาน
1	9	0.0730	0.2500
2	8	0.1084	0.5313
3	9	0.1011	0.2847

ทำการคัดเลือกจำนวนสถานีนงานที่น้อยที่สุดเพื่อทำการหา Local Best Solution

ตารางที่ 6.53 จำนวนสถานีนงานที่น้อยที่สุดในฟังก์ชันที่ 2

สตริงคำตอบที่	จำนวน สถานีนงาน	ความสมดุระหว่าง สถานีนงาน	ความสมดุภายใน สถานีนงาน
2	8	0.1084	0.5313

ขั้นที่ 2 พิจารณาค่าความแข็งแรง (Fitness Value) ให้กับสตริงคำตอบที่ได้ทำการเลือกจำนวนสถานีนงานที่น้อยที่สุดแล้วจะได้ค่าดังรูปที่ 6.13 และตารางที่ 6.54



รูปที่ 6.13 ค่า Dummy Fitness ของสตริงคำตอบในฝูงที่ 2

ตารางที่ 6.54 Non-Dominated Sorting ของ Local ในฝูงที่ 2

สตริง คำตอบที่	ความสมดุล ระหว่างสถานีนงาน	ความสมดุล ภายในสถานีนงาน	Front	Crowding Distance	Local
2	0.1084	0.5313	1	Infinity	Lbest


6.3.7.2 การคัดเลือก Local Worst Solution

ทำการหาค่าที่ดี่ที่สุด (Lworst) ในแต่ละฝูง โดยพิจารณาจาก Front ของคำตอบที่ได้จาก Non-Dominated Sorting

1. Local Worst Solution ฝูงที่ 1 ซึ่งมีการคัดเลือกค่าดังนี้

ขั้นที่ 1 จำนวนสถานีนงานของสตริงคำตอบในฝูงที่ 1 เท่ากันจึงไม่ทำการพิจารณาวัตถุประสงคนี้

ขั้นที่ 2 พิจารณาค่าความแข็งแรง (Fitness Value) ให้กับสตริงคำตอบที่ได้ทำการเลือกจำนวนสถานีนงานที่มากที่สุดแล้วจะได้ค่าดังรูปที่ 6.14 และตารางที่ 6.55



รูปที่ 6.14 ค่า Dummy Fitness ของสตริงคำตอบในฝูงที่ 1

ตารางที่ 6.55 Non-Dominated Sorting ของ Local ในฝูงที่ 1

สตริงคำตอบที่	ความสมดุลง่ายระหว่างสถานงาน	ความสมดุลง่ายภายในสถานงาน	Front	Crowding Distance	Local
2	0.0730	0.2500	1	Infinity	-
1	0.1184	0.2014	1	Infinity	-
3	0.1440	0.3056	2	Infinity	Lworst

2. Local Worst Solution ฝูงที่ 2 ซึ่งมีการคัดเลือกค่าดังนี้

ขั้นที่ 1 จำนวนสถานงานของสตริงคำตอบในฝูงที่ 2 ไม่เท่ากันจึงการพิจารณาวัตถุประสงคนี้ก่อน

ตารางที่ 6.56 ค่าจากการคำนวณวัตถุประสงคทั้ง 3 วัตถุประสงคในฝูงที่ 2


สตริงคำตอบที่	จำนวนสถานงาน	ความสมดุลง่ายระหว่างสถานงาน	ความสมดุลง่ายภายในสถานงาน
1	9	0.0730	0.2500
2	8	0.1084	0.5313
3	9	0.1011	0.2847

ทำการคัดเลือกจำนวนสถานีนงานที่น้อยที่สุดเพื่อทำการหา Local Best Solution

ตารางที่ 6.57 จำนวนสถานีนงานที่น้อยที่สุดในฝูงที่ 2

สตริงคำตอบที่	จำนวน สถานีนงาน	ความสมดุระหว่าง สถานีนงาน	ความสมดุลภายใน สถานีนงาน
1	9	0.0730	0.2500
3	9	0.1011	0.2847

ขั้นที่ 2 พิจารณาค่าความแข็งแรง (Fitness Value) ให้กับสตริงคำตอบที่ได้ทำการเลือกจำนวนสถานีนงานที่น้อยที่สุดแล้วจะได้ค่าดังรูปที่ 6.15 และตารางที่ 6.58



รูปที่ 6.15 ค่า Dummy Fitness ของสตริงคำตอบในฝูงที่ 2

ตารางที่ 6.58 Non-Dominated Sorting ของ Local ในฝูงที่ 2

สตริง คำตอบที่	ความสมดุล ระหว่างสถานีนงาน	ความสมดุล ภายในสถานีนงาน	Front	Crowding Distance	Local
1	0.0730	0.2500	1	Infinity	-
3	0.1011	0.2847	2	Infinity	Lworst

6.3.7.3 การคัดเลือก Global Best Solution

ทำการหาค่าที่ดีที่สุด (Gbest) จากประชากรทั้งหมด โดยพิจารณาจาก Front ของคำตอบที่ได้จาก Non-Dominated Sorting

ขั้นที่ 1 จำนวนสถานีนงานของสตริงคำตอบไม่เท่ากันจึงทำการพิจารณาวัตถุประสงคืนี้ก่อน

ตารางที่ 6.59 ตารางการคำนวณวัตถุประสงคืทั้ง 3 วัตถุประสงคื


ฝูงที่	สตริงคำตอบที่	จำนวน สถานีนงาน	ความสมดุระหว่าง สถานีนงาน	ความสมดุภายใน สถานีนงาน
1	1	9	0.1184	0.2014
	2	9	0.0730	0.2500
	3	9	0.1440	0.3056
2	1	9	0.0730	0.2500
	2	8	0.1084	0.5313
	3	9	0.1011	0.2847

ทำการคัดเลือกจำนวนสถานีนงานที่น้อยที่สุดเพื่อทำการหา Global Best Solution

ตารางที่ 6.60 จำนวนสถานีนงานที่น้อยที่สุด

ฝูงที่	สตริงคำตอบที่	จำนวน สถานีนงาน	ความสมดุระหว่าง สถานีนงาน	ความสมดุภายใน สถานีนงาน
2	2	8	0.1084	0.5313

ขั้นที่ 2 พิจารณาค่าความแข็งแรง (Fitness Value) ให้กับสตริงคำตอบที่ได้ทำการเลือกจำนวนสถานีนงานที่น้อยที่สุดแล้วจะได้ค่าดังรูปที่ 6.16 และตารางที่ 6.61



รูปที่ 6.16 ค่า Dummy Fitness ของประชากรทั้งหมด

ตารางที่ 6.61 Non-Dominated Sorting ของ Global

ฝูงที่	สตริงคำตอบที่	ความสมดุระหว่าง สถานีนงาน	ความสมดุล ภายในสถานีนงาน	Front	Crowding Distance	Local
2	2	0.1084	0.5313	1	Infinity	Gbest

6.3.3.4 การคัดเลือก Global Worst Solution

ทำการหาค่าที่ดีที่สุด (Gworst) จากประชากรทั้งหมด โดยพิจารณาจาก Front ของคำตอบที่ได้จาก Non-Dominated Sorting

ขั้นที่ 1 จำนวนสถานีนงานของสตริงคำตอบไม่เท่ากันจึงทำการพิจารณาวัตถุประสงคนี้ก่อน

ตารางที่ 6.62 ตารางการคำนวณวัตถุประสงคทั้ง 3 วัตถุประสงค

ฝูงที่	สตริงคำตอบที่	จำนวน สถานีนงาน	ความสมดุระหว่าง สถานีนงาน	ความสมดุลภายใน สถานีนงาน
1	1	9	0.1184	0.2014
	2	9	0.0730	0.2500
	3	9	0.1440	0.3056

ตารางที่ 6.62 ตารางการคำนวณวัตถุประสงค์ทั้ง 3 วัตถุประสงค์ (ต่อ)


ฝูงที่	สตริงคำตอบที่	จำนวน สถานีนงาน	ความสมดุระหว่าง สถานีนงาน	ความสมดุภายใน สถานีนงาน
2	1	9	0.0730	0.2500
	2	8	0.1084	0.5313
	3	9	0.1011	0.2847

ทำการคัดเลือกจำนวนสถานีนงานที่น้อยที่สุดเพื่อทำการหา Global Best Solution

ตารางที่ 6.63 จำนวนสถานีนงานที่มากที่สุด

ฝูงที่	สตริงคำตอบที่	จำนวน สถานีนงาน	ความสมดุระหว่าง สถานีนงาน	ความสมดุภายใน สถานีนงาน
1	1	9	0.1184	0.2014
	2	9	0.0730	0.2500
	3	9	0.1440	0.3056
2	1	9	0.0730	0.2500
	3	9	0.1011	0.2847

ขั้นที่ 2 พิจารณาค่าความแข็งแรง (Fitness Value) ให้กับสตริงคำตอบที่ได้ทำการเลือกจำนวนสถานีนงานที่มากที่สุดแล้วจะได้ค่าดังรูปที่ 6.17 และตารางที่ 6.64



รูปที่ 6.17 ค่า Dummy Fitness ของประชากรทั้งหมด

ตารางที่ 6.64 Non-Dominated Sorting ของ Global

ฝูงที่	สตริง คำตอบที่	ความสมมูล ระหว่างสถานีนาน	ความสมมูล ภายในสถานีนาน	Front	Crowding Distance	Local
1	2	0.0730	0.2500	1	Infinity	-
1	1	0.1184	0.2014	1	Infinity	-
2	1	0.0730	0.2500	1	Infinity	-
2	3	0.1011	0.2847	2	Infinity	-
1	3	0.1440	0.3056	3	Infinity	Gworst

6.3.7.5 เทคนิคการเก็บค่าที่ดีที่สุด

เทคนิคการเก็บค่าที่ดีที่สุด จะทำการเก็บสตริงคำตอบที่ได้จากการหาค่า Global Best Solution ของประชากรทั้งหมด โดยจะทำการเก็บค่าไว้ดำเนินการในรอบถัดไป

สตริงคำตอบของฝูงใน Local Best ในฝูงที่ 1

String 2 = [11 10 1 5 4 2 3 8 6 7 9]
String 1 = [11 9 7 4 5 10 1 2 6 8 3]

สตริงคำตอบของฝูงใน Local Best ในฝูงที่ 2

String 2 = [11 1 3 2 9 4 7 6 5 8 10]

สตริงคำตอบของฝูงใน Local Worst ในฝูงที่ 1

String 3 = [11 10 1 5 4 2 6 3 8 9 7]

สตริงคำตอบของฝูงใน Local Worst ในฝูงที่ 2

String 3 = [11 10 9 8 7 3 5 4 1 6 2]


สตริงคำตอบที่ดีที่สุด Global Best ของประชากรทั้งหมด

(ฝูงที่ 2) String 2 = [11 1 3 2 9 4 7 6 5 8 10]

สตริงคำตอบที่แย่ที่สุด Global Worst ของประชากรทั้งหมด

(ฝูงที่ 1) String 3 = [11 10 1 5 4 2 6 3 8 9 7]

ทำการประเมินหาคำตอบที่ดีที่สุด ของสตริงคำตอบที่ดีที่สุดในรอบก่อนหน้ากับรอบนี้ ด้วยการกำหนดค่าความแข็งแรง (Fitness Value) โดยจะใช้วิธีจัดอันดับแบบ Goldberg (1989) หรือ Non-dominated Sorting



รูปที่ 6.18 ค่า Dummy Fitness ของสตริงคำตอบที่ดีที่สุด

ตารางที่ 6.65 Non-Dominated Sorting ของสตริงคำตอบที่ดีที่สุด

รอบที่	ฝูงที่	สตรีง คำตอบที่	ความสมดุลระหว่าง สถานีนงาน	ความสมดุล ภายในสถานีนงาน	Front	Crowding Distance
1	1	2	0.0717	0.4688	1	Infinity
2	2	2	0.1084	0.5313	2	Infinity

สตริงคำตอบที่ดีที่สุดที่จะเก็บไว้ในรอบต่อไปคือ

สดริงคำตอบที่ดดีสุด

(ฟังที่ 2) String 2 = [11 10 1 4 8 9 6 5 2 3 7]

6.3.8 การปรับปรุงตาราง

6.3.8.1 การปรับปรุงในฝูงที่ 1

6.3.8.1.1 ตารางความน่าจะเป็นในการเลือกงานแรก

ทำการอัปเดต First Walk Probability Matrix โดยดูจากงานที่ถูกเลือกเป็นอันดับแรก ด้วยการเพิ่มค่าความน่าจะเป็นในการเลือกงานลำดับแรกเท่ากับ $Cr/(n-1) = 0.1/(11-1) = 0.01$ ในสตริงคำตอบที่ดี และลดค่าความน่าจะเป็นในการเลือกงานอื่น ๆ เท่ากับ $Cr/(n-1)^2 = 0.001$ ส่วนในสตริงคำตอบที่ย่ำแย่จะทำการลดค่าความน่าจะเป็นในการเลือกงานลำดับแรก เท่ากับ $Cr/(n-1)$ และเพิ่มค่าความน่าจะเป็นในการเลือกงานอื่น ๆ เท่ากับ $Cr/(n-1)^2$ โดยมีวิธีดังนี้

1. Local Best Solution ฟังก์ชันที่ 1

String 2 = [11 10 1 5 4 2 3 8 6 7 9]

ตารางที่ 6.66 ตารางการปรับปรุงความน่าจะเป็นสำหรับการเลือกงานอันดับแรก (First Walk Matrix Probability) ของฝูงที่ 1

[illegible]

2. Local Worst Solution ^{ผู้} 1

String 1 = [11 9 7 4 5 10 1 2 6 8 3]

String 3 = [11 10 1 5 4 2 6 3 8 9 7]

ตารางที่ 6.67 ตารางการปรับปรุงความน่าจะเป็นสำหรับการเลือกงานอันดับแรก (First Walk Matrix Probability) ของผู้ 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.0699	0.0919	0.0919	0.0919	0.0919	0.0919	0.0919	0.0919	0.0919	0.0919	0.1029

3. Global Best Solution

String 2 = [11 1 3 2 9 4 7 6 5 8 10]

ตารางที่ 6.68 ตารางการปรับปรุงความน่าจะเป็นสำหรับการเลือกงานอันดับแรก (First Walk Matrix Probability) ของผู้ 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.0689	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.1129

4. Global Worst Solution

String 3 = [11 10 1 5 4 2 6 3 8 9 7]

ตารางที่ 6.69 ตารางการปรับปรุงความน่าจะเป็นสำหรับการเลือกงานอันดับแรก (First Walk Matrix Probability) ของผู้ 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.0699	0.0919	0.0919	0.0919	0.0919	0.0919	0.0919	0.0919	0.0919	0.0919	0.1029

ดังนั้นตารางที่ 6.69 จะเป็นตารางความน่าจะเป็นในการเลือกงานแรก (First Walk Matrix Probability) ของผู้ 1 หลังจากปรับปรุงคำตอบแล้ว

6.3.8.1.2 การปรับปรุงตารางทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค

การปรับปรุงตารางทิศทางการเคลื่อนที่ (Velocity Matrix) จะขึ้นอยู่กับค่า Lbest, Lworst, Gbest และ Gworst ซึ่งใช้การให้รางวัลและการลงโทษที่ค่า โดยเพิ่มค่าแก่คู่ลำดับในสตริงที่ดี เท่ากับ $r/(t-2)$ และลดค่าคู่ลำดับอื่นๆ เท่ากับ $r/(t-2)^2$

ทำการอัปเดต Velocity Matrix โดยดูจากลำดับงานที่อยู่ติดกัน ด้วยการเพิ่มค่าแก่คู่ลำดับในสตริงคำตอบที่ดี เท่ากับ $Cr/(n-2) = 0.0111$ และลดค่ากับคู่ลำดับอื่นๆ เท่ากับ $Cr/(n-2)^2 = 0.0012$ ส่วนในสตริงคำตอบที่แย่จะทำเช่นเดียวกันแต่ใช้การลดค่าแก่คู่ลำดับที่ติดกันในสตริงคำตอบ และเพิ่มค่าคู่ลำดับอื่นๆ แทน

1. Local Best Solution ฟังก์ชันที่ 1

String 2 = [11 10 1 5 4 2 3 8 6 7 9]

ตารางที่ 6.70 ตารางการปรับปรุงทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค (Velocity Matrix) ของฟังก์ชันที่ 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-0.0012	-0.0012	0.0234	-0.0135	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012
2	-0.0012	-	0.0234	-0.0012	-0.0012	-0.0258	-0.0012	-0.0012	-0.0012	0.0111	-0.0012
3	-0.0036	-0.0036	-	-0.0036	-0.0036	-0.0036	0.021	0.0087	-0.0036	-0.0036	-0.0036
4	-0.0012	0.0234	-0.0012	-	-0.0012	-0.0012	-0.0012	0.0111	-0.0012	-0.0012	-0.0258
5	-0.0012	-0.0135	-0.0012	0.0111	-	-0.0012	-0.0012	0.0111	-0.0012	-0.0012	-0.0012
6	0	0	0	-0.0246	0.0123	-	0.0123	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0.0123	0	-	0	0.0123	-0.0246	0
8	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	0.0234	-0.0258	-	0.0111	-0.0012	-0.0012
9	0	0	0.0123	0	0	0.0123	0	-0.0246	-	0	0
10	0.0234	-0.0012	-0.0258	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	0.0111	-	-0.0012
11	0.0111	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0258	0.0234	-

2. Local Worst Solution ฟังก์ชันที่ 1

String 1 = [11 9 7 4 5 10 1 2 6 8 3]

String 3 = [11 10 1 5 4 2 6 3 8 9 7]

ตารางที่ 6.71 ตารางการปรับปรุงทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค (Velocity Matrix) ของฝูงที่ 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-0.0111	0.0012	0.0258	-0.0234	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012
2	0.0012	-	0.0258	0.0012	0.0012	-0.048	0.0012	0.0012	0.0012	0.0135	0.0012
3	-0.0024	-0.0024	-	-0.0024	-0.0024	-0.0024	0.0222	-0.0024	-0.0024	-0.0024	-0.0024
4	0.0012	0.0135	0.0012	-	-0.0111	0.0012	0.0012	0.0135	0.0012	0.0012	-0.0234
5	0.0012	-0.0111	0.0012	0.0012	-	0.0012	0.0012	0.0135	0.0012	-0.0111	0.0012
6	0.0024	0.0024	-0.0099	-0.0222	0.0147	-	0.0147	-0.0099	0.0024	0.0024	0.0024
7	0.0012	0.0012	0.0012	-0.0111	0.0135	0.0012	-	0.0012	0.0135	-0.0234	0.0012
8	0.0012	0.0012	-0.0111	0.0012	0.0012	0.0258	-0.0234	-	0.0012	0.0012	0.0012
9	0.0024	0.0024	0.0147	0.0024	0.0024	0.0147	-0.0222	-0.0222	-	0.0024	0.0024
10	0.0012	0.0012	-0.0234	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0135	-	0.0012
11	0.0135	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	-0.0357	0.0135	-

3. Global Best Solution

String 2 = [11 1 3 2 9 4 7 6 5 8 10]

ตารางที่ 6.72 ตารางการปรับปรุงทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค (Velocity Matrix) ของฝูงที่ 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-0.0123	0.0123	0.0246	-0.0246	0	0	0	0	0	0
2	0	-	0.0246	0	0	-0.0492	0	0	0.0123	0.0123	0
3	-0.0036	0.0087	-	-0.0036	-0.0036	-0.0036	0.021	-0.0036	-0.0036	-0.0036	-0.0036
4	0	0.0123	0	-	-0.0123	0	0.0123	0.0123	0	0	-0.0246
5	0	-0.0123	0	0	-	0	0	0.0246	0	-0.0123	0
6	0.0012	0.0012	-0.0111	-0.0234	0.0258	-	0.0135	-0.0111	0.0012	0.0012	0.0012
7	0	0	0	-0.0123	0.0123	0.0123	-	0	0.0123	-0.0246	0
8	0	0	-0.0123	0	0	0.0246	-0.0246	-	0	0.0123	0
9	0.0012	0.0012	0.0135	0.0135	0.0012	0.0135	-0.0234	-0.0234	-	0.0012	0.0012
10	0.0012	0.0012	-0.0234	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0135	-	0.0012
11	0.0246	0	0	0	0	0	0	0	-0.0369	0.0123	-

4. Global Worst Solution

String 3 = [11 10 1 5 4 2 6 3 8 9 7]

ตารางที่ 6.73 ตารางการปรับปรุงทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค (Velocity Matrix) ของฝูงที่ 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-0.0111	0.0135	0.0258	-0.0357	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012
2	0.0012	-	0.0258	0.0012	0.0012	-0.0603	0.0012	0.0012	0.0135	0.0135	0.0012
3	-0.0024	0.0099	-	-0.0024	-0.0024	-0.0024	0.0222	-0.0147	-0.0024	-0.0024	-0.0024
4	0.0012	0.0012	0.0012	-	-0.0111	0.0012	0.0135	0.0135	0.0012	0.0012	-0.0234
5	0.0012	-0.0111	0.0012	-0.0111	-	0.0012	0.0012	0.0258	0.0012	-0.0111	0.0012
6	0.0024	0.0024	-0.0222	-0.0222	0.027	-	0.0147	-0.0099	0.0024	0.0024	0.0024
7	0	0	0	-0.0123	0.0123	0.0123	-	0	0.0123	-0.0246	0
8	0.0012	0.0012	-0.0111	0.0012	0.0012	0.0258	-0.0234	-	-0.0111	0.0135	0.0012
9	0.0024	0.0024	0.0147	0.0147	0.0024	0.0147	-0.0345	-0.0222	-	0.0024	0.0024
10	-0.0099	0.0024	-0.0222	0.0024	0.0024	0.0024	0.0024	0.0024	0.0147	-	0.0024
11	0.0258	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	-0.0357	0.0012	-

ดังนั้นตารางที่ 6.73 จะเป็นตารางความน่าจะเป็นในการเลือกงานแรก (First Walk Matrix Probability) ของฝูงที่ 1 หลังจากปรับปรุงคำตอบแล้ว

6.3.7.1.3 ตารางการปรับปรุงตารางความน่าจะเป็นร่วม

การปรับปรุงตารางความน่าจะเป็นร่วม (Joint Probability Matrix) สามารถคำนวณได้จากสมการที่ (6.2) ดังนี้

ตารางที่ 6.74 ตาราง Joint Probability Matrix ของฝูงที่ 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	0.0889	0.1135	0.1504	0.0397	0.1012	0.1012	0.1012	0.1012	0.1012	0.1012
2	0.1012	-	0.1381	0.1012	0.1012	0.0151	0.1012	0.1012	0.1135	0.1258	0.1012
3	0.0952	0.1075	-	0.0952	0.0952	0.0952	0.1444	0.0829	0.0952	0.0952	0.0952
4	0.1012	0.1135	0.1012	-	0.0889	0.1012	0.1135	0.1258	0.1012	0.1012	0.0520
5	0.1012	0.0766	0.1012	0.0889	-	0.1012	0.1012	0.1381	0.1012	0.0889	0.1012
6	0.1036	0.1036	0.0790	0.0544	0.1405	-	0.1159	0.0913	0.1036	0.1036	0.1036
7	0.1012	0.1012	0.1012	0.0889	0.1258	0.1135	-	0.1012	0.1135	0.0520	0.1012
8	0.1012	0.1012	0.0889	0.1012	0.1012	0.1381	0.0520	-	0.1012	0.1135	0.1012
9	0.1024	0.1024	0.1270	0.1147	0.1024	0.1270	0.0655	0.0532	-	0.1024	0.1024
10	0.1024	0.1024	0.0532	0.1024	0.1024	0.1024	0.1024	0.1024	0.1270	-	0.1024
11	0.1381	0.1012	0.1012	0.1012	0.1012	0.1012	0.1012	0.1012	0.0397	0.1135	-

6.3.8.2 การปรับปรุงในฝูงที่ 2

6.3.8.2.1 ตารางความน่าจะเป็นในการเลือกงานแรก

ทำการอัปเดต First Walk Probability Matrix โดยดูจากงานที่ถูกเลือกเป็นอันดับแรก ด้วยการเพิ่มค่าความน่าจะเป็นในการเลือกงานลำดับแรกเท่ากับ $Cr/(n-1) = 0.1/(11-1) = 0.01$ ในสตริงคำตอบที่ดี และลดค่าความน่าจะเป็นในการเลือกงานอื่น ๆ เท่ากับ $Cr/(n-1)^2 = 0.001$ ส่วนในสตริงคำตอบที่แย่จะทำการลดค่าความน่าจะเป็นในการเลือกงานลำดับแรก เท่ากับ $Cr/(n-1)$ และเพิ่มค่าความน่าจะเป็นในการเลือกงานอื่น ๆ เท่ากับ $Cr/(n-1)^2$ โดยมีวิธีดังนี้

1. Local Best Solution ฝูงที่ 2

String 2 = [11 1 3 2 9 4 7 6 5 8 10]

2. Local Worst Solution ฝูงที่ 2

String 3 = [11 10 9 8 7 3 5 4 1 6 2]

3. Global Best Solution

String 2 = [11 1 3 2 9 4 7 6 5 8 10]

4. Global Worst Solution

String 3 = [11 10 1 5 4 2 6 3 8 9 7]

ตารางที่ 6.75 ตารางการปรับปรุงความน่าจะเป็นสำหรับการเลือกงานอันดับแรก (First Walk Matrix Probability) ของฝูงที่ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.0689	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.0909	0.1129

6.3.8.2.2 การปรับปรุงตารางทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค

การปรับปรุงตารางทิศทางการเคลื่อนที่ (Velocity Matrix) จะขึ้นอยู่กับค่า Lbest, Lworst, Gbest และ Gworst ซึ่งใช้การให้รางวัลและการลงโทษที่ค่า โดยเพิ่มค่าแก่คู่ลำดับในสตริงที่ดี เท่ากับ $r/(t-2)$ และลดค่าคู่ลำดับอื่นๆ เท่ากับ $r/(t-2)^2$

ทำการอัปเดต Velocity Matrix โดยดูจากลำดับงานที่อยู่ติดกัน ด้วยการเพิ่มค่าแก่คู่ลำดับในสตริงคำตอบที่ดี เท่ากับ $Cr/(n-2) = 0.0111$ และลดค่ากับคู่ลำดับอื่นๆ เท่ากับ $Cr/(n-2)^2 = 0.0012$ ส่วนในสตริงคำตอบที่แย่จะทำเช่นเดียวกันแต่ใช้การลดค่าแก่คู่ลำดับที่ติดกันในสตริงคำตอบ และเพิ่มค่าคู่ลำดับอื่นๆ แทน

1. Local Best Solution ฟังก์ชันที่ 2

String 2 = [11 1 3 2 9 4 7 6 5 8 10]

2. Local Worst Solution ฟังก์ชันที่ 2

String 3 = [11 10 9 8 7 3 5 4 1 6 2]

3. Global Best Solution

String 2 = [11 1 3 2 9 4 7 6 5 8 10]

4. Global Worst Solution

String 3 = [11 10 1 5 4 2 6 3 8 9 7]

ตารางที่ 6.76 ตารางการปรับปรุงทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค (Velocity Matrix) ของฟังก์ชันที่ 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	0	0.0247	0.0123	-0.0246	-0.0123	0	0	0	0	0
2	-0.0012	-	0.0111	-0.0012	-0.0012	-0.0259	-0.0012	-0.0012	0.0235	-0.0012	-0.0012
3	-0.0012	0.0235	-	-0.0012	-0.0259	-0.0012	0.0235	-0.0135	-0.0012	-0.0012	-0.0012
4	-0.0123	-0.0246	0	-	0	0	0.0247	0.0247	0	0	-0.0123
5	0	0.0123	0	-0.0247	-	0	0	0.0247	0	0	-0.0123
6	0	-0.0123	-0.0123	-0.0123	0.0494	-	0	0	0	-0.0123	0
7	0.0013	0.0013	-0.0111	0.0013	0.0013	0.026	-	0.0013	-0.0111	-0.0111	0.0013
8	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0259	-	0.0112	0.0235	-0.0012
9	0	0	0	0.0247	0	0.0123	-0.0123	-0.0246	-	0	0
10	0.0148	0.0025	-0.0098	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	-0.0098	-0.0099	-	0.0025
11	0.0247	0	0	0	0	0	-0.0123	0	-0.0123	0	-

6.3.8.2.3 ตารางการปรับปรุงตารางความน่าจะเป็นร่วม

การปรับปรุงตารางความน่าจะเป็นร่วม (Joint Probability Matrix)

สามารถคำนวณได้จากสมการที่ (6.2) ดังนี้

ตารางที่ 6.77 ตาราง Joint Probability Matrix ของฝูงที่ 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	0.1000	0.1247	0.1246	0.0631	0.0877	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
2	0.0988	-	0.1234	0.0988	0.0988	0.0618	0.0988	0.0988	0.1235	0.0988	0.0988
3	0.0976	0.1223	-	0.0976	0.0605	0.0976	0.1470	0.0853	0.0976	0.0976	0.0976
4	0.0877	0.0631	0.1000	-	0.1000	0.1000	0.1247	0.1494	0.1000	0.1000	0.0754
5	0.1000	0.1246	0.1000	0.0753	-	0.1000	0.1000	0.1247	0.1000	0.1000	0.0754
6	0.1000	0.0877	0.0877	0.0754	0.1741	-	0.1000	0.1000	0.1000	0.0754	0.1000
7	0.1038	0.1038	0.0914	0.1038	0.1038	0.1285	-	0.1038	0.0790	0.0790	0.1038
8	0.0976	0.0976	0.0976	0.0976	0.0976	0.0976	0.0605	-	0.1347	0.1223	0.0976
9	0.1000	0.1000	0.1000	0.1247	0.1000	0.1246	0.0877	0.0631	-	0.1000	0.1000
10	0.1395	0.1025	0.0779	0.1025	0.1025	0.1025	0.1025	0.0779	0.0901	-	0.1025
11	0.1247	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.0754	0.1000	0.0754	0.1247	-

6.4 พารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดลองในการทดลองด้วยวิธีการหาค่าเหมาะสมแบบฝูงอนุภาคโดยใช้ความรู้เชิงลบ

6.4.1 จำนวนประชากรเบื้องต้น

จำนวนคำตอบหรือสตริงคำตอบทั้งหมดที่มีอยู่ในแต่ละเจนเนอเรชัน เช่นถ้ากำหนดให้จำนวนประชากรมีขนาด 100 ประชากร หมายความว่าในแต่ละเจนเนอเรชันจะมีคำตอบหรือสตริงคำตอบที่เป็นไปได้ทั้งหมด 100 คำตอบ ซึ่งต้องเป็นคำตอบที่ไม่เหมือนกัน เพื่อต้องการให้ได้คำตอบหรือสตริงคำตอบที่หลากหลาย ในงานวิจัยนี้ (Hwang and Katayama, 2008) ได้กำหนดจำนวนประชากรในการทดลองเท่ากับ 100 ประชากร ดังนั้นจึงกำหนดให้เป็นจำนวนประชากรที่ใช้ในการทดลอง

6.4.2 วิธีเชิงกลุ่มที่ดีที่สุด

วิธี Non-dominated Sorting เป็นวิธีเชิงกลุ่มที่ดีที่สุดในการหากลุ่มคำตอบที่ดีที่สุดตามหลักของ Goldberg (1989) วิธีนี้จะทำให้สามารถหาคำตอบที่ดีที่สุดได้จากการจัดอันดับคำตอบที่มีค่าน้อยที่สุดจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด

6.4.3 จำนวนอนุภาคในแต่ละฝูง

จำนวนอนุภาคเป็นจำนวนกลุ่มของอนุภาคหรือกลุ่มของสตริงคำตอบที่สร้างขึ้นในแต่ละรอบการทำงาน ซึ่งในงานวิจัยได้ทำการทดลองเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุด

6.4.4 จำนวนฝูง

จำนวนฝูงเป็นจำนวนอนุภาคหรือสตริงคำตอบที่มีในแต่ละฝูง ซึ่งในงานวิจัยได้ทำการทดลองเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุด

6.4.5 น้ำหนักการหมุน


น้ำหนักการหมุนที่ใช้จะกำหนดค่าให้เท่ากับ 1 น้ำหนักการหมุนจะเป็นการกำหนดค่าของแต่ละฝูงด้วยน้ำหนักที่ได้จากการเคลื่อนที่โดยจะทำการเก็บค่าการเคลื่อนที่ที่ได้รับอิทธิพลจากการสำรวจค่าที่ดีที่สุด

6.4.6 ค่าสัมประสิทธิ์การเรียนรู้

ค่าสัมประสิทธิ์การเรียนรู้ที่ใช้จะกำหนดค่าให้เท่ากับ 0.1 ค่าสัมประสิทธิ์การเรียนรู้เป็นปัจจัยที่กำหนดที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นส่วนประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งที่ใช้ในการกำหนดความสำคัญของในแต่ละฝูง

6.5 การเปรียบเทียบผลการทดลอง

การเปรียบเทียบคำตอบของการหาค่าที่เหมาะสมแบบฝูงอนุภาคโดยใช้ความรู้เชิงลบเปรียบเทียบกับอัลกอริทึมที่ผ่านมาคือ อัลกอริทึม COMSOAL อัลกอริทึม NSGA-II และการหาค่าเหมาะสมแบบฝูงอนุภาคแบบไม่ต่อเนื่อง (DPSO) ดังรูปที่ 6.18



รูปที่ 6.18 การเปรียบเทียบคำตอบอัลกอริทึม COMSOAL, NSGA-II, PSO และ PSOK

6.6 สรุป

ในบทนี้ได้เสนอวิธีการในการหาคำตอบอัลกอริทึมแบบฝูงอนุภาคโดยใช้ความรู้เชิงลบ ซึ่งวิธีการนี้พัฒนามาจากวิธี PSO โดยการพัฒนาการหาคำตอบที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดมาใช้ในการหาค่าที่เหมาะสม จนกว่าจะพบคำตอบที่ดีที่สุด เมื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดสมดุลสายการประกอบลักษณะตัวยูที่มีสถานีนงานแบบขนาน ทำให้ได้คำตอบที่เข้าสู่สภาพคงที่อย่างรวดเร็ว และได้คำตอบที่ดีที่สุดและเมื่อทำการเปรียบเทียบวิธีการอัลกอริทึมที่ผ่านมาจากบทก่อนหน้านี้ ทำให้คำตอบที่เหมาะสมมากกว่าอัลกอริทึมวิธีอื่น