

บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง



3.1 วัสดุคิบ

3.1.1 ตัวอย่างพืช

ตัวอย่างพืชพื้นบ้านที่บริโภคได้จำนวนทั้งหมด 10 ตัวอย่าง ได้รับจากแหล่งที่มา 2 แหล่ง คือ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 ตัวอย่าง และจากตลาดสดในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ตัวอย่าง รายชื่อพืชทั้งหมดเรียงตามลำดับชื่อวิทยาศาสตร์ ดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างพืชที่ใช้ในการทดลอง

ลำดับ	ชื่อ	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	แหล่งที่มา
1	ผักปลั่ง	ใบ	<i>Basella alba</i> L.	ตลาดวโรรส ตลาดแม่มาลัย, ตลาดไชยปราการ
2	เมี่ยงป่า	ใบ	<i>Camellia sinensis</i> (L.)Kuntze var. <i>assamica</i> (J.Masters) Kitam	สถานีเกษตร หลวงอ่างขาง
3	ก๋อข้าว	ใบ	<i>Castanopsis inermis</i> (Lind .ex Wall.) Benth. & Hook. f.	สถานีเกษตร หลวงอ่างขาง
4	ตัวเกลี้ยง	ใบ	<i>Cratoxylum Cochinchinense</i> (Lour.) Blume	สถานีเกษตร หลวงอ่างขาง
5	กระทุงหมาบ้า	ใบ	<i>Dregea volubilis</i> (L.f.) Hook. F.	ตลาดวโรรส, ตลาดแม่มาลัย
6	ผักแปม	ใบ	<i>Eleutherococcus trifoliatum</i> (L.) S.Y. Hu.	สถานีเกษตร หลวงอ่างขาง
7	ส้มจี	ใบ	<i>Embelia ribes</i> Burm. F.	สถานีเกษตร หลวงอ่างขาง
8	มันปลา	ใบ	<i>Glochidion sphaerogynum</i> (MÜLL Arg.) Kurz.	สถานีเกษตร หลวงอ่างขาง
9	บอนแก้ว	หน่อ	<i>Hapaline hookeriana</i> Schott	ตลาดแม่หม
10	ทะเล่	ใบ	<i>Schima Wallichii</i> (DC.) Korth	สถานีเกษตร หลวงอ่างขาง

3.1.2 ตัวอย่างแพตตี้หมู

- เนื้อหมูบริเวณสะโพก (CP fresh mart, จังหวัดกรุงเทพฯ)
- มันหมูแข็ง (CP fresh mart, จังหวัดกรุงเทพฯ)
- เกลือบริโภคผสมไอโอดีน 99.9 เปอร์เซนต์ (ปรุ้งทิพย์, จังหวัดนครราชสีมา)

3.1.3 สารเคมี

- กรดไขมันลิโนเลอิก (Sigma, ประเทศสหรัฐอเมริกา)
- กรดไตรคลอโรอะซิติก (trichloroacetic acid)(Merck, ประเทศเยอรมัน)
- กรดไทโอบาร์บิทูริก (thiobarbituric acid) (Merck, ประเทศเยอรมัน)
- กรดอะซิติก (Lab-scan, ประเทศไอร์แลนด์)
- กรดไฮโดรคลอริก (Lab-scan, ประเทศไอร์แลนด์)
- โซเดียมคาร์บอเนต (Carlo, ประเทศอิตาลี)
- ไดโพรแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟตเตตระไฮเดรท (Merck, ประเทศเยอรมัน)
- บิวทิลเลเทตไฮดรอกซีโทลูอีน (butylated hydroxytoluene, BHT) (BHD, ประเทศมาเลเซีย)
- บีโตรเลียมอีเทอร์ (Esso, ประเทศไทย)
- โพรแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (Merck, ประเทศเยอรมัน)
- เอทานอล (องค์การสุรา, ประเทศไทย)
- ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Carlo, ประเทศอิตาลี)
- 2,2,4-trimethylpentane (isooctane) (Lab-scan, ประเทศไอร์แลนด์)
- 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2- (Sigma, ประเทศสหรัฐอเมริกา)
- Ethylenedinitrilotetraacetic acid (EDTA) (Merck, ประเทศเยอรมัน)
- Para-anisidine (Merck, ประเทศเยอรมัน)
- Tween 40 (Merck, ประเทศเยอรมัน)

3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์

- เครื่องชั่ง (4 ตำแหน่ง) (Sartorius TE 214, ประเทศเยอรมัน)
- เครื่องชั่ง (2 ตำแหน่ง) (Mettler Toledo PL 1502-S, ประเทศเยอรมัน)
- ตู้บลมร้อน (Patch OV 663, ประเทศไทย)
- เครื่องบด (Blender) (Moulinex, ประเทศฝรั่งเศส)
- อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Memmert WB 14, ประเทศเยอรมัน)
- Vortex mixer (Vortex genie 2 G-560E, ประเทศสหรัฐอเมริกา)
- เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างที่ใช้สำหรับวัดตัวอย่างเนื้อ (Oakton Waterproof, ประเทศมาเลเซีย)
- เครื่องวัดสี (Konica Minolta CR400, ประเทศญี่ปุ่น)
- เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Shimadzu UV-1700, ประเทศญี่ปุ่น)
- เครื่องโฮโมจีไนซ์เซอร์ (CAT X120, ประเทศเยอรมัน)
- เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน (Hettich Zentrifugen EBA 20, ประเทศเยอรมัน)
- เครื่องบดเนื้อ (Seven Five, ประเทศไทย)
- เครื่องผสม (Dito Sama K-55, ประเทศญี่ปุ่น)
- เครื่องวิเคราะห์ไขมัน (Gerhardt, ประเทศเยอรมัน)

3.3 วิธีการทดลอง

3.3.1 การเตรียมตัวอย่าง

3.3.1.1 การเตรียมตัวอย่างพืช

นำตัวอย่างพืชสดมาล้างให้สะอาดด้วยน้ำกรองแล้วผึ่งให้สะเด็ดน้ำ อบแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ประมาณ 18-24 ชั่วโมง จนพืชมีความชื้นไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นนำไปบดเป็นผง แล้วกรองผ่านตะแกรงขนาด 60 เมช (mesh)

3.3.1.2 การเตรียมสารสกัดพืช

1) การสกัดตัวอย่างพืช ดัดแปลงจากวิธีของ Pilarski และคณะ (2006)

ชั่งตัวอย่างผงพืช ผสมกับเอทานอล (ความเข้มข้น 80 เปอร์เซ็นต์) ในอัตราส่วน 1 ต่อ 10 ปั่นผสมด้วยเครื่องปั่นนาน 1 นาที แล้วให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 70 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที สกัดซ้ำอีก 1 ครั้ง จากนั้นเทสารสกัดจากพืชรวมกัน แล้วจึงกรองด้วยกระดาษกรอง (Whatman เบอร์ 4) นำสารสกัดพืชใส่ในขวดสีชา เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ $(-18) \pm 1$ องศาเซลเซียส ทำการวิเคราะห์สารพฤกษเคมีที่สำคัญภายใน 1 สัปดาห์

2) การเตรียมสารสกัดพืชเข้มข้น สำหรับเติมลงในแพตตี๋หมู

นำสารสกัดพืชที่ได้จากการสกัดดังกล่าวข้างต้น มาทำลายสีของรงควัตถุคลอโรฟิลล์ โดยการเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 10 นอร์มอล ลงในสารสกัดพืชจนสารสกัดพืชมีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 2.0 แล้วจึงปรับความเป็นกรด-ด่างของสารสกัดพืชอีกครั้งให้มีค่าเท่ากับ 7.0 ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 12.5 นอร์มอล จากนั้นนำสารสกัดพืชไปทำให้เข้มข้น ด้วยการระเหยตัวทำละลายออกในสภาวะสุญญากาศด้วยเครื่องระเหยแบบสุญญากาศ ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จนมีปริมาณของแข็งประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ แล้วจึงนำสารสกัดพืชเข้มข้นบรรจุในขวดสีชา และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ $(-18) \pm 1$ องศาเซลเซียส

3) การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมด ตามวิธีการของ AOAC method 966.02 (2000)

นำสารสกัดพืช 1-3 กรัมชั่งน้ำหนักให้แน่นอน ใส่ลงในภาชนะหาความชื้นซึ่งทราบน้ำหนักแล้ว จากนั้น ระเหยตัวทำละลายออกจากตัวอย่างด้วยตุ๋นลมร้อนที่อุณหภูมิ 105 ± 1 องศาเซลเซียส จนตัวอย่างมีน้ำหนักคงที่ และนำไปคำนวณปริมาณของแข็งทั้งหมด จากสูตร

$$\text{ปริมาณของแข็งทั้งหมด (\%)} = 100 - \text{เปอร์เซ็นต์ตัวทำละลาย}$$

3.3.1.3 การเตรียมตัวอย่างแพตตี๋หมู

นำเนื้อหมูส่วนสะโพก 700 กรัม มันหมูแข็ง 300 กรัม และเกลือ 1 กรัม มาบดรวมกันให้เป็นเนื้อเดียวกัน จะได้ส่วนผสมของแพตตี๋หมูที่มีไขมันประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์แล้ว นวดด้วยเครื่องผสมนาน 3 นาที จากนั้นนำส่วนผสมที่ได้ ขึ้นรูปตัวอย่างในพิมพ์รูปร่างกลมเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 4 เซนติเมตร แล้วบรรจุลงในถุงพอลิเอทิลีน (polyethylene, PE) ปิดผนึกปากถุงด้วยเครื่องซีลแบบทำเหยียบ นำไปบ่มในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส 6-8 ชั่วโมง แล้วจึงนึ่งให้สุก จนอุณหภูมิใจกลางของผลิตภัณฑ์อยู่ระหว่าง 75-78 องศาเซลเซียส

3.3.3 การคัดเลือกชนิดของพืชที่มีความเป็นไปได้ในการใช้ในแพตต์หุ้ม

3.3.3.1 การเตรียมตัวอย่างแพตต์หุ้มผสมผงพืช

นำผงพืช เติมลงส่วนผสม ให้ได้สัดส่วนพืช 1 เปอร์เซ็นต์ (โดยน้ำหนัก) ของแพตต์หุ้ม นวดส่วนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน นาน 3 นาที จากนั้น ขึ้นรูปแพตต์หุ้มในพิมพ์รูปวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 4 เซนติเมตร แล้วบรรจุลงในถุงโพลีเอทิลีน ปิดผนึกปากถุงด้วยเครื่องซีลแบบเท้าเหยียบ นำไปบ่มในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6-8 ชั่วโมง จากนั้น ปรุงสุก ตามวิธีดังข้อ 3.3.1.3

3.3.3.2 การคัดเลือกชนิดของพืชที่มีความเป็นไปได้ในการยอมรับทางประสาทสัมผัสของแพตต์หุ้มที่เติมผงพืช

นำแพตต์หุ้มที่เติมผงพืชแต่ละชนิด ที่ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ (โดยน้ำหนัก) จำนวนทั้งหมด 10 ตัวอย่าง มาทดสอบความเป็นไปได้ในการใช้พืชในแพตต์หุ้ม โดยจะคัดเลือกให้เหลือพืช 5 ชนิด ด้วยการประเมินความแตกต่างโดยรวม (Overall difference test) ตามวิธีการจัดลำดับคุณภาพ (quality test) ด้านสี กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ตามวิธีการของ Meilgard และคณะ (1999) ในการทดสอบใช้การสุ่มตัวอย่างแพตต์หุ้มออกเป็น 4 กลุ่ม โดย 2 กลุ่มแรก ประกอบด้วย ตัวอย่างจำนวน 5 ตัวอย่าง และ 2 กลุ่มหลังประกอบด้วยตัวอย่างจำนวน 6 ตัวอย่าง และใช้ผู้ทดสอบซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่เคยได้รับประทานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (ได้แก่ แพตต์หุ้ม หรือ ไส้กรอก) ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนการทดสอบ เพื่อคัดเลือกแพตต์หุ้มที่เติมพืช 5 ชนิด ที่ได้คะแนนการยอมรับสูงสุด 5 ลำดับ เพื่อใช้ในการทดลองต่อไป

เตรียมตัวอย่างแพตต์หุ้มที่เติมพืชผงที่คัดเลือกได้แต่ละชนิด 5 ตัวอย่าง มาทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธี 7- points hedonic scale กับผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝน จำนวน 30 คน โดยทดสอบในด้านคุณลักษณะด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์

3.3.3.3 การวิเคราะห์ผลทางสถิติ

นำคะแนนการทดสอบมาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสของผู้ทดสอบที่มีต่อแพตต์หุ้มที่เติมผงพืช โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Random Complete Randomized Design, RCRD) ทำการทดลอง 2 ซ้ำ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นคัดเลือกพืชมา 2 ชนิด เพื่อใช้ในการทดลองขั้นต่อไป

3.3.4 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีในระหว่างการเก็บรักษาแพตต์หุ้มปรุงสุกที่เติมผงพืชและสารสกัดพืช

นำตัวอย่างพืชที่คัดเลือกจำนวน 2 ชนิดจากข้อ 3.4.3 มาเติมลงในแพตต์หุ้ม โดยวางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized Design (CRD) มีตัวแปรที่ต้องการศึกษา คือ ชนิดของพืช (2 ชนิด) วิธีการเติมพืช (2 แบบ) ความเข้มข้นของพืช (3 ระดับ) และระยะเวลาการเก็บรักษา (8 ระดับ) โดยวิธีการเติมพืชนั้นแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ การเติมผงพืช และการเติมสารสกัดพืชเข้มข้น ซึ่งการเตรียมตัวอย่างแพตต์หุ้มที่เติมผงพืชทำเช่นเดียวกับข้อ 3.4.3 ที่ความเข้มข้นต่างๆ 3 ระดับ ได้แก่ 300, 500 และ 700 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตัวอย่างแพตต์หุ้ม ส่วนแพตต์หุ้มที่เติมสารสกัดพืชเข้มข้น ใช้สารสกัดพืชเข้มข้นที่ผ่านการกำจัดคลอโรฟิลล์ที่ได้จากข้อ 3.4.1.2 เติมน้ำไปแทน

ส่วนของผงพีช ที่ความเข้มข้นต่างๆ 3 ระดับ ได้แก่ 190, 320 และ 450 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตัวอย่าง แพนต์ตีหมู แบ่งตัวอย่างแพนต์ตีหมู ออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 นำไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 32 วัน และสุ่มเก็บตัวอย่างทุก ๆ 4 วัน

สุ่มเก็บตัวอย่างจำนวน 3 ชิ้นต่อตัวอย่าง เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และทางเคมีที่เกิดขึ้นในระหว่างการเก็บรักษา เปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุมที่ไม่เติมสารสกัดจากพีช และตัวอย่างเติมบีเอชที ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตัวอย่าง และเติมคาทิสัน ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตัวอย่าง โดยวิเคราะห์ดังนี้

3.3.4.1 ความเป็นกรด-ด่าง ด้วยเครื่องวัดพีเอชที่ใช้สำหรับวัดตัวอย่างเนื้อ

3.3.4.2 ค่าสี ด้วยเครื่องวัดสี Konica Minolta CR-400

นำตัวอย่างแพนต์ตีหมูมาผ่าตามแนวขวาง แล้ววัดค่าสีจำนวน 3 ครั้งต่อตัวอย่าง ที่ตำแหน่งต่างๆ ของด้านในตัวอย่างแพนต์ตีหมู โดยค่าสีแสดงผลในค่า CIE $L^*a^*b^*$ และคำนวณหาความแตกต่างของสี (Total color difference, ΔE) ดังสมการดังนี้

$$\Delta E = (\Delta L^{*2} + \Delta a^{*2} + \Delta b^{*2})^{1/2}$$

3.3.4.3 ค่า Thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) ดัดแปลงจากวิธีของ Buege และ Aust (1978)

ชั่งตัวอย่างแพนต์ตีหมู 0.5 กรัมลงในหลอดทดลอง แล้วเติมสารละลาย TCA-TBA-HCl ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ด้วยเครื่องโฮโมจีไนเซอร์ นาน 3 นาที จากนั้นนำไปต้มจนเดือด นาน 15 นาที ทิ้งให้เย็น แล้วนำไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 5,500 รอบต่อ นาที นาน 10 นาที จากนั้นทำการกรองสารละลายปฏิกิริยา ด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 แล้วนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 532 นาโนเมตร ด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ นำค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอย่างไปคำนวณหาค่า TBARS โดยใช้กราฟมาตรฐานของสารละลายมาลอนไดอัลดีไฮด์ (Malondialdehyde, MDA) ในหน่วยมิลลิกรัมมาลอนไดอัลดีไฮด์ต่อกิโลกรัมตัวอย่างเนื้อ (mg MDA/kg sample)

3.3.4.4 ค่า *p*-Anisidine value (*p*-Av) ตามวิธีของ AOCS Cd 18-90 (1997)

ชั่งน้ำมันของตัวอย่างแพนต์ตีหมูที่ได้จากการสกัดไขมันด้วยเครื่อง Gerhardt ปริมาณ 0.5-4.0 ±0.001 กรัม ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 25 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรด้วย isooctane ผสมให้เข้ากัน จากนั้นปิเปตสารละลายดังกล่าว ปริมาตร 5 มิลลิลิตรลงในหลอดทดลอง แล้วเติมรีเอเจนต์ *p*-anisidine ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ปิดฝาหลอดทดลอง และผสมให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ในที่มืด นาน 10 นาที แล้วนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 350 นาโนเมตร ด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์

นำค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอย่างไปคำนวณหาค่า *p*-Anisidine value (*p*-Av) จากสมการ

$$p\text{-Av} = [25 \times (1.2A_{\text{sample}} - A_{\text{blank}})]/m$$

โดย	A_{sample}	หมายถึง ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง
	A_{blank}	หมายถึง ค่าการดูดกลืนแสงของไอโซออกเทน
	M	หมายถึง น้ำหนักของตัวอย่าง

3.3.4.5 การวิเคราะห์ทางสถิติ

วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีในระหว่างการเก็บรักษาของแพตตี้หมูที่เติมผงพืช และสารสกัดพืชที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Complete Randomized Design, CRD) ทำการทดลอง 2 ซ้ำ แล้วนำผลการทดลองมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan's New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์

