

ตารางที่ 10 อิทธิพลของระยะเวลาการฟื้นฟูสภาพทางกายภาพ

ลักษณะที่ศึกษา	ระยะเวลาการฟื้นฟู (วัน)			
	<300 ^{1/} (n=43)	300-500 ^{2/} (n=42)	>500 ^{3/} (n=10)	P-value
น้ำหนักตัวก่อน (%)	58.64 ^a	59.89 ^a	59.72 ^{ab}	0.0128
น้ำหนักตัวหลัง (%)	56.83 ^a	58.13 ^a	58.06 ^{ab}	0.0363
น้ำหนักตัวเฉลี่ย (%)	52.07	52.59	52.61	0.4515
น้ำหนักตัวเฉลี่ยช่วง (%)	48.06	47.45	47.47	0.1477
น้ำหนักตัวเฉลี่ยระหว่าง (%)	3.10	2.95	2.79	0.7040
ความหนาแน่นไขมัน (%)	85.63	85.86	86.43	0.6682
ความหนาแน่นไขมัน (%)	0.69	0.70	0.70	0.8813
ระดับไขมัน (%)	6.44	6.57	6.78	0.2180
ระดับไขมัน (%)	78.62	76.55	76.78	0.0791
ไขมัน (%)	8.36	9.20	8.88	0.5838
ไขมัน (%)	12.27	12.62	13.51	0.3545

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

ระยะเวลาการฟื้นฟู 61-250 วัน น้ำหนักตัวเฉลี่ยก่อน 518.70 กก. น้ำหนักตัวหลัง 305.77 กก. น้ำหนักตัวเฉลี่ย 296.50 กก.
 ระยะเวลาการฟื้นฟู 399-495 วัน น้ำหนักตัวเฉลี่ยก่อน 521.24 กก. น้ำหนักตัวหลัง 313.05 กก. น้ำหนักตัวเฉลี่ย 304.39 กก.
 ระยะเวลาการฟื้นฟู 502-559 วัน น้ำหนักตัวเฉลี่ยก่อน 514.20 กก. น้ำหนักตัวหลัง 309.80 กก. น้ำหนักตัวเฉลี่ย 301.39 กก.