

ตารางที่ 11 อิทธิพลของอายุเมื่อส่งเข้าต่อคุณภาพจากไทจีน

ลักษณะที่ศึกษา	อายุเมื่อส่งเข้า (ปี)			
	< 1 ^a	2 ^b	(n=19) > 2 ^c	P-value
น้ำหนักชาก่อน (%)	59.76 ^{ab}	60.14 ^a	58.36 ^a	0.00175
น้ำหนักชาก่อน (%)	57.91 ^{ab}	58.44 ^a	56.66 ^a	0.0240
น้ำหนักชาก่อน (%)	52.54	52.31	52.41	0.8730
น้ำหนักชาก่อน (%)	47.72	47.64	47.61	0.9553
น้ำหนักชาก่อน (%)	3.10	2.84	2.90	0.55990
ขนาดพื้นที่หน้าตัดเมื่อส่งนอก (ตร.ซม.)	86.31	85.86	85.74	0.8270
ความหนาแน่นในต้นหลัง (ชม.)	0.70	0.70	0.69	0.6881
ระดับคะแนนใบในต้นหลัง	6.69	6.60	6.48	0.4547
ปริมาณเนื้อเยื่อจากกระดูก (%)	76.64	77.74	77.67	0.4560
ปริมาณไขมัน (%)	9.10	8.61	8.73	0.8418
ปริมาณกระดูก (%)	13.34	12.73	12.33	0.1949

^a ตัวอักษรแตกต่างกันในแนวนอนมีความแตกต่างทางสถิติ ($P < 0.05$)

ระยะเวลาการขุน 61-552 วัน น้ำหนักมีชีวิตสุดท้ายเฉลี่ย 524.03 กก. น้ำหนักชาก่อน 312.17 กก.

น้ำหนักชาก่อน 301.12 กก.

ระยะเวลาการขุน 61-559 วัน น้ำหนักมีชีวิตสุดท้ายเฉลี่ย 518.59 กก. น้ำหนักชาก่อน 311.66 กก.

น้ำหนักชาก่อน 302.30 กก.

ระยะเวลาการขุน 109-494 วัน น้ำหนักมีชีวิตสุดท้ายเฉลี่ย 512.37 กก. น้ำหนักชาก่อน 299.47 กก.

น้ำหนักชาก่อน 291.37 กก.