

จากท่อน 237 ซึ่งวางขึ้นจากโคนต้นไม้น้ำในบริเวณ 300-400 กิโลเมตร

ตามระยะเปลี่ยนทิศทางในจำนวน 52 ตัวอย่างพบวาไรเอตที่มี
 ลักษณะต้นที่วางขึ้นจากโคนต้นไม้น้ำได้แก่ 6.35 เปอร์เซ็นต์ ต้นไม้ในต้น 1.05 เปอร์เซ็นต์ กิ่ง
 2.21 เปอร์เซ็นต์ ใบยาว 1.78 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะกิ่งกึ่งกลาง 6.69 เปอร์เซ็นต์ เลื้อยสูง 6.00
 เปอร์เซ็นต์ เนื้อไม้ 4.83 เปอร์เซ็นต์ กิ่ง + เนื้อไม้ 2.25 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเนื้อไม้ต้นต้น
 ที่วางขึ้นจากโคนต้นไม้น้ำได้แก่ ต้นสูง 4.98 เปอร์เซ็นต์ กิ่ง + เนื้อไม้ 0.66 เปอร์เซ็นต์ กิ่ง
 6.56 เปอร์เซ็นต์ เนื้อไม้ 4.02 เปอร์เซ็นต์ T-bone 7.67 เปอร์เซ็นต์ เนื้อไม้ของ 5.34 เปอร์เซ็นต์
 กิ่ง 3.14 เปอร์เซ็นต์ และพบวาไรเอตเนื้อไม้เนื้ออ่อนเนื้อแข็ง และเนื้อไม้
 8.69 79.37 8.32 12.75 และ 2.36 เปอร์เซ็นต์ สูง

แสดงในตารางที่ 17

10.95+1.26	6.02+0.68	10.95+1.26
9.61+1.05	6.02+0.68	9.61+1.05
7.31+1.96	4.53+1.17	7.31+1.96
3.38+0.43	2.33+0.36	3.38+0.43
2.47+0.92	4.02+0.60	2.47+0.92
8.30+0.72	2.86+0.36	8.30+0.72
9.85+0.88	4.53+0.41	9.85+0.88
6.06+0.98	4.02+0.53	6.06+0.98
11.35+1.17	7.67+0.40	11.35+1.17
8.04+0.98	2.34+0.37	8.04+0.98
3.71+0.45	2.14+0.26	3.71+0.45
13.02+0.33	3.69+0.54	13.02+0.33
119.66+9.36	79.37+1.12	119.66+9.36
12.48+1.35	8.32+2.40	12.48+1.35
19.14+2.23	12.75+1.51	19.14+2.23
3.36+2.95	2.36+1.90	3.36+2.95

TABLE 17. VARIATION IN MORPHOLOGICAL CHARACTERS OF THE

PLANT IN THE DIFFERENT PARTS OF THE PLANT (continued)