

[illegible]

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยที่มีอาการของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคเบาหวานชนิดที่ 1 โดยมีการสุ่มตัวอย่างผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 คน และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS 25.0 ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยที่มีอาการของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีความรุนแรงของโรคสูงกว่าผู้ป่วยที่มีอาการของโรคเบาหวานชนิดที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยที่มีอาการของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานต่ำกว่าผู้ป่วยที่มีอาการของโรคเบาหวานชนิดที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อพิจารณาจากพื้นฐานของเซลล์ซึ่งมีส่วนที่ใส่จากการคัดแยกแสงที่เปลี่ยนปริมาณการแผ่รังสีแสงต่าง
ให้แก่ T-bone ต้นตะโกล (Stem) พื้นนอก+เนื้อหมอน (Bottom round+Eye round) และพัวป (Top round)
จากหลักการสังเกตว่าเนื้อหมอนที่ถูกใส่ลงไปในเนื้อหมูที่ผ่านการแช่เย็นแล้ว (P<0.001) แม้จะ
ในกลุ่มเนื้อหมูที่แช่เย็น 143-155 องศาเซลเซียส และเนื้อหมูที่แช่เย็น 155 องศาเซลเซียส จะพบเพียงแนวในการ

[illegible][illegible]

(3.08 ប្រភេទសត្វ) ($P \leq 0.05$)

การประเมินรูปแบบการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน (2.77 เปอร์เซ็นต์)