

สรุป

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.0 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 29.4 อายุ 45 – 54 ปี ร้อยละ 35.5 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 28.7 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 43.9 รายได้ครัวเรือน / เดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 29.4 มีรายได้ครัวเรือน/เดือน 10,000-19,999 บาท อาชีพหลัก ร้อยละ 35.9 ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวนสมาชิกครอบครัวร้อยละ 34.1 มีสมาชิกครอบครัวจำนวน 5 คนขึ้นไป ($\bar{X} = 4.23$ S.D = 2.9) ร้อยละ 98.3 นับถือศาสนาพุทธ จำนวนสุนัขที่เลี้ยง 1 ตัว ร้อยละ 51.8 ($\bar{X} = 2.08$ S.D = 1.90)

ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า พบว่า ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับสูง ($\bar{X} = 8.13$ S.D. = 1.58)

- ร้อยละ 32.7 ไม่ทราบว่า หนูเป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าได้
- ร้อยละ 25.7 ไม่ทราบว่า คนที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วเมื่อแสดงอาการแล้วตายทุกราย
- ร้อยละ 21.3 ไม่ทราบว่า โรคพิษสุนัขบ้าเกิดในแมวได้
- ร้อยละ 20.7 ไม่ทราบว่า สุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหากถูกสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นบ้าก็ต้องฉีดวัคซีนใหม่

การดูแลเอาใจใส่สุนัข

การเลี้ยงสุนัข ร้อยละ 97.5 มีภาชนะใส่อาหารสุนัข ร้อยละ 52.6 ทำความสะอาดภาชนะใส่อาหารก่อนให้อาหารทุกครั้ง ร้อยละ 45.5 ทำความสะอาดบางครั้ง การทำความสะอาดสุนัข ร้อยละ 43.0 อาบน้ำโดยใช้สบู่ แชมพูเป็นประจำ ร้อยละ 52.3 อาบน้ำเมื่อสกปรก เมื่อสุนัขเจ็บป่วย ร้อยละ 69.0 พาไปพบสัตวแพทย์ ร้อยละ 22.1 ซื้อยาให้กินเอง การพาสุนัขออกไปเดินเล่น ร้อยละ 49.4 ทำเป็นประจำสม่ำเสมอ ร้อยละ 34.5 นานๆครั้ง/บางครั้ง การถ่ายพยาธิสุนัข ร้อยละ 47.3 บางครั้ง/นานๆครั้ง ร้อยละ 29.2 ไม่เคยถ่ายพยาธิ การหยอกล้อเล่นกับสุนัข ร้อยละ 69.0 ทำเป็นประจำสม่ำเสมอ ร้อยละ 26.9 บางครั้ง/นานๆครั้ง

การมีส่วนร่วมในการดูแลสุนัข

พบว่า ส่วนใหญ่บุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลสุนัขร้อยละ 88.7 มีส่วนร่วมในการให้อาหารสุนัขร้อยละ 85.7 อาบน้ำให้สุนัขร้อยละ 58.94 พาไปเดินเล่น ร้อยละ 30.3 พาไปพบสัตวแพทย์ร้อยละ 26.1

เพื่อนบ้านมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนในการดูแลสุนัขเพียงร้อยละ 17.5 ให้อาหารร้อยละ 15.8 พาไปเดินเล่นร้อยละ 2.7 อาบน้ำให้สุนัขร้อยละ 2.1 พาไปพบสัตวแพทย์ร้อยละ 1.1

การพานสุนัขไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครบทุกปีตรงตามกำหนดร้อยละ 58.6 ไม่ตรงตามกำหนดร้อยละ 35.8 ไม่เคยฉีดร้อยละ 5.6 ผู้ที่นำสุนัขไปรับบริการฉีดวัคซีนร้อยละ 61.2 เป็นเจ้าของสุนัข ร้อยละ 34.3 คนในครอบครัว รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 45.5 จากคลินิกรักษาสัตว์ ร้อยละ 14.5 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ สาเหตุสำคัญที่สุดในการนำสุนัขไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 92.8 กลัวติดโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 5.5 ปฏิบัติตามพ.ร.บ. โรคพิษสุนัขบ้า การเดินทางพานสุนัขไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 18.8 ไม่สะดวก ร้อยละ 37.3 สะดวกปานกลาง ร้อยละ 43.9 สะดวกมาก สาเหตุสำคัญที่ไม่นำสุนัขไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 53.6 ไม่สะดวก ร้อยละ 25.0 จับสุนัขไม่ได้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำสุนัขไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การดูแลเอาใจใส่สุนัข ความสะดวกในการเดินทางพานสุนัขไปฉีดวัคซีน ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติประมาณ ร้อยละ 28.5 ($R^2 = 0.285$) สามารถเขียนสมการทำนายได้ดังนี้

$$Y = 0.33 + 0.078 X_1 + 0.216 X_2 + 0.056 X_3$$

วิจารณ์ผลการวิจัย

จากการศึกษาความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 32.7 ไม่ทราบว่า หนูเป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าได้ ร้อยละ 20.7 ไม่ทราบว่า สุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหากถูกสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นบ้าก็ต้องฉีดวัคซีนใหม่ ร้อยละ 25.7 ไม่ทราบว่า คนที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วเมื่อแสดงอาการแล้วตายทุกราย ร้อยละ 21.3 ไม่ทราบว่าโรคพิษสุนัขบ้าเกิดในแมวได้ จะเห็นได้ว่ามีประชาชนยังขาดความรู้ในส่วนสาระสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การถ่ายพยาธิ ร้อยละ 29.2 ไม่เคยถ่ายพยาธิซึ่งจากการศึกษาของพงศ์ศักดิ์และคณะ (2545)พบว่าประชาชนที่เลี้ยงสุนัขในเขตกรุงเทพมหานครไม่เคยถ่ายพยาธิ ร้อยละ 32.3 แสดงว่าประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญของการถ่ายพยาธิในสุนัข การถ่ายพยาธิให้สุนัขเป็นประจำจะทำให้สุนัขมีสุขภาพแข็งแรงทำให้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าได้สูงขึ้น สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 5.6 ไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 35.8 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ตรงตามกำหนด จะเห็นว่า สุนัขที่เลี้ยงร้อยละ 41.4 ได้รับวัคซีนไม่ถูกต้องภูมิคุ้มกันอาจไม่สูงพอในภาพรวมของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มีสุนัขจรจัดอยู่ในกรุงเทพมหานครการสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบคลุมประชากรสุนัขอย่างน้อย 75% ของประชากรสุนัขที่ต้องมีภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า WHO (1992) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานคร คือ การดูแลเอาใจใส่สุนัข ความสะดวกในการเดินทางพาสุนัขไปฉีดวัคซีน ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สอดคล้องกับผลการศึกษาของพงศ์ศักดิ์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของพงศ์ศักดิ์และธำรงค์ (2549) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดเลย ได้แก่ความสะดวกในการเดินทางพาสุนัขไปฉีดวัคซีน

ข้อเสนอแนะ

กรุงเทพมหานครควรมีนโยบายการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างชัดเจน ต้องจัดสรรงบประมาณในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างทั่วถึงโดยการออกหน่วยเคลื่อนที่ออกบริการอำนวยความสะดวกบริการอย่างครอบคลุมเต็มพื้นที่กรุงเทพมหานครและรณรงค์ให้ประชาชนถ่ายพยาธิสุนัขอย่างสม่ำเสมอ รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชน ควรเริ่มมาตรการจดทะเบียนสุนัขและควบคุมประชากรสุนัขจรจัดอย่างจริงจังเพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขจรจัดเพื่อให้มีจำนวนลดลงพร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนเปลี่ยนทัศนคติในการเลี้ยงสุนัขต้องรับผิดชอบและเอาใจใส่ในการดูแลสุนัขอย่างแท้จริง