

## บทนำ

### ความสำคัญและที่มาของปัญหา

ผักคาวตองหรือภูคาว เป็นผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ นอกจากจะใช้เป็นอาหารแล้วยังสามารถพัฒนาขึ้นเป็นยาสมุนไพรที่ใช้รักษาและป้องกันโรคติดเชื้อได้ ขจรพรรณ (2553) รายงานว่า คาวตอง มีสรรพคุณใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ มากมาย เช่น โรคมะเร็ง ริดสีดวงทวาร โรคผิวหนัง และเพิ่มการแบ่งตัวของเซลล์เม็ดเลือดขาว อีกทั้งยังรักษาโรคที่เกิดจากอาการอักเสบต่าง ๆ เช่น ฝีอักเสบ ปอด และหลอดลมอักเสบและไตอักเสบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ ผักคาวตองเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในประเทศจีนและญี่ปุ่น โดยนำมาใช้เป็นน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ มีปริมาณการใช้มากถึง 650 ตันต่อปี (รุจินาถ,2531) สำหรับในประเทศไทยงานค้นคว้าวิจัยทางด้านสรรพคุณทางการแพทย์มีการศึกษากันอย่างมากมาย อย่างไรก็ตามการปลูกผักคาวตอง แต่เดิมมีการปลูกกันไม่มากนักและจำกัดอยู่แต่ในพื้นที่ทางภาคเหนือ จัดว่าเป็นพืชล้มลุกและเป็นพืชตระกูลเดียวกับพลู คือ Saururaceae ชอบขึ้นตามที่ชื้นแฉะ มักปลูกไว้เป็นยาและอาหาร ในปัจจุบันความต้องการผักคาวตองเป็นวัตถุดิบในการทำสมุนไพรกันมากขึ้น และมีการรับซื้อผักคาวตองกันอย่างแพร่หลายและได้ราคาดี จึงทำให้เกษตรกรได้หันมาปลูกผักคาวตองกันมากขึ้น โดยเกษตรกรได้มีการขยายพื้นที่เพื่อเพาะปลูกผักคาวตองเป็นการค้าเพิ่มมากขึ้น เมื่อพื้นที่การเพาะปลูกเพิ่มขึ้น การจัดการและการดูแลรักษาและเอาใจใส่ของเกษตรกรก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วย แต่อย่างไรก็ตามผลผลิตน้ำหนัสดั้งเดิมของผักคาวตองยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก ทั้งนี้ก็เพราะเกษตรกรยังขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดการผลิตผักคาวตองเป็นการค้า ซึ่งปัญหาที่สำคัญที่พบก็คือเรื่องการจัดการการให้น้ำชลประทานแก่ผักคาวตองอย่างไม่เหมาะสม กล่าวคือ เกษตรกรบางรายที่ปลูกผักคาวตองมีการให้น้ำชลประทานในปริมาณที่มากเกินไปมีผลทำให้ผักคาวตองลำต้นเน่าและมีการเจริญเติบโตทางลำต้นที่ไม่ดี แต่เกษตรกรบางรายก็มีการให้น้ำแก่ผักคาวตองน้อยมาก จึงทำให้ผักคาวตองมีการชะงักการเจริญเติบโตทางลำต้น ใบเหลืองมีการแตกกิ่งก้านน้อย และผลผลิตที่ได้รับต่ำ จากการสำรวจพื้นที่ปลูกผักคาวตองของผู้วิจัยพบว่าการขาดน้ำของผักคาวตองมีผลกระทบต่อผลผลิตเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเอกสารก็ยังไม่พบว่า เมื่อผักคาวตองได้รับการขาดน้ำจะมีผลกระทบต่อผลผลิตอย่างไร ดังนั้นจึงได้ทำการศึกษาในครั้งนี้ขึ้น การศึกษาในครั้งนี้ได้ศึกษาถึงการขาดน้ำในช่วงอายุต่าง ๆ กันของผักคาวตอง และช่วงเวลาของการขาดน้ำเป็นเวลาที่ยาวนานแตกต่างกันว่าจะมีผลต่อผักคาวตองอย่างไร การขาดน้ำช่วงใดเป็นช่วงที่วิกฤติที่สุดที่ทำให้ผักคาวตองมีการเจริญเติบโตและผลผลิตต่ำสุด นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเพิ่มเติมถึงสารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาคือสารฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์ ว่าการขาดน้ำนี้มี

ผลกระทบต่อสารออกฤทธิ์นี้หรือไม่ ผลจากการทดลองนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกรผู้ปลูกผักกาดทองจะได้มีการจัดการให้น้ำชลประทานแก่ผักกาดทองได้อย่างเหมาะสมต่อไป โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติของการขาดน้ำ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกรให้มากขึ้นต่อไป

#### วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

1. เพื่อต้องการทราบว่า ผักกาดทองที่ได้รับการขาดน้ำในช่วงเวลาที่แตกต่างกันของการเจริญเติบโตและมีการขาดน้ำเป็นเวลานานที่แตกต่างกันจะมีผลกระทบต่อสารเจริญเติบโตและผลผลิตผักกาดทองมากน้อยเพียงใด

2. เพื่อต้องการทราบว่า การขาดน้ำของผักกาดทองจะมีผลกระทบต่อสารออกฤทธิ์ คือสารฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์ มากน้อยเพียงใด

## ตรวจเอกสาร

ผักคาวตอง หรือฤๅษาคาว เป็นพืชสมุนไพรที่รู้จักกันดีที่เรียกว่า ผักก้านตอง ผักเข้าตอง ผักคาวทอง พลุคาวหรือคาวตอง คนจีนเรียกว่า yu xing cao หรือ chinese lizard tail จัดอยู่ในวงศ์ Saururaceae มีลักษณะเป็นพืชล้มลุก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Houttuynia cordata* Thunb. (เต็ม, 2523)

### ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

คาวตองเป็นพืชผักพื้นบ้านของไทย และประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นพืชล้มลุก มีอายุอยู่ได้หลายปี มีกลิ่นคล้ายคาวปลา ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของคาวตองมีดังนี้

ลำต้น มีลักษณะเลื้อยเป็นปล้องสั้น ๆ สีน้ำตาล ตามข้อมีรากออกโดยรอบ ลำต้นที่อยู่เหนือดินสูงประมาณ 10-30 เซนติเมตร

ใบ มีลักษณะเป็นใบเดี่ยวออกเวียนหรือออกสลับ แผ่นใบเป็นรูปไข่ กว้าง 2.5-7.5 เซนติเมตร และยาว 3-9 เซนติเมตร ปลายใบแหลมมาก โคนใบเป็นรูปหัวใจ หรือรูปไต ขอบใบเรียบ เส้นใบออกที่โคนใบ 5-7 เส้น มีขนสั้น ๆ ตามโคนใบ แผ่นใบบนมีสีเขียวเข้มกว่าใต้ใบ มีหูใบติดกับก้านใบ

ช่อดอก ช่อดอกของคาวตองออกตามยอดหรือซอกใบใกล้กับยอด ช่อดอกรูปร่างเป็นแบบทรงกระบอกกว้าง 5-8 มิลลิเมตร และยาว 2.0-2.5 มิลลิเมตร มีกลีบประดับสีขาว 4 กลีบ รูปรีหรือรูปไข่ กลีบแกมขอบขนาน กว้าง 5-7 มิลลิเมตร และยาว 1-2 มิลลิเมตร รองรับโดยช่อ ก้านช่อดอกยาว 1-2 เซนติเมตร ช่อดอกประกอบไปด้วยดอกเล็ก ๆ จำนวนมากมาย เรียงตัวอัดแน่นตามความยาวของแกนช่อดอก ดอกแต่ละดอกไม่มีก้านดอก ไม่มีกลีบดอก มีเฉพาะเกสรตัวผู้ 3 อัน ยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร อับละอองเรณูมีสีเหลือง ดอกออกบานในเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม (สถาบันวิจัยสมุนไพร, 2546) เมื่อดอกแก่และร่วงโรยไปก็จะกลายเป็นผล ซึ่งผลมีลักษณะกลมรี ปลายผลแยกออกเป็น 3 แฉก รวมตัวกันแน่นยาวเป็นรูปทรงกระบอก

### การเกษตรกรรมของผักคาวตอง

ผักคาวตองเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีบนพื้นที่สูงตั้งแต่ 300 - 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล ดินที่ใช้ปลูกตั้งแต่ดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงจนถึงดินทรายที่มีปริมาณธาตุอาหารบางชนิดค่อนข้างต่ำ เป็นพืชที่ต้องการร่มเงา เจริญเติบโตได้ในสภาพที่มีความชื้นสูงและเป็นบริเวณที่ได้รับแสงแดดไม่มากนัก หรือได้รับแสงแดดไม่ตลอดทั้งวัน (สถาบันวิจัยสมุนไพร, 2546) การขยายพันธุ์ทำได้โดยวิธีการปักชำ ในการเตรียมกิ่งปักชำควรปักชำในภาชนะหรือกระบะชำที่มีวัสดุปักชำไม่โปร่งมากนัก แต่มีความชุ่มชื้นเพียงพอ ซึ่งอาจจะใช้ดินผสมกันกับขุยมะพร้าวในอัตราส่วน 4:1 โดยปริมาตร ปักชำทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน คาวตองก็จะออกรากและมีสภาพที่แข็งแรงสามารถย้ายไปปลูกได้ การปลูกคาวตองจะปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่เน้นการเลือกกิ่ง

พันธุ์ที่ใช้ปลูกคือมีขนาดยาว 8-10 เซนติเมตร มีข้อ 2-3 ข้อ และมีรากอยู่พอสมควร (สถาบันวิจัยสมุนไพร, 2546)

### สรรพคุณในตำรายาไทย

ผักกาดตองมีสรรพคุณดังต่อไปนี้

ต้น : ใช้รักษาโรคติดเชื้อและทางเดินหายใจ ฝีหนองในปอด ปอดบวม ปอดอักเสบ ใช้มาลาเรีย แก้บิด ขับปัสสาวะ ลดอาการบวม น้ำ นิ้ว ขับระดูขาว ริดสีดวงทวาร แก้โรคผิวหนัง ผื่นคัน ฝีฝีกบัว แผลเปื่อย ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ แก้ไอ หลอดลมอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ

ราก : ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ ใบใช้แก้โรคบิด โรคผิวหนัง โรคหัด ริดสีดวงทวาร หนองใน

ใบ : ใช้รักษาโรคบิด หัด โรคผิวหนัง ริดสีดวงทวาร หนองใน ใช้ปรุงเป็นยาแก้กามโรค ทำให้แผลแห้งเร็ว แก้โรคข้อและแก้โรคผิวหนังทุกชนิดทั้งต้นมีรสเย็นและฉุน ใช้เป็นยาแก้โรคบิด โรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ขับปัสสาวะ แก้บวม น้ำ แก้ไอ หลอดลมอักเสบ ฝีบวมอักเสบ ริดสีดวงทวาร หูชั้นกลางอักเสบ (สถาบันวิจัยสมุนไพร, 2546)

### ข้อมูลทางเภสัชวิทยา

- 1.ฤทธิ์ระงับปวด เร่งการเจริญเติบโตของเซลล์ ห้ามเลือด รักษาปริมาณของเหลวในร่างกาย
- 2.ฤทธิ์ขับปัสสาวะ พบสารฟลาโวนอยด์ที่แยกได้จากใบผักกาดตองเป็นสาระสำคัญในการออกฤทธิ์
- 3.ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ จากการกลั่นส่วนที่อยู่เหนือดินของผักกาดตอง พบว่ามีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียอย่างแรงต่อเชื้อ *Bacillus cereus* และ *B. Subtilis* เชื้ออหิวาต์ *Vibrio cholerae* 0-1 และ *V. Parahaemolyticus* นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสามารถต้านเชื้อราได้ดี (สุคนธ์ทิพย์, 2543; แห่งน้อย, 2541)
- 4.ฤทธิ์ต้านไวรัส สารสกัดจากผักกาดตอง สามารถยับยั้งการเจริญของไวรัสที่เป็นสาเหตุของไข้หวัดใหญ่ในหลอดทดลองได้ นอกจากนี้ยังมีผลต่อไวรัสที่มีเปลือกหุ้ม 3 ชนิด ได้แก่ herpes simplex virus type-1 (HSV-1) ไวรัสไข้หวัดใหญ่ และไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส์ (HIV-1) และไวรัสที่ปราศจากเปลือกหุ้ม 2 ชนิด คือ โปลิโอไวรัส และคอกซากิไวรัส

### ส่วนประกอบทางเคมี

จากการตรวจหาสารประกอบทางเคมีในใบของผักกาดตอง พบว่าจะประกอบไปด้วยสารประกอบหลักที่สำคัญ 3 กลุ่มด้วยกันคือ

1. กลุ่มฟลาโวนอยด์ ไกลโคไซด์ (flavonoid glycosides) เป็นกลุ่มสาระสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ที่มีในปริมาณมากที่สุด สามารถพบได้ในส่วนของใบ กิ่งและช่อดอก ประกอบด้วย quercitrin, rutin, hyperin, afzalin และ isoquercitrin โดยในส่วนของใบมีปริมาณของสารฟลาโวนอยด์ มากที่สุด (Liao et al., 2002; Qui et al., 2005; Tomoko et al., 1994; Eu et al., 1996) และ

พบว่ามีส่วนของปริมาณ quercitrin ในใบปริมาณมากที่สุดเช่นกัน ในส่วนของช่อดอกจะมีปริมาณ quercitrin และ hyperin สูง ส่วนของกิ่งจะมีสารเหล่านี้เพียงเล็กน้อย ปริมาณของสารทั้งหมดที่พบอยู่ในตัวอย่างมีประมาณ 2-4 เปอร์เซ็นต์ (Sakai , 1996)

2. กลุ่มน้ำมันหอมระเหย (essential oil) มีอยู่ในปริมาณน้อยมาก สุนทรื (2536) รายงานว่าปริมาณน้ำมันหอมระเหยที่สามารถสกัดได้มีอยู่ประมาณ 0.0049 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น น้ำมันหอมระเหยมีสารประกอบอยู่ทั้งหมด 32 ชนิด ได้แก่  $\alpha$  - และ  $\beta$ -pinene, camphene,  $\beta$ -myrcene, linonene 1,8-cineol, ocimene, p-cymene, terpinolene,  $\beta$ -caryophyllene, humulene, leaf alc., linalool, terpinene-4-ol, 1-nonanol, 1-decanol, nerol, geraniol, 1-dodecanol, 1-tridecanol, nonanal, decanal, dodecanal, 3-keto-decanal, methyl n-nonyl ketone, methyl n-udecyl ketone, methyl laryl sulfide, decanoic acid, thymol, carvacrol, o-cresol and p-cresol

3. กลุ่มสารแอลคาลอยด์ (alkaloids) พบอยู่ใน 2 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มแรกเป็นอนุพันธ์ของ pyridine และ 1,4 – dihydropyridine และกลุ่มที่ 2 เป็นอนุพันธ์ของ aporphine (เอมอร์, 2541)

### การให้น้ำชลประทานและการขาดน้ำของผักคาวตอง

การปลูกผักคาวตอง ประนม (2530) รายงานว่า ผักคาวตองเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่ราบชุ่มชื้นตามร่องน้ำ ตามทุ่งนาที่มีร่มเงาและมีความชื้นสูง สุรินทร์และคณะ (2543) รายงานว่า ผักคาวตองมีการเจริญเติบโตที่ดีมากขึ้นอยู่บริเวณในสภาพที่มีความชื้นในดินสูง ซึ่งสอดคล้องกับ สุรินทร์ และคณะ (2544) ที่ได้ทดลองเพิ่มเติมว่าผักคาวตอง ถ้าได้รับน้ำชลประทานในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น จะมีแนวโน้มที่มีผลทำให้มีการสะสมน้ำหนักแห้งในส่วนที่อยู่เหนือดินเพิ่มมากขึ้นอย่างเด่นชัด รุจินาด (2531) รายงานว่าการให้น้ำแก่พืชสมุนไพรควรมีการให้น้ำในช่วงเช้า และไม่ควรให้น้ำในช่วงที่มีแสงแดดจัดเพราะทำให้พืชสมุนไพรไม่สามารถปรับตัวได้ ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อพืชสมุนไพรและทำให้พืชสมุนไพรตายได้ วิฑูรย์ (2544) รายงานว่า การให้น้ำชลประทานแก่พืชสมุนไพรมีความจำเป็นอย่างมาก ควรให้น้ำชลประทานอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง การให้น้ำแก่ผักคาวตองที่น้อยจนเกินไปไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตก็จะมีผลทำให้ผักคาวตองเกิดการขาดน้ำได้ ผักคาวตองที่เกิดการขาดน้ำนี้จะทำให้มีการแตกกอน้อย ใบมีสีเหลืองซีดและเหี่ยวแห้ง รวมทั้งมีการเจริญเติบโตทางลำต้นไม่สมบูรณ์ เป็นต้น และมีผลทำให้ผลผลิตลดลงได้ สมยศและคณะ (2548) พบว่า พืชสมุนไพรที่ได้รับการขาดน้ำในช่วงแรกของการเจริญเติบโตโดยเฉพาะที่อายุ 30 วันหลังปลูกจะมีการเจริญเติบโตและผลผลิตต่ำสุด เมื่อเปรียบเทียบกับกับการขาดน้ำในช่วงอื่นๆ และนอกจากนี้การขาดน้ำของพืชสมุนไพรในช่วงหลังๆ ของการเจริญเติบโตจะมีผลกระทบต่อ การเจริญเติบโตและผลผลิตน้อยมาก เฉลิมพล (2535) รายงานว่า การขาดน้ำในช่วงแรกของการเจริญเติบโตเป็นช่วงที่สำคัญที่สุด เพราะจะทำให้การเจริญเติบโตหยุดชะงัก พืชมีขนาดของลำต้นเล็ก ต้นเตี้ย ใบสั้นและแคบกว่าปกติ จึงส่งผลให้พืชมีการสะสมน้ำหนักแห้งและผลผลิตน้อย ถึงแม้ว่าในภายหลังจะได้รับน้ำตามปกติก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถทดแทนผลผลิตที่ลดลงได้ (Halim *et al.*,1989) ส่วนการขาดน้ำในช่วงหลังของการเจริญเติบโต พืชมีอายุมากขึ้น จึงสามารถปรับตัวได้และสามารถ

ทนทานต่อสภาพการขาดน้ำในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ได้ดี และเมื่อได้รับน้ำอีกครั้งหลังจากขาดน้ำ จึงทำให้พืชมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและสามารถเจริญเติบโตเป็นไปตามปกติ การเจริญเติบโตและผลผลิตจึงลดลงไม่มากนัก (สายันท์, 2537) อย่างไรก็ตามการให้น้ำชลประทานอย่างเหมาะสมก็สามารถเพิ่มผลผลิตของฝักคาวตองได้ โดยเฉพาะช่วงที่ฝักคาวตองเกิดการขาดน้ำขึ้นและเป็นช่วงที่วิกฤติที่สุด และการขาดน้ำนี้จะมีผลกระทบต่อฝักคาวตองโดยเฉพาะมีผลต่อปริมาณของสารฟลาโวนอยด์ ไกลโคไซด์เล็กน้อยเพียงใด ในปัจจุบันยังไม่เคยมีการศึกษากันมาก่อน ดังนั้นจึงได้ทำการศึกษาในครั้งนี้ขึ้น การศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ปลูกคาวตองเป็นอย่างมาก ซึ่งจะได้จัดการให้น้ำแก่ฝักคาวตองได้อย่างเหมาะสมต่อไป

## อุปกรณ์และวิธีการทดลอง

### วิธีการทดลอง

วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block design มีจำนวน 3 ซ้ำ สิ่งทดลอง ได้แก่ ผักคาวตองที่ได้รับการขาดน้ำในช่วงอายุ และเวลานานของการขาดน้ำแตกต่างกัน ซึ่งมีสิ่งทดลองดังนี้

1. ผักคาวตองขาดน้ำที่อายุ 15 วันหลังปลูก และได้รับการขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน
2. ผักคาวตองขาดน้ำที่อายุ 15 วันหลังปลูก และได้รับการขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน
3. ผักคาวตองขาดน้ำที่อายุ 30 วันหลังปลูก และได้รับการขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน
4. ผักคาวตองขาดน้ำที่อายุ 30 วันหลังปลูก และได้รับการขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน
5. ผักคาวตองขาดน้ำที่อายุ 60 วันหลังปลูก และได้รับการขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน
6. ผักคาวตองขาดน้ำที่อายุ 60 วันหลังปลูก และได้รับการขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน
7. ผักคาวตองขาดน้ำที่อายุ 90 วันหลังปลูก และได้รับการขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน
8. ผักคาวตองขาดน้ำที่อายุ 90 วันหลังปลูก และได้รับการขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน
9. ผักคาวตองที่ได้รับน้ำตลอดอายุการเจริญเติบโตและไม่ขาดน้ำ

ปลูกผักคาวตองลงในกระถางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว โดยใช้ลำต้นผักคาวตองที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไป มีความยาวสม่ำเสมอ 10 เซนติเมตร จำนวน 3 ต้นต่อกระถาง รวมทั้งหมด 135 กระถาง ก่อนปลูกมีการให้น้ำแก่ดินโดยให้ดินที่ระดับความจุสนาม (Field capacity) หลังจากนั้นมีการให้น้ำแก่ผักคาวตองทุกวันในปริมาณเทียบเท่ากับปริมาณน้ำฝน 5 มิลลิเมตร จนกระทั่งผักคาวตองมีอายุได้ 15 วัน หลังปลูกก็เริ่มมีการให้ผักคาวตองมีการขาดน้ำตามสิ่งทดลองที่กำหนด สำหรับการให้น้ำชลประทานช่วงเวลาของการให้น้ำจะให้ช่วงเวลาเช้าและมีการให้อย่างสม่ำเสมอ โดยใช้บัวรดน้ำ แต่ถ้ามีการตกของฝนในระหว่างการทดลองและมีปริมาณน้ำไม่มาก ก็จะมีการให้เพิ่มเติมตามสิ่งทดลองที่กำหนด แต่ถ้ามีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามากเกินกว่าที่กำหนดไว้ ก็จะไม่มีการให้เพิ่มเติมอีก การให้น้ำชลประทานจะให้ในปริมาณ 5 มิลลิเมตรต่อวัน โดยเฉพาะในสิ่งทดลองที่ไม่ขาดน้ำจะมีการให้ทุกวันจนกระทั่งเก็บเกี่ยว การให้น้ำให้พร้อมกันทั้งหมดทุกกระถาง ตลอดอายุการเจริญเติบโต สำหรับการดูแลรักษามีการกำจัดวัชพืช จำนวน 3 ครั้ง เมื่อผักคาวตองมีอายุได้ 30, 60 และ 90 วันหลังปลูก ส่วนการป้องกันกำจัดโรคและแมลงพบว่าในผักคาวตองมีแมลงศัตรูพืชมารบกวนน้อยมาก จึงไม่มีการป้องกันกำจัด หลังจากผักคาวตองมีอายุ 60 วันหลังปลูก ก็จะมีการแตกกิ่งก้านสาขาและแตกยอดอ่อนเป็นกอและเป็นพุ่มสีเขียวสด และสามารถเก็บต้นสดได้เมื่อผักคาวตองมีอายุตั้งแต่ 120 วัน เป็นต้นไป

### การเก็บข้อมูล

1. วัดความยาวของลำต้น จำนวนข้อบนลำต้น น้ำหนักสดของลำต้น ใบ ดอก และราก หลังจากนั้นนำไปอบแห้งในตู้อบโดยใช้อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 48 ชั่วโมง หรือจนน้ำหนักแห้งคงที่ แล้วจึงนำมาชั่งหาน้ำหนักแห้งของต้น ใบ ราก และดอก ซึ่งในการตรวจวัดหาน้ำหนักสดและแห้งนี้ตรวจวัดเมื่อผักกาดทองมีอายุ 30, 60, 90 และ 120 วันหลังปลูก ตามลำดับ

2. ตรวจวัดพื้นที่ใบ เมื่อนำใบผักกาดทองมาชั่งหาน้ำหนักสดเสร็จแล้ว ก็จะรวบรวมใบทั้งหมดมาตรวจวัดพื้นที่ใบก่อนที่จะนำเอาเข้าสู่ตู้อบเพื่อหาน้ำหนักใบแห้ง การวัดพื้นที่ใบตรวจวัดโดยใช้เครื่องมือวัดพื้นที่ใบ คือ Leaf area meter รุ่น LI-3100 ของบริษัท Li-cor ผลิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

3. ทำการเก็บตัวอย่างใบสดมาหาปริมาณของคลอโรฟิลล์ตามวิธีการดัดแปลงของ Whithan *et al.* (1971) โดยใช้น้ำหนักใบสด 125 กรัม สกัดด้วยอะซิโตน 80 เปอร์เซ็นต์ น้ำสารละลายที่ได้มาอ่านค่าการดูดกลืนแสงด้วย spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 645 และ 663 นาโนเมตร และนำมาคำนวณหาค่าปริมาณคลอโรฟิลล์โดยมีหน่วยเป็นมิลลิกรัมของคลอโรฟิลล์ต่อ 100 กรัม น้ำหนักใบสด

4. ตรวจวัดอัตราการเจริญเติบโตของผักกาดทอง (Crop growth rate) โดยจะตรวจวัดอัตราการเจริญเติบโตของผักกาดทองเป็นช่วงๆ ดังนี้ คือ 0-30, 30-60, 60-90 และ 90-120 วันหลังปลูก สำหรับอัตราการเจริญเติบโตของผักกาดทองมีการคำนวณโดยใช้สูตร

$$\text{อัตราการเจริญเติบโตทางลำต้น} = \frac{1}{GA} \times \frac{W_2 - W_1}{T_2 - T_1}$$

ในเมื่อ GA = พื้นที่ดิน (Ground area)

$W_1$  = น้ำหนักแห้งทั้งหมดที่ระยะเวลา  $T_1$

$W_2$  = น้ำหนักแห้งทั้งหมดที่ระยะเวลา  $T_2$

$T_1$  = ระยะเวลาในการวัดน้ำหนักแห้งทั้งหมด ครั้งที่ 1

$T_2$  = ระยะเวลาในการวัดน้ำหนักแห้งทั้งหมด ครั้งที่ 2

5. คำนวณหาค่า Relative water content ซึ่งเป็นการตรวจวัดสถานะของน้ำในใบผักกาดทองที่อายุ 30 , 60 , 90 และ 120 หลังปลูกตามวิธีการของ Turner (1981) ซึ่งมีสูตรคำนวณ ดังนี้

$$\text{Relative water content (\%)} = \frac{FW - DW}{TW - DW} \times 100$$

เมื่อ FW = น้ำหนักสดของใบที่ต้องการวัด

DW = น้ำหนักแห้งของใบ

TW = น้ำหนักของใบเมื่ออิมมัวไปด้วยน้ำ

6. ตรวจวัดอัตราการคายน้ำจากใบ (Transpiration rate), Total conductance และอุณหภูมิใบ โดยใช้เครื่องมือ Li-600 Steady state porometer เมื่อพักควาดองมีอายุได้ 30, 60, 90 และ 120 วัน หลังปลูก โดยวิธีการสุ่มวัดใบที่มีการขยายตัวเต็มที่และอยู่บริเวณส่วนบนของลำต้น จำนวน 3 ใบ ในแต่ละกระถางแล้วจึงนำมาหาเฉลี่ยเวลาที่ทำการวัดอยู่ช่วง 14.00-16.00 น.

7. การวิเคราะห์หาปริมาณของฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์ทำในช่วงเก็บเกี่ยว โดยนำส่วนใบของผักควาดองในแต่ละสิ่งทดลองเก็บรวบรวมมาจำนวนหนึ่ง หลังจากนั้นนำมาอบให้แห้งในตู้อบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 72 ชั่วโมง นำตัวอย่างที่อบแห้งแล้วมาบดให้ละเอียด จากนั้นชั่งน้ำหนักตัวอย่างจำนวน 100 มิลลิกรัม ใส่ลงในหลอดทดลอง เติมสารละลายเมทานอล 70 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 5 มิลลิกรัม นำหลอดทดลองไปไว้ในน้ำที่มีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที จากนั้นนำไปเข้าเครื่องด้วยความเร็ว 3,500 รอบต่อนาที นาน 10 นาที เพื่อแยกเอาส่วนตะกอนออกจากสารละลาย นำสารละลายที่สกัดได้ไปตรวจวัดปริมาณฟลาโวนอยด์ด้วยเครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ซึ่งสามารถตรวจวัดสารฟลาโวนอยด์โดยเฉพาะ quercitrin ได้ โดยใช้วิธีของ Fuse *et al.* (1994) และ Kawamura *et al.* (1994)

8. เก็บตัวอย่างดินเพื่อนำมาหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นในดิน เมื่อควาดองมีอายุได้ 30, 60, 90, 120 และ 150 วันหลังปลูก โดยใช้สูตร

$$\text{เปอร์เซ็นต์ความชื้นในดิน} = \frac{\text{น้ำหนักดินเปียก} - \text{น้ำหนักดินแห้ง}}{\text{น้ำหนักดินแห้ง}} \times 100$$

9. ข้อมูลฟ้าอากาศได้จากสถานีตรวจอากาศ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งทำการตรวจวัดทุกวัน ได้แก่ ปริมาณน้ำฝน ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดของอากาศ และการระเหยน้ำจากถาดวัดน้ำระเหย (American class A pan) เป็นต้น

## ผลการทดลอง

ข้อมูลฟ้าอากาศได้จากสถานีตรวจอากาศ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งทำการตรวจวัดทุกวัน ได้แก่ ปริมาณน้ำฝน ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดของอากาศ และการระเหยน้ำจากถาดวัดน้ำระเหย (American class A pan) ตลอดการทดลอง (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 – เมษายน พ.ศ. 2554)


พบว่าอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดเฉลี่ย (ภาพที่ 1A) ในช่วงของการทดลองระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 ส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ในวันที่ 18 เดือนมกราคม 2554 เป็นช่วงที่มีอุณหภูมิต่ำสุด คือ 17.7 องศาเซลเซียส และค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นจนกระทั่งมีค่าสูงสุดในวันที่ 2 เดือนเมษายน 2554 คือ 35.3 องศาเซลเซียส

ส่วนค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ (ภาพที่ 1B) มีค่าอยู่ระหว่าง 50 ถึง 92 เปอร์เซ็นต์ โดยมีค่าต่ำสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน มีค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศเท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์ และหลังจากนั้นจึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น


ความเข้มแสง (ภาพที่ 1C) ในแต่ละวันมีความผันแปรเป็นอย่างมาก เดือนที่มีความเข้มของแสงเฉลี่ยสูงสุดคือเดือนเมษายน และเดือนที่มีความเข้มของแสงเฉลี่ยต่ำสุดคือ เดือนมีนาคม

การระเหยของน้ำ (ภาพที่ 1D) โดยเฉลี่ยประมาณ 4.31 มิลลิเมตรต่อวัน เดือนธันวาคม มีการระเหยของน้ำเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.02 มิลลิเมตรต่อวัน ส่วนการระเหยของน้ำเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ เดือนเมษายน 4.80 มิลลิเมตรต่อวัน

ปริมาณน้ำฝน (ภาพที่ 2) พบว่ากลางเดือนพฤศจิกายน มีการตกของฝน 1 ครั้ง หลังจากนั้นมีการทิ้งช่วงเล็กน้อย ฝนตกครั้งที่ 2 ช่วงกลางเดือนธันวาคมและมีการทิ้งช่วงเล็กน้อย ฝนตกครั้งที่ 3 ช่วงกลางเดือนมกราคม 2 ครั้ง จากนั้นการตกของฝนจึงเริ่มตกมากขึ้นตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่สิ้นสุดของการทดลอง ปริมาณน้ำฝนที่ตกตลอดช่วงฤดูปลูกมีทั้งหมดประมาณ 298 มิลลิเมตร



ภาพที่ 1 อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด (A), ความชื้นสัมพัทธ์ (B), ความเข้มของแสง (C) และการระเหยของน้ำ (D) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2554



ภาพที่ 2 ปริมาณน้ำฝน (มิลลิเมตร) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2554

## ลักษณะทางสรีรวิทยาของผักคาวตอง

### อุณหภูมิใบ

อุณหภูมิใบ (องศาเซลเซียส) ของผักคาวตอง (ตารางที่ 1) เมื่อได้รับการขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกันและขาดน้ำในช่วงเวลาแตกต่างกันของการเจริญเติบโต พบว่า การขาดน้ำมีผลทำให้อุณหภูมิใบมีค่าสูงขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทุกช่วงอายุการเจริญเติบโต แต่เมื่อการขาดน้ำผ่านพ้นไปและผักคาวตองได้รับน้ำชลประทานอีกครั้งอุณหภูมิใบของผักคาวตองก็มีค่าลดลงมีค่าไม่แตกต่างกันกับผักคาวตองที่ไม่มีการขาดน้ำ การขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วันและ 7 วัน พบว่า การขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน อุณหภูมิใบมีค่าสูงกว่าการขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน แตกต่างกันในทางสถิติทุกช่วงอายุการเจริญเติบโต สำหรับอุณหภูมิใบของผักคาวตองที่อายุ 120 วันหลังปลูก พบว่า อุณหภูมิใบของผักคาวตองในสิ่งทดลองที่ได้รับการขาดน้ำมีค่าไม่แตกต่างกันในทางสถิติกับ ผักคาวตองที่ได้รับน้ำตลอดอายุการเจริญเติบโต

ตารางที่ 1 อุณหภูมิใบ (องศาเซลเซียส) ของผักคาวตอง เมื่อได้รับการขาดน้ำในช่วงอายุที่ต่างกันและขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกัน

สิ่งทดลอง	อายุพืช (วันหลังปลูก)					
	22	37	67	97	120	
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	34.30	34.20	34.37	34.15	33.15
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	33.15	34.70	34.45	34.78	32.95
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	33.35	33.50	35.15	35.65	33.98
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	32.40	33.73	34.70	37.55	33.65
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	35.05	34.65	34.92	34.30	34.25
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	33.20	35.23	34.40	35.02	33.15
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	33.55	33.40	35.47	34.30	33.40
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	32.60	33.98	34.90	36.65	34.15
ไม่มีการขาดน้ำ		32.45	33.87	34.00	33.15	33.08
ค่าเฉลี่ย		33.33	34.14	34.70	35.06	33.66
LSD (0.05) (การขาดน้ำ)		0.20	0.62	0.61	0.73	ns
CV (%) (การขาดน้ำ)		0.35	1.06	1.02	1.20	1.81

ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

### Total stomata conductance

Total stomata conductance ( $\text{m mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ ) ของผักกาดทอง (ตารางที่ 2) เมื่อได้รับการขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกันและขาดน้ำในช่วงเวลาแตกต่างกันของการเจริญเติบโต พบว่า ทุกช่วงอายุการเจริญเติบโตผักกาดทองที่ได้รับการขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน จะมีค่า Total stomata conductance มีค่ามากกว่าผักกาดทองที่ได้รับการขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน และเมื่อช่วงเวลาของการขาดน้ำผ่านพ้นไปผักกาดทองได้รับน้ำชลประทานอีกครั้ง จะมีผลทำให้ค่า Total stomata conductance มีค่าไม่แตกต่างกันในทางสถิติทุกสิ่งทดลองที่ได้รับการขาดน้ำเมื่อเปรียบเทียบกับผักกาดทองที่ได้รับน้ำตามปกติตลอดอายุการเจริญเติบโต Total stomata conductance ของผักกาดทองที่อายุ 120 วันหลังปลูก มีค่าไม่แตกต่างกันในทางสถิติ

**ตารางที่ 2** Total stomata conductance ( $\text{m mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ ) ของผักกาดทอง เมื่อได้รับการขาดน้ำในช่วงอายุที่แตกต่างกัน และขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกัน

สิ่งทดลอง		อายุพืช (วันหลังปลูก)				
		22	37	67	97	120
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	11.93	18.50	15.33	13.15	14.00
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	12.82	14.40	15.15	13.60	15.25
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	13.30	17.58	12.85	13.17	14.75
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	13.25	16.90	14.18	11.30	15.50
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	10.95	16.50	15.29	12.37	13.03
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	12.17	13.25	14.92	13.80	14.30
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	12.85	16.25	11.70	13.80	15.59
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	12.20	15.55	13.97	10.20	14.85
ไม่มีการขาดน้ำ		13.33	16.95	14.87	13.20	15.37
ค่าเฉลี่ย		12.53	16.20	14.25	12.73	14.73
LSD (0.05) (การขาดน้ำ)		1.41	0.38	2.25	1.35	ns
CV (%) (การขาดน้ำ)		6.50	1.36	9.15	6.14	6.60

ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์

### อัตราการคายน้ำจากใบ (Transpiration rate)

อัตราการคายน้ำจากใบ (Transpiration rate) ( $\text{m mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ ) ของผักกาดทอง (ตารางที่ 3) เมื่อได้รับการขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกันและขาดน้ำในช่วงเวลาแตกต่างกัน พบว่า ในแต่ละช่วงอายุของการเจริญเติบโตที่มีการขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน และ 7 วัน มีผลทำให้อัตราการคายน้ำจากใบมีความแตกต่างกันในทางสถิติ การขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน อัตราการคายน้ำจากใบจะมีค่าสูงกว่าการขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน แตกต่างกันในทางสถิติทุกช่วงอายุการเจริญเติบโต และเมื่อช่วงเวลาของการขาดน้ำผ่านพ้นไป ผักกาดทองได้รับน้ำชลประทานอีกครั้ง พบว่า อัตราการคายน้ำจากใบก็จะมีค่าไม่แตกต่างกันกับผักกาดทองที่ได้รับน้ำชลประทานอย่างเพียงพอตลอดอายุการเจริญเติบโต อย่างไรก็ตามพบว่าที่อายุ 120 วันหลังปลูก ผักกาดทองในทุกสิ่งทดลองมีอัตราการคายน้ำจากใบมีค่าไม่แตกต่างกันในทางสถิติ

ตารางที่ 3 อัตราการคายน้ำจากใบ (Transpiration rate) ( $\text{m mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ ) ของผักกาดทอง เมื่อได้รับการขาดน้ำในช่วงอายุที่แตกต่างกัน และขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกัน

สิ่งทดลอง		อายุพืช (วันหลังปลูก)				
		22	37	67	97	120
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	0.23	0.48	0.33	0.67	0.32
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	0.34	0.40	0.39	0.60	0.33
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	0.34	0.48	0.26	0.59	0.30
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	0.32	0.49	0.33	0.48	0.34
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	0.13	0.48	0.31	0.53	0.30
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	0.30	0.32	0.34	0.58	0.33
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	0.33	0.47	0.16	0.53	0.33
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	0.30	0.45	0.32	0.47	0.34
ไม่มีการขาดน้ำ		0.30	0.46	0.34	0.66	0.34
ค่าเฉลี่ย		0.28	0.44	0.30	0.56	0.32
LSD (0.05) (การขาดน้ำ)		0.12	4.54	9.86	0.12	ns
CV (%) (การขาดน้ำ)		25.11	5.87	18.44	12.47	11.12

ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

### คลอโรฟิลล์ภายในใบ

คลอโรฟิลล์ภายในใบ (เปอร์เซ็นต์) ของผักกาดทอง (ตารางที่ 4) พบว่าผักกาดทองที่ได้รับการขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกันและขาดน้ำในช่วงอายุแตกต่างกัน ปริมาณคลอโรฟิลล์ภายในใบมีค่าแตกต่างกันในทางสถิติ และแตกต่างกันกับผักกาดทองที่ไม่ขาดน้ำทุกช่วงอายุการเจริญเติบโต ผักกาดทองที่ขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วันจะมีค่าคลอโรฟิลล์ภายในใบน้อยกว่าผักกาดทองที่ได้รับการขาดน้ำเป็นเวลา 7 วัน

**ตารางที่ 4** คลอโรฟิลล์ภายในใบ (เปอร์เซ็นต์) ของผักกาดทอง เมื่อได้รับการขาดน้ำในช่วงอายุที่แตกต่างกัน และขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกัน

สิ่งทดลอง	อายุพืช (วันหลังปลูก)	อายุพืช (วันหลังปลูก)				
		30	60	90	120	150
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	33.07	42.77	45.97	45.50	42.20
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	31.47	40.37	45.93	46.27	42.13
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	36.53	39.03	43.57	45.13	42.27
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	35.60	37.50	46.33	43.10	41.73
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	36.43	42.47	48.53	47.27	43.77
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	35.57	39.77	48.93	47.40	43.70
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	37.00	42.10	45.23	47.07	44.33
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	35.40	40.70	48.27	46.47	42.97
ไม่มีการขาดน้ำ		34.70	37.77	42.30	41.37	40.57
ค่าเฉลี่ย		35.08	40.24	46.11	45.05	42.62
LSD (0.05) (การขาดน้ำ)		2.87	2.11	3.00	3.49	2.18
CV (%) (การขาดน้ำ)		4.72	3.02	3.76	4.44	2.95

### ปริมาณน้ำภายในใบ (Relative water content)

ปริมาณน้ำภายในใบ (Relative water content) (เปอร์เซ็นต์) ของผักกาดทอง (ตารางที่ 5) พบว่า ผักกาดทองที่ไม่ได้รับการขาดน้ำมีปริมาณน้ำภายในใบมีค่ามากที่สุด การขาดน้ำเป็นเวลา 3 วัน และ 7 วัน พบว่า มีปริมาณน้ำภายในใบมีค่าไม่แตกต่างกัน และการขาดน้ำในช่วงอายุแตกต่างกัน ก็มีค่าปริมาณน้ำภายในใบไม่แตกต่างเช่นกันแต่มีค่าแตกต่างกันที่ปริมาณน้ำภายในใบของผักกาดทองที่ไม่ขาดน้ำ แตกต่างกันทางสถิติทุกช่วงอายุการเจริญเติบโต ยกเว้นที่อายุ 30 วันหลังปลูก

**ตารางที่ 5** Relative water content ภายในใบของผักคาวตอง เมื่อได้รับการขาดน้ำในช่วงอายุที่แตกต่างกัน และขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกัน

สิ่งทดลอง		อายุพืช (วันหลังปลูก)				
		30	60	90	120	150
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	82.77	83.94	80.44	83.67	83.94
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	84.63	83.27	81.83	82.12	83.27
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	82.68	84.55	91.60	81.65	84.55
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	83.42	84.06	80.06	81.98	84.06
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	80.56	81.30	78.68	80.24	81.30
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	80.14	82.91	80.08	81.40	82.91
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	80.14	82.11	83.65	79.67	82.11
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	81.06	82.71	81.24	80.07	82.71
ไม่มีการขาดน้ำ		85.84	85.19	83.89	84.53	85.19
ค่าเฉลี่ย		82.35	83.33	82.38	81.70	83.33
LSD (0.05) (การขาดน้ำ)		ns	2.23	5.79	2.57	2.23
CV (%) (การขาดน้ำ)		2.26	1.55	4.06	1.82	1.55

ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

### ลักษณะการเจริญเติบโตทางลำต้นและผลผลิต

#### ความยาวของลำต้นหลักของผักคาวตอง

ความยาวของลำต้นหลักของผักคาวตอง (ตารางที่ 6) มีค่าเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นและมีค่าสูงสุดเมื่อผักคาวตองมีอายุ 150 วันหลังปลูก ส่วนการขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกันพบว่าผักคาวตองขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน มีค่าของความยาวของลำต้นหลักมากกว่าผักคาวตองขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน ส่วนการขาดน้ำที่อายุแตกต่างกันของการเจริญเติบโตพบว่า การขาดน้ำในช่วงแรกของการเจริญเติบโตผักคาวตองมีความยาวของลำต้นหลักมีค่าน้อยที่สุด ความยาวของลำต้นหลักของผักคาวตองมีค่าเพิ่มมากขึ้น เมื่อผักคาวตองได้รับการขาดน้ำที่อายุเพิ่มมากขึ้น ส่วนผักคาวตองที่ไม่ได้รับการขาดน้ำมีความยาวของลำต้นหลักมีค่ามากที่สุด ความยาวของลำต้นหลักผักคาวตองเมื่อได้รับการขาดน้ำเป็นเวลานานที่แตกต่างกันและระยะเวลาของการขาดน้ำแตกต่างกัน ไม่มีผลทำให้ความยาวของลำต้นมีค่าแตกต่างกันในทางสถิติ

ตารางที่ 6 ความยาวของลำต้นหลัก (เซนติเมตร) ของผักกาดทอง เมื่อได้รับการขาดน้ำในช่วงอายุที่แตกต่างกัน และขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกัน

สิ่งทดลอง		อายุพืช (วันหลังปลูก)				
		30	60	90	120	150
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	16.70	22.97	17.66	31.60	33.30
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	17.33	19.80	25.80	29.00	33.16
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	13.70	24.30	26.56	31.60	31.40
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	16.17	20.60	25.40	35.60	27.86
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	14.40	17.83	21.76	28.53	25.03
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	14.73	20.67	19.90	29.10	27.73
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	16.33	21.73	28.13	30.13	27.33
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	13.50	23.17	29.60	29.50	32.70
ไม่มีการขาดน้ำ		13.83	18.60	26.33	28.46	30.23
ค่าเฉลี่ย		15.19	21.07	24.57	30.39	29.86
LSD (0.05) (การขาดน้ำ)		ns	ns	ns	ns	ns
CV (%) (การขาดน้ำ)		17.14	17.81	20.64	15.16	13.37

ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

#### จำนวนข้อของลำต้นผักกาดทอง

จำนวนข้อของลำต้นผักกาดทอง (ตารางที่ 7) มีค่าเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นและมีค่าสูงสุดเมื่อผักกาดทองมีอายุ 150 วันหลังปลูก ส่วนการขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกันพบว่าผักกาดทองขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน มีค่าของจำนวนข้อของลำต้นมีค่ามากกว่าผักกาดทองขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน ส่วนการขาดน้ำที่อายุแตกต่างกันของการเจริญเติบโตพบว่า การขาดน้ำในช่วงแรกของการเจริญเติบโตผักกาดทองมีจำนวนข้อมีค่าน้อยที่สุด จำนวนข้อของผักกาดทองมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อผักกาดทองได้รับการขาดน้ำที่อายุเพิ่มมากขึ้น ส่วนผักกาดทองที่ไม่ได้รับการขาดน้ำมีจำนวนข้อมีค่ามากที่สุด ที่อายุ 150 วันหลังปลูกพบว่า ผักกาดทองขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน มีจำนวนข้อเฉลี่ยมีค่ามากกว่าผักกาดทองที่ได้รับการขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วันมากถึง 5.35 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการขาดน้ำในช่วงอายุที่แตกต่างกันก็พบว่า ผักกาดทองที่ได้รับการขาดน้ำในช่วงแรกของการเจริญเติบโตมีจำนวนข้อของลำต้นมีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 11.50 ข้อต่อต้น เมื่อผักกาดทองได้รับการขาดน้ำที่อายุเพิ่มมากขึ้นเป็น 30, 60 และ 90 วันหลังปลูกก็พบว่า จำนวนข้อมีค่าเพิ่มมากขึ้นเท่ากับ 1.43, 17.39, และ 24.65 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ส่วนผักกาดทองที่ไม่ได้รับการขาดน้ำจำนวนข้อมีค่าสูงสุดเท่ากับ 15.00

ปล้องต่อต้น อย่างไรก็ตามจำนวนของลำต้นฝักคาวตองเมื่อได้รับการขาดน้ำเป็นเวลานานและช่วงเวลาของการขาดน้ำแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อจำนวนข้อที่แตกต่างกันในทางสถิติยกเว้นที่อายุ 60 วันหลังปลูก

**ตารางที่ 7** จำนวนข้อ (ข้อ) ของลำต้นฝักคาวตอง เมื่อได้รับการขาดน้ำในช่วงอายุที่แตกต่างกัน และ ขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกัน

สิ่งทดลอง		อายุพืช (วันหลังปลูก)				
		30	60	90	120	150
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	8.00	8.33	9.00	12.33	11.33
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	6.33	7.00	9.00	10.33	11.67
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	6.67	8.33	9.00	11.67	14.33
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	7.33	9.33	8.67	10.00	14.67
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	7.00	6.00	10.33	9.33	11.67
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	7.67	8.00	8.67	11.33	11.00
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	8.00	10.00	12.33	10.33	12.67
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	6.67	9.33	9.67	13.33	14.00
ไม่มีการขาดน้ำ		8.00	7.00	9.00	10.33	15.00
ค่าเฉลี่ย		7.30	8.15	9.51	11.00	12.92
LSD (0.05) (การขาดน้ำ)		ns	2.38	ns	ns	ns
CV (%) (การขาดน้ำ)		22.13	16.85	23.96	21.61	23.27

ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์

#### น้ำหนักลำต้นสดของฝักคาวตอง

น้ำหนักลำต้นสดของฝักคาวตอง (ตารางที่ 8) มีค่าเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นและมีค่าสูงสุดเมื่อฝักคาวตองมีอายุ 150 วันหลังปลูก ส่วนการขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกันพบว่าฝักคาวตองขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน มีค่าของน้ำหนักลำต้นสดมากกว่าฝักคาวตองขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน แตกต่างกันในทางสถิติ ส่วนการขาดน้ำที่อายุแตกต่างกันของการเจริญเติบโตพบว่า การขาดน้ำในช่วงแรกของการเจริญเติบโตฝักคาวตองมีน้ำหนักลำต้นสดมีค่าน้อยที่สุด น้ำหนักลำต้นสดของฝักคาวตองมีค่าเพิ่มมากขึ้น เมื่อฝักคาวตองได้รับการขาดน้ำที่อายุเพิ่มมากขึ้น ส่วนฝักคาวตองที่ไม่ได้รับการขาดน้ำมีน้ำหนักลำต้นสดมีค่ามากที่สุด ที่อายุ 150 วันหลังปลูกพบว่า ฝักคาวตองขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน มีน้ำหนักลำต้นสดเฉลี่ยมีค่ามากกว่าฝักคาวตองที่ได้รับการขาด

น้ำเป็นเวลานาน 7 วันมากถึง 26.80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการขาดน้ำในช่วงอายุที่แตกต่างกันก็พบว่า ผัก  
 คาวตองที่ได้รับการขาดน้ำในช่วงแรกของการเจริญเติบโตมีน้ำหนักลำต้นสดน้อยที่สุดเท่ากับ 50.58  
 กรัมต่อต้น เมื่อผักคาวตองได้รับการขาดน้ำที่อายุเพิ่มมากขึ้นเป็น 30,60 และ 90 วันหลังปลูกก็พบว่า  
 น้ำหนักลำต้นสดมีค่าเพิ่มมากขึ้นเท่ากับ 8.19 , 19.95 , และ 29.63 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ส่วนผัก  
 คาวตองที่ไม่ได้รับการขาดน้ำมีน้ำหนักลำต้นสดมีค่าสูงสุดเท่ากับ 86.28 กรัมต่อต้น

**ตารางที่ 8** น้ำหนักลำต้นสด (กรัมต่อต้น) ของลำต้นผักคาวตอง เมื่อได้รับการขาดน้ำในช่วงอายุที่  
 แตกต่างกัน และขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกัน

สิ่งทดลอง		อายุพืช (วันหลังปลูก)				
		30	60	90	120	150
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	4.71	16.47	25.75	39.84	59.09
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	7.78	17.35	45.83	48.36	59.92
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	6.18	25.43	48.63	56.21	68.67
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	6.72	24.44	51.16	60.72	71.21
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	4.41	13.55	23.13	30.13	42.06
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	6.32	16.34	30.39	37.27	49.51
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	5.99	23.29	40.18	47.20	52.66
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	6.06	24.98	53.51	56.60	59.91
ไม่มีการขาดน้ำ		6.20	23.87	53.28	66.37	86.28
ค่าเฉลี่ย		6.04	20.64	41.32	49.18	61.03
LSD (0.05) (การขาดน้ำ)		1.80	6.06	8.03	13.05	16.81
CV (%) (การขาดน้ำ)		17.20	16.95	11.22	15.33	15.91

#### น้ำหนักลำต้นแห้งของผักคาวตอง

น้ำหนักลำต้นแห้งของผักคาวตอง (ตารางที่ 9) มีค่าเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นและมี  
 ค่าสูงสุดเมื่อผักคาวตองมีอายุ 150 วันหลังปลูก ส่วนการขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกันพบว่าผัก  
 คาวตองขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน มีค่าของน้ำหนักลำต้นแห้งมากกว่าผักคาวตองขาดน้ำเป็น  
 นาน 7 วัน แตกต่างกันในทางสถิติ ส่วนการขาดน้ำที่อายุแตกต่างกันของการเจริญเติบโตพบว่า  
 การขาดน้ำในช่วงแรกของการเจริญเติบโตผักคาวตองมีน้ำหนักลำต้นแห้งมีค่าน้อยที่สุด น้ำหนักลำ  
 ต้นแห้งของผักคาวตองมีค่าเพิ่มมากขึ้น เมื่อผักคาวตองได้รับการขาดน้ำที่อายุเพิ่มมากขึ้น ส่วนผัก  
 คาวตองที่ไม่ได้รับการขาดน้ำมีน้ำหนักลำต้นแห้งมีค่ามากที่สุด ที่อายุ 150 วันหลังปลูกพบว่า ผัก  
 คาวตองขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน มีน้ำหนักลำต้นแห้งเฉลี่ยมีค่ามากกว่าผักคาวตองที่ได้รับการขาด

น้ำเป็นเวลานาน 7 วันมากถึง 27.86 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการขาดน้ำในช่วงอายุที่แตกต่างกันก็พบว่า ผัก  
 คาวตองที่ได้รับการขาดน้ำในช่วงแรกของการเจริญเติบโตมีน้ำหนักลำต้นแห้งน้อยที่สุดเท่ากับ 6.87  
 กรัมต่อต้น เมื่อผักคาวตองได้รับการขาดน้ำที่อายุเพิ่มมากขึ้นเป็น 30,60 และ 90 วันหลังปลูกก็พบว่า  
 น้ำหนักลำต้นแห้งมีค่าเพิ่มมากขึ้นเท่ากับ 2.77 , 21.78 และ 33.14 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ส่วนผัก  
 คาวตองที่ไม่ได้รับการขาดน้ำมีน้ำหนักลำต้นแห้งมีค่าสูงสุดเท่ากับ 11.23 กรัมต่อต้น

**ตารางที่ 9** น้ำหนักลำต้นแห้ง (กรัมต่อต้น) ของผักคาวตอง เมื่อได้รับการขาดน้ำในช่วงอายุที่  
 แตกต่างกัน และขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกัน

สิ่งทดลอง		อายุพืช (วันหลังปลูก)				
		30	60	90	120	150
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	0.48	1.76	3.52	7.07	7.73
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	0.88	1.88	4.36	7.31	8.05
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	0.70	2.87	5.64	7.63	9.50
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	0.83	2.84	5.88	7.97	9.97
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	0.38	1.37	2.45	5.03	6.00
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	0.75	1.70	3.90	5.42	6.06
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	0.77	2.63	4.46	5.85	7.22
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	0.80	2.49	6.37	7.30	8.31
ไม่มีการขาดน้ำ		0.81	2.35	6.30	8.70	11.23
ค่าเฉลี่ย		0.71	2.21	4.76	6.91	8.22
LSD (0.05) (การขาดน้ำ)		17.06	0.51	1.66	1.52	2.28
CV (%) (การขาดน้ำ)		0.21	13.25	20.10	12.74	16.03

#### น้ำหนักสดของลำต้นใต้ดินของผักคาวตอง

น้ำหนักสดของลำต้นใต้ดินของผักคาวตอง (ตารางที่ 10) มีค่าเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น  
 และมีค่าสูงสุดเมื่อผักคาวตองมีอายุ 150 วันหลังปลูก ส่วนการขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกัน  
 พบว่าผักคาวตองขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน มีค่าของน้ำหนักสดของลำต้นใต้ดินมากกว่าผักคาวตอง  
 ขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนการขาดน้ำที่อายุแตกต่างกันของการ  
 เจริญเติบโตพบว่า การขาดน้ำในช่วงแรกของการเจริญเติบโตผักคาวตองมีน้ำหนักสดของลำต้นใต้  
 ดินมีค่าน้อยที่สุด น้ำหนักสดของลำต้นใต้ดินของผักคาวตองมีค่าเพิ่มมากขึ้น เมื่อผักคาวตองได้รับ  
 การขาดน้ำที่อายุเพิ่มมากขึ้น ส่วนผักคาวตองที่ไม่ได้รับการขาดน้ำมีน้ำหนักสดของลำต้นใต้ดินมีค่า

มากที่สุด ที่อายุ 150 วันหลังปลูกพบว่า ผักคาวตองขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน มีน้ำหนักสดของลำต้นใต้ดินเฉลี่ยมีค่ามากกว่าผักคาวตองที่ได้รับการขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วันมากถึง 9.80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการขาดน้ำในช่วงอายุที่แตกต่างกันก็พบว่า ผักคาวตองที่ได้รับการขาดน้ำในช่วงแรกของการเจริญเติบโตมีน้ำหนักสดของลำต้นใต้ดินน้อยที่สุดเท่ากับ 190.22 กรัมต่อต้น เมื่อผักคาวตองได้รับการขาดน้ำที่อายุเพิ่มมากขึ้นเป็น 30,60 และ 90 วันหลังปลูกก็พบว่า น้ำหนักสดของลำต้นใต้ดินมีค่าเพิ่มมากขึ้นเท่ากับ 31.30 , 14.59 , และ 14.68 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ส่วนผักคาวตองที่ไม่ได้รับการขาดน้ำมีน้ำหนักสดของลำต้นใต้ดินมีค่าสูงสุดเท่ากับ 275.48 กรัมต่อต้น

**ตารางที่ 10** น้ำหนักสดของลำต้นใต้ดิน (กรัมต่อต้น) ของผักคาวตอง เมื่อได้รับการขาดน้ำในช่วงอายุที่แตกต่างกัน และขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกัน

สิ่งทดลอง	อายุพืช (วันหลังปลูก)					
	30	60	90	120	150	
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	18.49	51.60	98.85	156.72	205.64
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	30.84	44.21	120.19	164.53	264.36
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	25.93	64.89	134.91	143.22	224.78
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	27.46	66.33	131.25	183.74	222.22
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	16.56	39.31	87.82	113.84	174.80
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	27.53	40.56	100.80	142.27	235.14
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	27.91	57.93	129.03	148.95	211.16
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	27.07	61.34	145.58	166.89	214.05
ไม่มีการขาดน้ำ	26.63	66.61	140.62	219.89	275.48	
ค่าเฉลี่ย	25.38	54.75	121.00	160.00	225.29	
LSD (0.05) (การขาดน้ำ)	5.17	15.42	32.74	54.65	42.74	
CV (%) (การขาดน้ำ)	11.77	16.27	15.63	19.73	10.96	

#### น้ำหนักแห้งของลำต้นใต้ดินของผักคาวตอง

น้ำหนักแห้งของลำต้นใต้ดินของผักคาวตอง (ตารางที่ 11) มีค่าเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นและมีค่าสูงสุดเมื่อผักคาวตองมีอายุ 150 วันหลังปลูก ส่วนการขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกันพบว่าผักคาวตองขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน มีค่าของน้ำหนักแห้งของลำต้นใต้ดินมากกว่าผักคาวตองขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน แตกต่างกันในทางสถิติ ส่วนการขาดน้ำที่อายุแตกต่างกันของการเจริญเติบโตพบว่า การขาดน้ำในช่วงแรกของการเจริญเติบโตผักคาวตองมีน้ำหนักแห้งของลำ

ต้นใต้ดินมีค่าน้อยที่สุด น้ำหนักแห้งของลำต้นใต้ดินของผักกวางตุ้งมีค่าเพิ่มมากขึ้น เมื่อผักกวางตุ้งได้รับการขาดน้ำที่อายุเพิ่มมากขึ้น ส่วนผักกวางตุ้งที่ไม่ได้รับการขาดน้ำมีน้ำหนักแห้งของลำต้นใต้ดินมีค่ามากที่สุด ที่อายุ 150 วันหลังปลูกพบว่า ผักกวางตุ้งขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน มีน้ำหนักแห้งของลำต้นใต้ดินเฉลี่ยมีค่ามากกว่าผักกวางตุ้งที่ได้รับการขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วันมากถึง 7.97 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการขาดน้ำในช่วงอายุที่แตกต่างกันก็พบว่า ผักกวางตุ้งที่ได้รับการขาดน้ำในช่วงแรกของการเจริญเติบโตมีน้ำหนักแห้งของลำต้นใต้ดินน้อยที่สุดเท่ากับ 36.11 กรัมต่อต้น เมื่อผักกวางตุ้งได้รับการขาดน้ำที่อายุเพิ่มมากขึ้นเป็น 30,60 และ 90 วันหลังปลูกก็พบว่า น้ำหนักแห้งของลำต้นใต้ดินมีค่าเพิ่มมากขึ้นเท่ากับ 29.66 , 15.33 , และ 16.08 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ส่วนผักกวางตุ้งที่ไม่ได้รับการขาดน้ำมีน้ำหนักแห้งของลำต้นใต้ดินมีค่าสูงสุดเท่ากับ 50.36 กรัมต่อต้น

ตารางที่ 11 น้ำหนักแห้งของลำต้นใต้ดิน (กรัมต่อต้น) ของผักกวางตุ้ง เมื่อได้รับการขาดน้ำในช่วงอายุที่แตกต่างกัน และขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกัน

สิ่งทดลอง		อายุพืช (วันหลังปลูก)				
		30	60	90	120	150
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	2.62	7.26	14.69	33.26	37.32
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	3.59	6.71	20.10	34.97	49.95
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	3.33	8.22	18.59	33.24	41.78
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	3.51	8.85	21.14	33.64	43.81
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	2.17	5.98	13.25	30.05	34.90
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	3.39	6.35	17.30	31.77	43.69
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	3.58	8.05	17.51	31.20	41.51
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	3.30	8.29	20.74	28.03	40.02
ไม่มีการขาดน้ำ		3.89	8.95	21.18	44.05	50.36
ค่าเฉลี่ย		3.26	7.63	18.27	33.35	42.59
LSD (0.05) (การขาดน้ำ)		0.83	1.74	4.44	6.32	6.41
CV (%) (การขาดน้ำ)		14.76	13.19	14.05	10.95	8.69

#### น้ำหนักใบสดของผักกวางตุ้ง

น้ำหนักใบสดของผักกวางตุ้ง (ตารางที่ 12) มีค่าเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นและมีค่าสูงสุดเมื่อผักกวางตุ้งมีอายุ 150 วันหลังปลูก ส่วนการขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกันพบว่าผักกวางตุ้งขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน มีค่าของน้ำหนักใบสดมากกว่าผักกวางตุ้งขาดน้ำเป็นเวลานาน 7

วัน แตกต่างกันในทางสถิติ ส่วนการขาดน้ำที่อายุแตกต่างกันของการเจริญเติบโตพบว่า การขาดน้ำในช่วงแรกของการเจริญเติบโตผักกาดทองมีน้ำหนักใบสดมีค่าน้อยที่สุด น้ำหนักใบสดของผักกาดทองมีค่าเพิ่มมากขึ้น เมื่อผักกาดทองได้รับการขาดน้ำที่อายุเพิ่มมากขึ้น ส่วนผักกาดทองที่ไม่ได้รับการขาดน้ำมีน้ำหนักใบสดมีค่ามากที่สุด ที่อายุ 150 วันหลังปลูกพบว่า ผักกาดทองขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน มีน้ำหนักใบสดเฉลี่ยมีค่ามากกว่าผักกาดทองที่ได้รับการขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วันมากถึง 24.24 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการขาดน้ำในช่วงอายุที่แตกต่างก็พบว่า ผักกาดทองที่ได้รับการขาดน้ำในช่วงแรกของการเจริญเติบโตมีน้ำหนักใบสดน้อยที่สุดเท่ากับ 66.95 กรัมต่อต้น เมื่อผักกาดทองได้รับการขาดน้ำที่อายุเพิ่มมากขึ้นเป็น 30, 60 และ 90 วันหลังปลูกก็พบว่า น้ำหนักใบสดมีค่าเพิ่มมากขึ้นเท่ากับ 17.20 , 21.77 , และ 32.52 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ส่วนผักกาดทองที่ไม่ได้รับการขาดน้ำมีน้ำหนักใบสดมีค่าสูงสุดเท่ากับ 103.36 กรัมต่อต้น

ตารางที่ 12 น้ำหนักใบสด (กรัมต่อต้น) ของผักกาดทอง เมื่อได้รับการขาดน้ำในช่วงอายุที่ต่างกั น และขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกัน

สิ่งทดลอง		อายุพืช (วันหลังปลูก)				
		30	60	90	120	150
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	16.88	28.17	54.18	76.50	81.14
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	20.35	32.84	66.52	81.20	84.94
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	19.49	44.72	70.25	82.80	88.89
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	22.36	48.89	82.05	88.47	94.81
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	13.52	25.34	37.24	49.24	52.76
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	19.60	28.58	47.90	51.23	71.99
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	21.42	43.14	55.71	65.66	74.16
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	22.91	47.24	77.05	79.79	82.63
ไม่มีการขาดน้ำ		22.73	48.98	86.98	92.98	103.36
ค่าเฉลี่ย		20.18	38.58	64.28	74.21	81.63
LSD (0.05) (การขาดน้ำ)		ns	14.39	14.46	11.63	17.30
CV (%) (การขาดน้ำ)		19.45	21.54	12.99	9.05	12.25

ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

### น้ำหนักใบแห้งของฝักคาวตอง

น้ำหนักใบแห้งของฝักคาวตอง (ตารางที่ 13 ) มีค่าเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นและมีค่าสูงสุดเมื่อฝักคาวตองมีอายุ 150 วันหลังปลูก ส่วนการขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกันพบว่าฝักคาวตองขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน มีค่าของน้ำหนักใบแห้งมากกว่าฝักคาวตองขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน แตกต่างกันในทางสถิติ ส่วนการขาดน้ำที่อายุแตกต่างกันของการเจริญเติบโตพบว่า การขาดน้ำในช่วงแรกของการเจริญเติบโตฝักคาวตองมีน้ำหนักใบแห้งมีค่าน้อยที่สุด น้ำหนักใบแห้งของฝักคาวตองมีค่าเพิ่มมากขึ้น เมื่อฝักคาวตองได้รับการขาดน้ำที่อายุเพิ่มมากขึ้น ส่วนฝักคาวตองที่ไม่ได้รับการขาดน้ำมีน้ำหนักใบแห้งมีค่ามากที่สุด ที่อายุ 150 วันหลังปลูกพบว่า ฝักคาวตองขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน มีน้ำหนักใบแห้งเฉลี่ยมีค่ามากกว่าฝักคาวตองที่ได้รับการขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน มากถึง 17.17 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการขาดน้ำในช่วงอายุที่แตกต่างก็พบว่า ฝักคาวตองที่ได้รับการขาดน้ำในช่วงแรกของการเจริญเติบโตมีน้ำหนักใบแห้งมีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 12.85 กรัมต่อต้น เมื่อฝักคาวตองได้รับการขาดน้ำที่อายุเพิ่มมากขึ้นเป็น 30,60 และ 90 วันหลังปลูกก็พบว่า น้ำหนักใบแห้งมีค่าเพิ่มมากขึ้นเท่ากับ 11.20 , 13.22 และ 34.11 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ส่วนฝักคาวตองที่ไม่ได้รับการขาดน้ำมีน้ำหนักใบแห้งมีค่าสูงสุดเท่ากับ 18.53 กรัมต่อต้น

ตารางที่ 13 น้ำหนักใบแห้ง (กรัมต่อต้น) ของฝักคาวตอง เมื่อได้รับการขาดน้ำในช่วงอายุที่แตกต่างกัน และขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกัน

สิ่งทดลอง		อายุพืช (วันหลังปลูก)				
		30	60	90	120	150
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	2.33	4.47	9.39	13.58	14.14
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	3.29	4.71	10.43	15.29	15.44
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	2.98	5.92	12.89	14.80	15.85
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	3.22	6.29	13.32	16.82	18.17
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	1.80	3.64	6.08	10.99	11.57
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	3.02	3.86	8.34	12.80	13.15
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	3.12	6.02	10.93	13.37	13.26
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	3.36	5.79	13.90	15.46	16.31
ไม่มีการขาดน้ำ		3.28	5.21	14.05	17.17	18.53
ค่าเฉลี่ย		2.93	5.10	11.04	14.48	15.14
LSD (0.05) (การขาดน้ำ)		0.86	1.42	2.22	3.61	2.47
CV (%) (การขาดน้ำ)		16.88	16.07	11.66	14.42	9.42

### พื้นที่ใบของฝักข้าวตอง

พื้นที่ใบของฝักข้าวตอง (ตารางที่ 14) มีค่าเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นและมีค่าสูงสุดเมื่อฝักข้าวตองมีอายุ 150 วันหลังปลูก ส่วนการขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกันพบว่าฝักข้าวตองขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน มีค่าของพื้นที่ใบมากกว่าฝักข้าวตองขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน แตกต่างกันในทางสถิติ ส่วนการขาดน้ำที่อายุแตกต่างกันของการเจริญเติบโตพบว่า การขาดน้ำในช่วงแรกของการเจริญเติบโตฝักข้าวตองมีพื้นที่ใบมีค่าน้อยที่สุด พื้นที่ใบของฝักข้าวตองมีค่าเพิ่มมากขึ้น เมื่อฝักข้าวตองได้รับการขาดน้ำที่อายุเพิ่มมากขึ้น ส่วนฝักข้าวตองที่ไม่ได้รับการขาดน้ำมีพื้นที่ใบมีค่ามากที่สุด ที่อายุ 150 วันหลังปลูกพบว่า ฝักข้าวตองขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน มีพื้นที่ใบเฉลี่ยมีค่ามากกว่าฝักข้าวตองที่ได้รับการขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วันมากถึง 15.44 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการขาดน้ำในช่วงอายุที่แตกต่างกันก็พบว่า ฝักข้าวตองที่ได้รับการขาดน้ำในช่วงแรกของการเจริญเติบโตมีพื้นที่ใบน้อยที่สุดเท่ากับ 2737.74 ตารางเซนติเมตร เมื่อฝักข้าวตองได้รับการขาดน้ำที่อายุเพิ่มมากขึ้นเป็น 30,60 และ 90 วันหลังปลูกก็พบว่า พื้นที่ใบมีค่าเพิ่มมากขึ้นเท่ากับ 18.00 , 20.56 และ 28.06 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ส่วนฝักข้าวตองที่ไม่ได้รับการขาดน้ำมีพื้นที่ใบมีค่าสูงสุดเท่ากับ 3,980.88 ตารางเซนติเมตร

ตารางที่ 14 พื้นที่ใบ (ตารางเซนติเมตร) ของฝักข้าวตอง เมื่อได้รับการขาดน้ำในช่วงอายุที่แตกต่างกัน และขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกัน

สิ่งทดลอง		อายุพืช (วันหลังปลูก)				
		30	60	90	120	150
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	431.07	808.37	1,428.80	2,506.95	3,167.37
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	592.33	907.61	1,831.26	2,904.32	3,370.49
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	559.52	1,402.91	2,222.68	3,026.66	3,485.34
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	584.93	1,544.82	2,576.12	3,102.27	3,667.98
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	328.33	781.39	1,142.10	1,730.77	2,308.10
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	586.66	837.26	1,636.19	2,064.25	3,090.65
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	578.22	1,320.37	1,846.17	2,406.76	3,116.00
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	500.59	1,232.03	2,386.91	2,591.58	3,344.05
ไม่มีการขาดน้ำ		562.81	1,210.38	2,729.45	3,505.15	3,980.88
ค่าเฉลี่ย		524.94	1116.13	1977.74	2648.74	3281.21
LSD (0.05) (การขาดน้ำ)		126.89	330.34	601.54	715.42	726.01
CV (%) (การขาดน้ำ)		13.96	17.10	17.57	15.60	12.78

### น้ำหนักรกสดของฝักคาวตอง

น้ำหนักรกสดของฝักคาวตอง (ตารางที่ 15) มีค่าเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นและมีค่าสูงสุดเมื่อฝักคาวตองมีอายุ 150 วันหลังปลูก ส่วนการขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกันพบว่าฝักคาวตองขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน มีค่าของน้ำหนักรกสดมากกว่าฝักคาวตองขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน แตกต่างกันในทางสถิติ ส่วนการขาดน้ำที่อายุแตกต่างกันของการเจริญเติบโตพบว่า การขาดน้ำในช่วงแรกของการเจริญเติบโตฝักคาวตองมีน้ำหนักรกสดมีค่าน้อยที่สุด น้ำหนักรกสดของฝักคาวตองมีค่าเพิ่มมากขึ้น เมื่อฝักคาวตองได้รับการขาดน้ำที่อายุเพิ่มมากขึ้น ส่วนฝักคาวตองที่ไม่ได้รับการขาดน้ำมีน้ำหนักรกสดมีค่ามากที่สุด ที่อายุ 150 วันหลังปลูกพบว่า ฝักคาวตองขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน มีน้ำหนักรกสดเฉลี่ยมีค่ามากกว่าฝักคาวตองที่ได้รับการขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน มากถึง 25.09 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการขาดน้ำในช่วงอายุที่แตกต่างก็พบว่า ฝักคาวตองที่ได้รับการขาดน้ำในช่วงแรกของการเจริญเติบโตมีน้ำหนักรกสดน้อยที่สุดเท่ากับ 8.34 กรัมต่อต้น เมื่อฝักคาวตองได้รับการขาดน้ำที่อายุเพิ่มมากขึ้นเป็น 30,60 และ 90 วันหลังปลูกก็พบว่า น้ำหนักรกสดมีค่าเพิ่มมากขึ้นเท่ากับ 43.50 , 72.26 , และ 77.53 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ส่วนฝักคาวตองที่ไม่ได้รับการขาดน้ำมีน้ำหนักรกสดมีค่าสูงสุดเท่ากับ 19.25 กรัมต่อต้น

ตารางที่ 15 น้ำหนักรกสด (กรัมต่อต้น) ของฝักคาวตอง เมื่อได้รับการขาดน้ำในช่วงอายุที่แตกต่างกัน และขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกัน

สิ่งทดลอง	อายุพืช (วันหลังปลูก)	อายุพืช (วันหลังปลูก)				
		30	60	90	120	150
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	2.03	4.22	5.91	8.15	9.26
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	2.83	4.29	5.48	9.35	13.07
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	2.91	5.78	6.63	10.75	17.38
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	3.30	6.01	7.84	10.64	15.31
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	1.10	3.15	4.21	7.01	7.43
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	3.06	3.46	4.39	7.68	10.88
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	3.14	5.83	5.86	8.24	11.37
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	2.76	6.41	7.43	9.73	14.32
ไม่มีการขาดน้ำ		2.95	6.16	7.92	17.33	19.25
ค่าเฉลี่ย		2.67	5.03	6.18	9.87	13.14
LSD (0.05) (การขาดน้ำ)		1.25	1.60	1.93	3.21	5.59
CV (%) (การขาดน้ำ)		27.03	18.38	18.06	18.81	24.61

### น้ำหนักรากแห้งของผักคาวตอง

น้ำหนักรากแห้งของผักคาวตอง (ตารางที่ 16) มีค่าเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นและมีค่าสูงสุดเมื่อผักคาวตองมีอายุ 150 วันหลังปลูก ส่วนการขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกันพบว่าผักคาวตองขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน มีค่าของน้ำหนักรากแห้งมากกว่าผักคาวตองขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน แตกต่างกันในทางสถิติ ส่วนการขาดน้ำที่อายุแตกต่างกันของการเจริญเติบโตพบว่า การขาดน้ำในช่วงแรกของการเจริญเติบโตผักคาวตองมีน้ำหนักรากแห้งมีค่าน้อยที่สุด น้ำหนักรากแห้งของผักคาวตองมีค่าเพิ่มมากขึ้น เมื่อผักคาวตองได้รับการขาดน้ำที่อายุเพิ่มมากขึ้น ส่วนผักคาวตองที่ไม่ได้รับการขาดน้ำมีน้ำหนักรากแห้งมีค่ามากที่สุด ที่อายุ 150 วันหลังปลูกพบว่า ผักคาวตองขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน มีน้ำหนักรากแห้งเฉลี่ยมีค่ามากกว่าผักคาวตองที่ได้รับการขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วันมากถึง 20.74 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการขาดน้ำในช่วงอายุที่แตกต่างกันก็พบว่า ผักคาวตองที่ได้รับการขาดน้ำในช่วงแรกของการเจริญเติบโตมีน้ำหนักรากแห้งมีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 2.12 กรัมต่อต้น เมื่อผักคาวตองได้รับการขาดน้ำที่อายุเพิ่มมากขึ้นเป็น 30, 60 และ 90 วันหลังปลูกก็พบว่า น้ำหนักรากแห้งมีค่าเพิ่มมากขึ้นเท่ากับ 59.34 , 62.17 และ 42.79 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ส่วนผักคาวตองที่ไม่ได้รับการขาดน้ำมีน้ำหนักรากแห้งมีค่าสูงสุดเท่ากับ 3.68 กรัมต่อต้น

ตารางที่ 16 น้ำหนักรากแห้ง (กรัมต่อต้น) ของผักคาวตอง เมื่อได้รับการขาดน้ำในช่วงอายุที่แตกต่างกัน และขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกัน

สิ่งทดลอง	อายุพืช (วันหลังปลูก)	อายุพืช (วันหลังปลูก)				
		30	60	90	120	150
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	0.50	0.86	0.92	1.72	2.55
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	0.78	0.93	1.13	2.75	3.63
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	0.74	1.48	1.39	2.03	3.57
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	0.66	1.29	1.41	2.38	3.30
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	0.30	0.61	0.73	1.30	1.68
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	0.74	0.80	0.92	1.83	3.11
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	0.61	1.24	1.10	1.78	3.29
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	0.75	1.00	1.45	1.90	2.74
ไม่มีการขาดน้ำ		0.75	1.17	1.58	2.48	3.68
ค่าเฉลี่ย		0.64	1.04	1.18	2.01	3.06
LSD (0.05) (การขาดน้ำ)		ns	0.36	0.54	0.69	0.84
CV (%) (การขาดน้ำ)		29.25	19.94	26.61	19.85	15.98

ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

### อัตราการเจริญเติบโตของผักกาดทอง

อัตราการเจริญเติบโตของผักกาดทอง (ตารางที่ 17) มีค่าเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ผักกาดทองมีอายุ 0-60 วันหลังปลูกและมีค่าสูงสุด เมื่อผักกาดทองมีอายุ 60-90 วันหลังปลูก และหลังจากนั้นอัตราการเจริญเติบโตของผักกาดทองก็มีค่าลดลงในช่วงอายุ 120-150 วันหลังปลูก อัตราการเจริญเติบโตของผักกาดทองเมื่อได้รับการขานน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกันและการขานน้ำในช่วงอายุแตกต่างกันไม่มีผลทำให้อัตราการเจริญเติบโตแตกต่างกันในทางสถิติยกเว้นผักกาดทองที่อายุช่วง 60-90 และ 90-120 วันหลังปลูกตามลำดับ

ตารางที่ 17 อัตราการเจริญเติบโต (กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน) ของผักกาดทอง เมื่อได้รับการขานน้ำในช่วงอายุที่แตกต่างกันและขานน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกัน

สิ่งทดลอง	อายุพืช (วันหลังปลูก)	อายุพืช (วันหลังปลูก)				
		0-30	30-60	60-90	90-120	120-150
การขานน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน	ขานน้ำที่อายุ 15 วัน	0.25	0.24	0.80	0.84	0.35
	ขานน้ำที่อายุ 30 วัน	0.29	0.24	0.89	0.60	0.62
	ขานน้ำที่อายุ 60 วัน	0.26	0.38	0.58	0.80	0.63
	ขานน้ำที่อายุ 90 วัน	0.29	0.31	0.91	0.66	0.41
การขานน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน	ขานน้ำที่อายุ 15 วัน	0.21	0.20	0.91	0.63	0.43
	ขานน้ำที่อายุ 30 วัน	0.26	0.21	0.90	0.53	0.51
	ขานน้ำที่อายุ 60 วัน	0.26	0.34	0.46	0.83	0.56
	ขานน้ำที่อายุ 90 วัน	0.23	0.36	0.94	0.39	0.63
ไม่มีการขานน้ำ		0.29	0.34	0.93	0.80	0.64
ค่าเฉลี่ย		0.26	0.29	0.81	0.67	0.53
LSD (0.05) (การขานน้ำ)		ns	ns	0.22	0.22	ns
CV (%) (การขานน้ำ)		17.82	31.09	15.82	19.24	28.43

ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

### น้ำหนักแห้งรวม (กรัมต่อต้น) ของผักกาดทอง

น้ำหนักแห้งรวม (กรัมต่อต้น) ของผักกาดทอง (ตารางที่ 18) พบว่าผักกาดทองที่ขานน้ำเป็นเวลา 7 วัน มีน้ำหนักแห้งรวมน้อยกว่าผักกาดทองที่ขานน้ำเป็นเวลา 3 วัน ผักกาดทองที่ไม่มีการขานน้ำมีน้ำหนักแห้งรวมเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 79.79 กรัมต่อต้น การขานน้ำในช่วงอายุแตกต่างกันพบว่า ผัก

ควาดองที่ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน เป็นเวลานาน 7 วัน มีน้ำหนักแห้งรวมเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 63.14 กรัม ต่อต้น

**ตารางที่ 18** น้ำหนักแห้งรวม (กรัมต่อต้น) ของผักควาดอง เมื่อได้รับการขาดน้ำในช่วงอายุที่แตกต่างกัน และขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกัน

สิ่งทดลอง		อายุพืช (วันหลังปลูก)				
		30	60	90	120	150
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	6.51	12.99	34.27	56.57	65.85
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	7.63	14.08	37.61	53.57	70.11
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	6.93	17.02	32.38	53.69	70.47
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	7.78	16.08	40.34	57.76	68.62
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	5.58	11.00	35.11	51.73	63.14
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	6.97	12.52	36.49	50.66	64.24
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	6.99	16.03	28.32	50.42	65.33
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	6.10	15.71	40.69	51.16	67.79
ไม่มีการขาดน้ำ		7.78	16.78	41.59	62.79	79.79
ค่าเฉลี่ย		6.92	14.69	36.31	54.26	68.37
LSD (0.05) (การขาดน้ำ)		ns	3.08	5.36	5.46	6.05
CV (%) (การขาดน้ำ)		17.76	12.12	8.53	5.81	5.11

ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

#### ผลผลิตน้ำหนักแห้งของผักควาดอง

ผลิตน้ำหนักแห้ง (กรัมต่อต้น) ของผักควาดอง (ตารางที่ 19 ) พบว่าผักควาดองที่ขาดน้ำเป็นเวลา 7 วัน มีผลผลิตน้ำหนักแห้งน้อยกว่าผักควาดองที่ขาดน้ำเป็นเวลา 3 วัน ผักควาดองที่ไม่มีการขาดน้ำมีผลผลิตแห้งเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 70.61 กรัมต่อต้น การขาดน้ำในช่วงอายุแตกต่างกันพบว่า ผักควาดองที่ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน มีผลผลิตน้ำหนักแห้งเฉลี่ยต่ำสุด รองลงมาคือ ผักควาดองที่ขาดน้ำที่อายุ 30,60 และ 90 วันตามลำดับ

#### ดัชนีการเก็บเกี่ยวของผักควาดอง

ดัชนีการเก็บเกี่ยวของผักควาดอง (ตารางที่ 19 ) พบว่าการน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกันและขาดน้ำในช่วงอายุแตกต่างกันไม่มีผลทำให้ดัชนีการเก็บเกี่ยวมีค่าแตกต่างกัน

ตารางที่ 19 ผลผลิตน้ำหนักรากแห้งและดัชนีการเก็บเกี่ยวและประสิทธิภาพการใช้น้ำของฝักควาตอง  
เมื่อปลูกโดยมีการขาดน้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน

สิ่งทดลอง	ผลผลิต น้ำหนักรากแห้ง (กรัม/ต้น)	ดัชนี เก็บเกี่ยว	ประสิทธิภาพการ ใช้น้ำ (กรัมต่อ ตารางเมตรต่อ มิลลิเมตร)	
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	58.27	0.24	0.0372
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	62.04	0.21	0.0397
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	62.36	0.22	0.0399
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	60.73	0.26	0.0388
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	55.87	0.25	0.0365
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	56.85	0.20	0.0372
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	57.81	0.20	0.0378
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	59.99	0.25	0.0392
ไม่มีการขาดน้ำ	70.61	0.23	0.0444	
ค่าเฉลี่ย	60.50	0.23	3.89	
LSD (0.05) (การขาดน้ำ)	6.22	ns	3.17	
CV (%) (การขาดน้ำ)	5.94	15.87	4.71	

ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

#### ปริมาณน้ำที่ฝักควาตองได้รับ

ฝักควาตองได้รับน้ำตลอดอายุการเจริญเติบโตและไม่มีการขาดน้ำ (ตารางที่ 20) รวมทั้งปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงเวลาทำการทดลองรวมทั้งหมด 1,798 มิลลิเมตร ส่วนการขาดน้ำในแต่ละช่วงอายุการเจริญเติบโตฝักควาตองขาดน้ำเป็นเวลา 3 วัน ได้รับน้ำรวมทั้งหมด 1,768 มิลลิเมตร และฝักควาตองที่ขาดน้ำเป็นเวลา 7 วันได้รับน้ำรวมทั้งหมด 1,728 มิลลิเมตร

#### ประสิทธิภาพการใช้น้ำของฝักควาตอง

ประสิทธิภาพการใช้น้ำของฝักควาตอง (ตารางที่ 19) พบว่าฝักควาตองที่ขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน มีค่าประสิทธิภาพการใช้น้ำต่ำสุด รองลงมาคือขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน ส่วนฝักควาตองที่ไม่ขาดน้ำ มีประสิทธิภาพการใช้น้ำมีค่าสูงสุด สำหรับการขาดน้ำที่อายุแตกต่างกันฝัก

ควาดองที่ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน มีค่าประสิทธิภาพการใช้น้ำต่ำสุด การขาดน้ำที่อายุเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการใช้น้ำของผักควาดองก็มีค่าเพิ่มขึ้น และมีค่าสูงสุดที่ผักควาดองไม่ขาดน้ำ

ตารางที่ 20 ปริมาณน้ำ (มิลลิเมตร) ของผักควาดอง ที่ได้รับน้ำตลอดอายุการเจริญเติบโต

สิ่งทดลอง	ปริมาณน้ำที่ให้ (มิลลิเมตร)	ปริมาณน้ำฝน (มิลลิเมตร)	รวม (มิลลิเมตร)	
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	1,470	298	1,768
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	1,470	298	1,768
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	1,470	298	1,768
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	1,470	298	1,768
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	1,430	298	1,728
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	1,430	298	1,728
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	1,430	298	1,728
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	1,430	298	1,728
ไม่มีการขาดน้ำ	1,500	298	1,798	

### ปริมาณสารฟลาโวนอยด์

ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ คือ สารเคอเวอซิทินในผักควาดองช่วงเก็บเกี่ยว ( ตารางที่ 21 ) พบว่า การขาดน้ำมีผลทำให้สารเคอเวอซิทินมีค่าลดลง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับผักควาดองที่ไม่ขาดน้ำ การขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน มีสารเคอเวอซิทินมากกว่าการขาดน้ำเป็นเวลา 7 วัน ส่วนผักควาดองที่ไม่ได้รับการขาดน้ำมีสารเคอเวอซิทินสูงสุดเท่ากับ 0.78 เปอร์เซ็นต์ สำหรับการขาดน้ำในช่วงอายุแตกต่างกัน พบว่าการขาดน้ำที่อายุ 15 วันหลังปลูก มีสารเคอเวอซิทินสูงสุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.57 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าลดลงเมื่อขาดน้ำที่อายุ 90, 60 และ 30 วัน โดยมีสารเคอเวอซิทินเท่ากับ 0.45, 0.42, 0.31 ตามลำดับ

ตารางที่ 21 ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ของผักคาวตองเมื่อปลูกโดยมีการขาดน้ำในช่วงเวลาและปริมาณที่แตกต่างกัน

สิ่งทดลอง		ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ (%)
		Quercitrin
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	0.63
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	0.52
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	0.60
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	0.53
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	0.50
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	0.31
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	0.42
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	0.45
ไม่มีการขาดน้ำ		0.78
ค่าเฉลี่ย		0.52
LSD (0.05) (การขาดน้ำ)		0.14
CV (%) (การขาดน้ำ)		11.82

#### ปริมาณความชื้นในดิน

ปริมาณความชื้นในดิน (เปอร์เซ็นต์) (ตารางที่ 22) ในแปลงปลูกของผักคาวตอง พบว่าผักคาวตองที่ได้รับการขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกันและขาดน้ำที่อายุแตกต่างกันไม่มีผลทำให้ปริมาณความชื้นในดินในแปลงปลูกมีค่าแตกต่างกันในทางสถิติยกเว้น ผักคาวตองที่อายุ 150 วัน หลังปลูก

ตารางที่ 22 ปริมาณความชื้นในดิน (เปอร์เซ็นต์) ในแปลงปลูกของผักกวางตุ้ง เมื่อได้รับการขาดน้ำ ในช่วงอายุที่แตกต่างกัน และขาดน้ำเป็นเวลานานแตกต่างกัน

สิ่งทดลอง		อายุพืช (วันหลังปลูก)				
		30	60	90	120	150
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	23.79	23.51	24.94	35.29	34.47
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	26.34	25.06	25.14	29.16	34.38
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	25.10	25.96	23.45	30.44	36.53
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	26.37	27.14	24.88	32.62	30.90
การขาดน้ำเป็นเวลานาน 7 วัน	ขาดน้ำที่อายุ 15 วัน	20.39	20.48	21.93	33.29	30.59
	ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน	24.49	22.21	23.23	27.68	29.79
	ขาดน้ำที่อายุ 60 วัน	25.06	26.82	21.62	31.82	32.46
	ขาดน้ำที่อายุ 90 วัน	22.61	28.66	23.77	30.20	35.66
ไม่มีการขาดน้ำ		25.75	27.24	23.94	33.12	35.31
ค่าเฉลี่ย		24.43	25.23	23.65	31.51	33.34
LSD (0.05) (การขาดน้ำ)		ns	ns	ns	ns	1.69
CV (%) (การขาดน้ำ)		7.94	12.42	18.75	12.92	2.20

ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

## วิจารณ์ผลการทดลอง

ผักคาวตองเป็นพืชที่ต้องการน้ำในการเจริญเติบโตทางลำต้นมาก ผักคาวตองเจริญเติบโตได้ดีในที่บริเวณที่มีความชุ่มชื้นในดินสูง ประนม (2530) และ สุรินทร์ (2543) รายงานว่า ในการปลูกผักคาวตองที่จะให้ผลผลิตดี ควรมีการให้น้ำอย่างเพียงพอ ผักคาวตองจะมีการเจริญเติบโตทางลำต้นมากและให้ผลผลิตสูง อย่างไรก็ตามจากการศึกษาถึงการขาดน้ำของผักคาวตองผลจากการศึกษาในครั้งนี้ก็พบว่า ผักคาวตองเมื่อได้รับการขาดน้ำในแต่ละช่วงอายุการเจริญเติบโตและมีการขาดน้ำเป็นเวลานานที่แตกต่างกัน มีผลทำให้การเจริญเติบโตทางลำต้น โดยเฉพาะการสะสมน้ำหนักแห้ง ใบแห้ง พื้นที่ใบ และน้ำหนักรากแห้งมีค่าลดลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผักคาวตองที่ได้รับน้ำอย่างเพียงพอตลอดอายุการเจริญเติบโต ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อผักคาวตองได้รับการขาดน้ำจะมีผลกระทบต่อลักษณะทางสรีรวิทยาของพืชอย่างชัดเจน ผลจากการทดลองพบว่า ผักคาวตองที่ได้รับการขาดน้ำเป็นเวลา 3 และ 7 วัน ในแต่ละช่วงของอายุการเจริญเติบโต จะมีผลต่ออุณหภูมิของใบ ผักคาวตองทำให้มีค่าสูงขึ้น ในขณะที่อัตราการคายน้ำจากใบ และค่า Total conductance มีค่าลดลงแตกต่างกันอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับผักคาวตองที่ไม่ได้รับการขาดน้ำ (ตารางที่ 1, 2 และ 3) จากการศึกษาถึงการขาดน้ำของพืชพบว่า พืชที่ได้รับการขาดน้ำอุณหภูมิใบจะมีค่าเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามอัตราการคายน้ำจากใบและ Total conductance ของปากใบจะมีค่าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับพืชที่ไม่ขาดน้ำ ทั้งนี้ก็เพราะการขาดน้ำมีผลทำให้ปากใบของพืชปิดเพื่อลดการคายน้ำของพืช (Pandey, 1995 ; Sivakumar, 1987) จึงมีผลทำให้การคายน้ำจากใบของพืชลดลง อุณหภูมิใบของพืชจึงมีค่าสูงขึ้น สมบุญ (2535) อธิบายว่า ตามปกติในการคายน้ำของพืชจะช่วยลดอุณหภูมิใบของพืชเป็นอย่างมาก และเมื่อพืชหยุดการคายน้ำอุณหภูมิใบในกลุ่มพืชก็จะมีค่าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ Pandey (1995) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า พืชเมื่อได้รับการขาดน้ำ พืชจะมีการปรับตัวโดยมีการลดค่าศักยภาพของน้ำในใบลง Total conductance มีค่าลดลง ปากใบส่วนใหญ่ปิดจึงส่งผลทำให้อัตราการคายน้ำจากใบลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับพืชที่ไม่ขาดน้ำ Lawn (1984) พบว่า ค่าของ Leaf conductance มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับอุณหภูมิของใบ กล่าวคือ ค่าอุณหภูมิของใบมีค่าสูงขึ้นจะมีผลทำให้ค่าของ Total conductance มีค่าลดลงและจะมีผลต่อเนื่องไปถึงอัตราการคายน้ำของพืชมีค่าลดลง ซึ่งการขาดน้ำของพืชยังมีผลอย่างมากต่อการเจริญเติบโตทางลำต้น Lawn (1984) รายงานว่า ในสภาวะที่พืชขาดน้ำจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการแบ่งเซลล์และการขยายตัวของเซลล์ ปากใบของพืชปิดก็จะมีผลต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซซึ่งต้องนำมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง ทำให้การสังเคราะห์แสงของพืชลดลง ธาตุอาหารต่าง ๆ ที่ได้จากการสังเคราะห์แสงที่ต้องนำมาใช้ในการเจริญเติบโตจึงมีน้อย ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตทางลำต้นลดลง Turk and Itall (1980) รายงานว่า การขาดน้ำของพืชทำให้การพัฒนาพื้นที่ใบและใบย่อยลดลง ตลอดจนมีผลทำให้พื้นที่ใบทั้งหมดลดลง เพื่อลดการสูญเสียน้ำ เนื่องจากกระบวนการคายน้ำทำให้พืชสามารถอยู่รอด

ได้เช่นเดียวกับผักคาวตองที่พบว่า ผักคาวตองมีการแตกใบใหม่ลดลงและการยืดขยายของใบก็มีค่าลดลงเช่นกัน จึงทำให้มีพื้นที่ใบน้อยส่งผลให้ค่าดัชนีพื้นที่ใบและการยืดขยายของใบผักคาวตองลดลง (ตารางที่ 14) พื้นที่ใบน้อยทำให้มีพื้นที่ในการสังเคราะห์แสงและสร้างอาหารได้ลดลง การสะสมน้ำหนักแห้งจึงมีค่าลดลง(ตารางที่ 18)

ส่วนการขาดน้ำเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ คือ ขาดน้ำเป็นเวลา 3 และ 7 วัน ที่ช่วงอายุแตกต่างกัน ในผักคาวตองพบว่า การขาดน้ำในช่วงแรก ๆ ของการเจริญเติบโตจะมีผลกระทบต่อ การเจริญเติบโตของผักคาวตองมากกว่าการขาดน้ำในช่วงหลัง ๆ ซึ่งพิจารณาจากการเจริญเติบโตทางลำต้น และการสะสมน้ำหนักแห้งของผักคาวตองที่มีการขาดน้ำในช่วงแรกของการเจริญเติบโตมีค่าน้อยกว่าการขาดน้ำในช่วงหลัง ๆ ของการเจริญเติบโตซึ่งสิ่งนี้สามารถอธิบายได้ว่า การขาดน้ำในช่วงแรกของการเจริญเติบโตเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดเพราะจะยับยั้งการเจริญเติบโตทางลำต้นของพืชมีผลทำให้พืชมีขนาดของลำต้นเล็ก ต้นเตี้ย ใบสั้น และแคบกว่าปกติ จึงส่งผลให้พืชมีการสะสมน้ำหนักแห้งและผลผลิตน้อย ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองนี้ที่พบว่า ผักคาวตองที่ได้รับการขาดน้ำในช่วงแรกของการเจริญเติบโตเป็นช่วงวิกฤติที่สุดเพราะการขาดน้ำในช่วงนี้จะมีผลกระทบต่อ การเจริญเติบโตทางลำต้นเป็นอย่างมาก ทำให้การแตกกิ่งน้อย การแตกใบใหม่และการสร้างใบใหม่ลดลง จึงทำให้พื้นที่การสังเคราะห์แสงมีค่าลดลง การสร้างอาหารจึงมีน้อย ซึ่งทำให้กระบวนการเจริญเติบโตลดลง การเจริญเติบโตทางลำต้นและการสะสมน้ำหนักลำต้น ใบและรากจึงมีค่าน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผักคาวตองที่มีการขาดน้ำในช่วงหลังของการเจริญเติบโต ส่วนการขาดน้ำในช่วงหลังของการเจริญเติบโตผักคาวตองสามารถทนทานต่อสภาวะการขาดน้ำได้ดีกว่าการขาดน้ำในช่วงแรก ๆ จึงทำให้การขาดน้ำในช่วงหลัง ๆ ของการเจริญเติบโตไม่มีผลกระทบต่อ การเจริญเติบโตทางลำต้นและผลผลิตมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับผักคาวตองที่ได้รับน้ำอย่างเพียงพอตลอดอายุการเจริญเติบโต การขาดน้ำเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 3 และ 7 วัน ผักคาวตองสามารถปรับตัวได้ดีและเมื่อการขาดน้ำผ่านพ้นไป ผักคาวตองได้รับน้ำอีกครั้งหลังจากการขาดน้ำ จึงทำให้ผักคาวตองมีการฟื้นตัวและสามารถเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามปกติ (สายัณห์, 2537) จึงทำให้การเจริญเติบโตทางลำต้นและผลผลิตไม่แตกต่างกันกับผักคาวตองที่ไม่มีการขาดน้ำมากนัก ลักษณะที่พบเช่นนี้ยังสามารถพบได้ในพืชอื่นอีกหลายชนิด เช่น หนุ่ยป่ากิ้ง (ฉวีวุฒิ, 2546) และข้าวโพด (แสน์, 2542) เป็นต้น

ดังนั้นในการปลูกผักคาวตองที่ดีซึ่งไม่ควรให้ผักคาวตองได้รับการขาดน้ำในช่วงแรกของการเจริญเติบโตเพราะการขาดน้ำในช่วงนี้จะเป็นช่วงวิกฤติที่สุด ซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโตทางลำต้นและการสะสมน้ำหนักแห้งรวมทั้งผลผลิตลดลงมากที่สุด ส่วนการขาดน้ำในช่วงหลัง ๆ ของการเจริญเติบโตจะมีผลกระทบต่อ การเจริญเติบโตและผลผลิตเช่นกัน แต่ระดับความรุนแรงจะน้อยกว่า อย่างไรก็ตามถ้าเป็นไปได้การปลูกผักคาวตองไม่ควรให้ผักคาวตองมีการขาดน้ำ และมีการให้

นำชลประทานอย่างเพียงพอตลอดอายุการเจริญเติบโต ซึ่งจะมีผลทำให้ผักกาวตองมีการเจริญเติบโต  
ทางลำต้นที่ดีและให้ผลผลิตสูงสุด

## สรุปผลการทดลอง

ผลจากการทดลองพอที่จะสรุปได้ว่า ผักกวางตุ้งเมื่อได้รับการขาดน้ำในช่วงแรกของการเจริญเติบโตจะมีผลกระทบต่อการระสมน้ำหนักแห้งของลำต้น ใบ และผลผลิตน้ำหนักแห้งมีค่าลดลงมากกว่าการขาดน้ำในช่วงหลัง ๆ ของการเจริญเติบโต การขาดน้ำเป็นเวลา 3 วัน จะมีผลทำให้ผักกวางตุ้งมีการระสมน้ำหนักแห้งและผลผลิตมีค่ามากกว่า ผักกวางตุ้งที่ขาดน้ำเป็นเวลา 7 วัน การขาดน้ำมีผลทำให้อุณหภูมิใบมีค่าเพิ่มขึ้น แต่อัตราการคายน้ำจากใบและ Total stomata conductance มีค่าลดลงแตกต่างกัน การปลูกผักกวางตุ้งที่ดีและควรมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอตลอดอายุการเจริญเติบโตจะมีผลทำให้ผักกวางตุ้งมีการระสมน้ำหนักต้นแห้งที่มากและให้ผลผลิตสูงสุด

## บรรณานุกรม

- ขจรพรรณ ไชยเดช 2553. พลูควาหรือผักคาวตอง. เข้าถึงได้ [http://www. Thai health. or th.](http://www.Thaihealth.or.th)
- เฉลิมพล แซมเพชร. 2535. สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่. โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ.
- ณัฐวุฒิ จุลสงค์. 2546 ผลของการขาดน้ำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเฟือกหอมพันธุ์พื้นเมือง. ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
- เต็ม สมิตินันท์. 2523. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย (ชื่อพฤกษศาสตร์-ชื่อพื้นเมือง). กรมป่าไม้. 379 หน้า.
- แน่นน้อย แสงเสน่ห์. 2541. สารต้านเชื้อราและสารต้านเชื้อแบคทีเรียจากใบพลูควาและต้นหญ้าไฟ. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 102 หน้า.
- ประนอม คำลาภ. 2530. พืชป่าที่นำมาใช้เป็นอาหารของชาวเขาและอาหารท้องถิ่นในบางท้องที่ของจังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- พร้อมจิต ศรีลัมภ์. 2543. สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 1. สมุนไพรสวนสิริรุกษชาติ, ภาควิชาเภสัช พฤกษศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ. 219 หน้า.
- รุจิชาติ อรรถสิทธิ์. 2531. การปลูกและการดูแลพืชสมุนไพร. สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, กรุงเทพฯ.
- วรัญญา อัจฉนที. 2545. ผลของสารสกัดจากใบพลูควาต่อการควบคุมโรคแอนแทรกคโนสของมะม่วง. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 62 หน้า.
- วิฑูรย์ ปัญญากุล. 2544. สมุนไพรกระถางคู่ยาที่มีชีวิต. เกษตรกรรมชาติ 1:13-16.
- สุคนธ์ทิพย์ สมบัติ. 2543. ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมโรคใบจุดออกดอกนาเรียของกะหล่ำปลี. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 95 หน้า.
- สถาบันวิจัยสมุนไพร. 2546. ผักคาวตอง. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 19 หน้า.
- สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน. 2541. สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, กรุงเทพฯ.
- สายันท์ สดุดี. 2537. สภาวะการขาดน้ำในการผลิตพืช. ภาควิชาพืชศาสตร์. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- เสน่ห์ แสงคำ. 2542. หญ้าเทวดาสมุนไพรรักษาความจน. วารสารเทคโนโลยีชาวบ้าน 2(224):12-18
- สุคนธ์ทิพย์ สมบัติ. 2543. ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมโรคใบจุดออกดอกนาเรียของกะหล่ำปลี. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 95 หน้า.
- สุนทรี่ สิงหนุตตรา. 2536. สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด. โอ.เอส.พรีนติ้งเฮ้าส์, กรุงเทพฯ. 260 น.

- สมยศ เดชภีรัตน์มงคล ณีรัฐติ จุลสงค์ ธวัชชัย อุบลเกิด และสมมารธ อยู่สุขยั้งสถาพร. 2548. การตอบสนองของหญ้าปักกิ่งต่อการขาดน้ำในช่วงอายุต่าง ๆ กัน หน้า 625-631. การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43. ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2548. ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์. 2535. สรีรวิทยาของพืช. ภาควิชาพฤกษศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 239 หน้า
- สุรินทร์ นิลสำราญจิต พรรรัตน์ ศิริคำ พิทยา สรวมศิริ. 2544. อิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มีต่อ ปริมาณ Flavonoid Glycoside ของพืชสมุนไพรฝักคาวตอง. รายงานผลการวิจัย. ฉบับสมบูรณ์. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- สุรินทร์ นิลสำราญจิต พรรรัตน์ ศิริคำ เกียรติ เชี่ยวศิลป์ และพิทยา สรวมศิริ. 2543. การรวบรวม และศึกษาลักษณะบางประการของฝักคาวตองในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน. หน้า 51-55. ใน เอกสารการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37.
- เอมอร โสมนะพันธุ์. 2541. พืชคาว : สมุนไพรต้านไวรัสโรคเอดส์. จุลสารข้อมูลสมุนไพร 15 :11-17.
- Eui, S., Toshiro, Tomokos, K., Youich, H., Yukio, N., Masashi, Y. and Toshihiro, T. 1996. Pharmacognostical studies of *Houttuynia cordata* (2) Growth and flavonoid glycoside contents of *Houttuynia cordata* Thunb. cultivated under shade condition. Nat. Med. 50 (1):45-48.
- Fuse, J., Kanamori, H., Sakamoto, I. and Yahara, S. 1994. Studies on flavonol glycosides in *Houttuynia cordata*. Nat. Med. 48:307-311. Halim, R.A., Buxton D.R., Hattendoff, M.J. and Carlson, R.E. 1989. Water-deficit effects on alfalfa at various growth stages. Agron. J. 81:765-770.
- Kawamura, T., Hisata, Y., Okuda, K., Noro, Y., Tanaka, T., Yoshida, M. and Sakai, E. 1994. Pharmacognostical studies of *Houttuynia cordata* (1) Flavonoid contents of *Houttuynia cordata*. Thunb. Nat. Med. 48:208-212.
- Lawn, R.J. 1984. Response of four grain legumes to water stress southeastern Queensland. I. Physiological response mechanisms. Aust. Agric. Res. 33: 511-521
- Liao, D.S., Wang, J.M., and Zhao, J.Z. 2002. Study on the extracting of flavonoid and application from *Houttuynia cordata* Thunb. China Food Additive. 2:81-83. (in Chinese)
- Pandey, A. 1995. Water stress and clipping management effect on guineagrass : grow and biomass allocation. Agron. J. 76:553-557

- Qiu, J.Y., Yang, Y.L., Yang, G.R. 2005. Study on extracting technology of the flavones in *Houttuynia cordata* Thunb. and its antiallergic activity. J. of Yunnan Uni. 27(3):239-244. (in Chinese)
- Sakai, E., Shibata, T. Kumamura, T., Hisata, Y., Noro, Y., Yoshida, M. and Tanaka, T. 1996. Pharmacognostical studies of Houttuyniae Herba (2) Growth and Flavonoid glycosides contents of *Houttuynia cordata*. Thunb. cultivated under stress condition. Nat. Med. 50: 45-48.
- Sivarkumar, M.V.K. and Shaw, R.H. 1987. Relative evaluation of water stress indicators for soybeans. Agron.J. 79 : 1019-1026
- Tomoko, K., Youichi, H.J., Kazuyo, O., Yukio, N., Toshihiro, T., Masashi, Y. and Eizi, S. 1994. Pharmacognostical studies of houttuyniae herba (1) Flavonoid glycosides contents of *Houttuynia cordata* Thmb. Nat. Med. 48:208-212.
- Turner, N.C. 1981. Techniques and experimental approaches for the measurement of plant water status. Plant and Soil. 58:339-366.
- Whithan, F.W., Blayches, D.P. and Derlin, R.M. 1971. Experiments in Plant Physiology. D. Van Nostr and Company, New York, pp 55-58.
- [http://www. Be 2 hand. Com/scripts/view. Php? Prod-id = 297136](http://www.Be2hand.Com/scripts/view.Php?Prod-id=297136)
- [http://www. ThaiFree buy. Com/category-new-buy. Php.?](http://www.ThaiFreeBuy.Com/category-new-buy.Php?)
- [http://www. Pramool. Com/cgi-bin/dispiteM. Cge.](http://www.Pramool.Com/cgi-bin/dispiteM.Cge)
- [http://www. KingHerbThai. Com/catalog. Php? Idp=13](http://www.KingHerbThai.Com/catalog.Php?Idp=13)
- [http://www. Highlight. Kapook. Com/](http://www.Highlight.Kapook.Com/)
- [http://www. Gigog. Com/technology/cat 8/news 3219/](http://www.Gigog.Com/technology/cat8/news3219/)
- [http://www. ThaiHealth. or. th./node/9267](http://www.ThaiHealth.or.th/node/9267)
- [http://www. TrytoDream. Com/Topic/5365](http://www.TrytoDream.Com/Topic/5365)
- [http://www. ThiaClinic. Com/cgi-bin/wb xp/YaBB.pl? board-obgyn](http://www.ThiaClinic.Com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl?board-obgyn)

## ภาคผนวก



(ก)



(ข)



(ค)



(ง)



(ช)



(ซ)



(จ)

(ฉ)

### ภาพผนวกที่ 1

การเจริญเติบโตของผักกวางตุ้งที่อายุ 90 วันหลังปลูก เมื่อได้รับการขาดน้ำในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันและเป็นเวลานานแตกต่างกันเปรียบเทียบกับที่ได้รับน้ำตลอดอายุการเจริญเติบโต (ก) และ (ข) คือ ผักกวางตุ้งขาดน้ำที่อายุ 15 วัน หลังปลูก และขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 และ 7 วัน เปรียบเทียบกับผักกวางตุ้งที่ไม่ขาดน้ำคือได้รับน้ำตลอด (ค) และ (ง) คือ ผักกวางตุ้งขาดน้ำที่อายุ 30 วัน หลังปลูก และขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 และ 7 วัน เปรียบเทียบกับผักกวางตุ้งที่ไม่ขาดน้ำคือได้รับน้ำตลอด (ช) และ (ซ) คือ ผักกวางตุ้งขาดน้ำที่อายุ 60 วัน หลังปลูก และขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 และ 7 วัน เปรียบเทียบกับผักกวางตุ้งที่ไม่ขาดน้ำคือได้รับน้ำตลอด (จ) และ (ฉ) คือ ผักกวางตุ้งขาดน้ำที่อายุ 90 วัน หลังปลูก และขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 และ 7 วัน เปรียบเทียบกับผักกวางตุ้งที่ไม่ขาดน้ำคือได้รับน้ำตลอด



(ก)



(ข)



(ค)



(ง)



(จ)



(ฉ)



(จ)

(ฉ)

## ภาพผนวกที่ 2

การเจริญเติบโตของผักกาดทองที่อายุ 120 วันหลังปลูก เมื่อได้รับการขาดน้ำในช่วง ระยะเวลาที่แตกต่างกันและเป็นเวลานานแตกต่างกันเปรียบเทียบกับที่ได้รับน้ำตลอดอายุการเจริญเติบโต (ก) และ (ข) คือ ผักกาดทองขาดน้ำที่อายุ 15 วัน หลังปลูก และขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 และ 7 วัน เปรียบเทียบกับผักกาดทองที่ไม่ขาดน้ำคือ ได้รับน้ำตลอด (ค) และ (ง) คือ ผักกาดทองขาดน้ำที่อายุ 30 วัน หลังปลูก และขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 และ 7 วัน เปรียบเทียบกับผักกาดทองที่ไม่ขาดน้ำคือ ได้รับน้ำตลอด (ช) และ (ซ) คือ ผักกาดทองขาดน้ำที่อายุ 60 วัน หลังปลูก และขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 และ 7 วัน เปรียบเทียบกับผักกาดทองที่ไม่ขาดน้ำคือ ได้รับน้ำตลอด (จ) และ (ฉ) คือ ผักกาดทองขาดน้ำที่อายุ 90 วัน หลังปลูก และขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 และ 7 วัน เปรียบเทียบกับผักกาดทองที่ไม่ขาดน้ำคือ ได้รับน้ำตลอด



(ก)



(ข)



(ค)



(ง)



(จ)



(ฉ)



**รูปภาพผนวกที่ 3** การเจริญเติบโตของฝักคาวตองที่อายุ 150 วันหลังปลูก เมื่อได้รับการขาดน้ำในช่วง ระยะเวลาที่แตกต่างกันและเป็นเวลานานแตกต่างกันเปรียบเทียบกับที่ได้รับน้ำตลอดอายุการเจริญเติบโต (ก) และ (ข) คือ ฝักคาวตองขาดน้ำที่อายุ 15 วัน หลังปลูก และขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 และ 7 วัน เปรียบเทียบกับฝักคาวตองที่ไม่ขาดน้ำคือ ได้รับน้ำตลอด (ค) และ (ง) คือ ฝักคาวตองขาดน้ำที่อายุ 30 วัน หลังปลูก และขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 และ 7 วัน เปรียบเทียบกับฝักคาวตองที่ไม่ขาดน้ำคือ ได้รับน้ำตลอด (ช) และ (ซ) คือ ฝักคาวตองขาดน้ำที่อายุ 60 วัน หลังปลูก และขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 และ 7 วัน เปรียบเทียบกับฝักคาวตองที่ไม่ขาดน้ำคือ ได้รับน้ำตลอด (จ) และ (ฉ) คือ ฝักคาวตองขาดน้ำที่อายุ 90 วัน หลังปลูก และขาดน้ำเป็นเวลานาน 3 และ 7 วัน เปรียบเทียบกับฝักคาวตองที่ไม่ขาดน้ำคือ ได้รับน้ำตลอด