

ภาคผนวก ค.
น้ำหนักสดของผักสลัด

ตารางที่ ค.1 น้ำหนักสดเฉลี่ยของผักสลัด (กรัม) ที่ปลูกในสารละลาย KMITL1 ที่ 1.0 1.4 และ 1.8 mS/cm ที่ปลูกในหน้าฝน (การทดลองที่ 1 ผลของความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารพืชและชนิดของผักสลัด ต่อการสะสมไนเตรทในผักสลัด ในระบบปลูกพืชแบบ NFT)

ความเข้มข้นของ สารละลาย	น้ำหนักสดเฉลี่ยของผักสลัด (กรัม)				
	green oak	red oak	red coral	butterhead	cos
1.0 mS/cm	122.88	122.66	94.11	121.43	203.27
	128.04	134.54	86.17	115.78	165.67
	105.93	137.13	92.61	75.21	151.28
	123.54	112.36	74.04	117.03	189.13
เฉลี่ย	120.09	126.67	86.73	107.36	177.34
SD	9.72	11.43	9.13	21.57	23.28
1.4 mS/cm	161.76	150.90	80.09	103.18	147.27
	89.98	76.12	60.70	82.14	102.46
	142.91	122.85	99.29	159.78	177.55
	134.98	127.34	120.29	125.90	142.25
เฉลี่ย	132.41	119.30	90.09	117.75	142.38
SD	30.43	31.31	25.57	33.23	30.85
1.8 mS/cm	135.62	138.51	113.55	142.18	160.52
	115.93	125.06	95.30	115.33	159.46
	121.84	134.20	123.45	143.97	179.25
	111.12	138.98	101.87	129.60	222.18
เฉลี่ย	121.13	134.19	108.54	132.77	180.35
SD	10.61	6.45	12.48	13.27	29.33

ตารางที่ ค.2 น้ำหนักสดเฉลี่ยของผักสลัด (กรัม) ที่ปลูกในสารละลาย KMITL1 ที่ 1.0 1.4 และ 1.8 mS/cm ที่ปลูกในหน้าหนาว (การทดลองที่ 1 ผลของความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารพืชและชนิดของผักสลัด ต่อการสะสมไนเตรทในผักสลัด ในระบบปลูกพืชแบบ NFT)

ความเข้มข้นของ สารละลาย	น้ำหนักสดเฉลี่ยของผักสลัด (กรัม)				
	green oak	red oak	red coral	butterhead	cos
1.0 mS/cm	92.85	101.01	85.24	98.96	140.84
	121.71	90.83	98.74	147.39	102.08
	116.21	123.27	96.31	121.07	116.61
	120.29	112.85	83.86	127.16	150.15
เฉลี่ย	112.76	106.99	91.04	123.64	127.42
SD	13.48	14.10	7.58	19.93	22.03
1.4 mS/cm	138.91	122.98	141.81	162.55	84.04
	141.39	122.01	130.20	141.37	146.37
	93.33	112.26	90.05	130.63	109.01
	117.56	118.77	80.68	146.60	107.15
เฉลี่ย	122.80	119.00	110.69	145.28	111.64
SD	22.37	4.85	29.86	13.29	25.79
1.8 mS/cm	124.84	99.67	93.08	130.64	133.82
	130.48	124.60	127.50	146.79	111.97
	103.49	97.46	80.98	158.88	135.75
	144.66	132.53	131.94	164.65	112.05
เฉลี่ย	125.87	113.56	108.37	150.24	123.39
SD	17.09	17.65	25.20	15.04	13.17

ตารางที่ ค.3 น้ำหนักสดเฉลี่ยของผักสลัด (กรัม) ที่ปลูกในสารละลายที่มีความเข้มข้น 1.4 mS/cm 3 สูตร ที่ปลูกในหน้าฝน (การทดลองที่ 2 ผลของสูตรสารละลายธาตุอาหารพืชและชนิดของผักสลัด ต่อการสะสมไนเตรทในผักสลัด ในระบบปลูกพืชแบบ NFT)

สูตรของสารละลาย ที่มีความเข้มข้น 1.4 mS/cm	น้ำหนักสดเฉลี่ยของผักสลัด (กรัม)				
	green oak	red oak	red coral	butterhead	cos
Belgium	106.46	69.83	73.37	98.64	106.46
	88.08	94.24	81.71	119.89	88.08
	126.00	97.50	93.84	125.52	126.00
	92.93	122.41	103.87	131.92	92.93
เฉลี่ย	103.36	95.99	88.20	118.99	103.36
SD	16.98	21.51	13.41	14.43	16.98
Australia	51.39	118.13	81.18	113.97	66.24
	96.76	118.51	66.51	115.70	47.30
	34.55	37.56	47.82	84.26	46.32
	96.75	47.51	75.25	111.70	58.12
เฉลี่ย	69.86	80.43	67.69	106.41	54.49
SD	31.80	43.94	14.55	14.85	9.48
Netherlands	70.82	56.24	87.88	125.16	63.24
	45.91	37.84	46.32	66.97	27.38
	62.74	59.60	55.72	72.82	61.65
	66.47	56.36	64.16	104.19	57.06
เฉลี่ย	61.48	52.51	63.52	92.28	52.33
SD	10.89	9.90	17.80	27.34	16.84

ตารางที่ ค.4 น้ำหนักสดเฉลี่ยของผักสลัด (กรัม) ที่ปลูกในสารละลายที่มีความเข้มข้น 1.4 mS/cm 3 สูตร ที่ปลูกในน้ำหนาว (การทดลองที่ 2 ผลของสูตรสารละลายธาตุอาหารพืชและชนิดของผักสลัด ต่อการสะสมไนเตรทในผักสลัด ในระบบปลูกพืชแบบ NFT)

สูตรของสารละลาย ที่มีความเข้มข้น 1.4 mS/cm	น้ำหนักสดเฉลี่ยของผักสลัด (กรัม)				
	green oak	red oak	red coral	butterhead	cos
Belgium	52.71	57.87	50.93	69.91	50.49
	81.21	61.64	71.63	91.66	66.46
	48.17	45.49	60.21	84.79	41.45
	59.58	52.49	48.52	76.71	50.68
เฉลี่ย	60.42	54.37	57.82	80.77	52.27
SD	14.63	7.01	10.49	9.47	10.40
Australia	64.39	50.63	54.74	59.93	47.44
	64.98	57.07	64.06	82.50	57.49
	51.72	51.46	52.00	70.70	35.14
	54.32	49.91	56.52	85.28	56.97
เฉลี่ย	58.85	52.27	56.83	74.60	49.26
SD	6.82	3.26	5.16	11.65	10.49
Netherlands	54.87	51.29	62.66	95.15	32.51
	63.37	67.22	63.77	93.84	58.19
	58.15	57.91	60.83	84.97	46.62
	79.46	51.72	52.15	95.11	55.19
เฉลี่ย	63.96	57.03	59.85	92.27	48.12
SD	10.91	7.43	5.28	4.90	11.51