

บทคัดย่อ

T 154052

การศึกษาเบื้องต้นในการเลี้ยงเพรียงหัวหอม (*Ecteinascidia turbinata* Herdman, 1880) ในการศึกษาครั้งแรกจะทำการสำรวจเพื่อศึกษาการแพร่กระจายของเพรียงหัวหอมชนิดนี้ในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง จากการศึกษาโดยวิธีการสำรวจเพื่อล่อเพรียงหัวหอมโดยใช้ตาข่ายขนาด 2.5 เซนติเมตร ผูกติดกับกรอบที่ทำด้วยพีวีซีขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร นำไปผูกไว้ในระดับน้ำลึก 1 เมตร เป็นเวลา 3 เดือน จากการศึกษาไม่พบเพรียงหัวหอมทุกชนิด และเมื่อทำการสำรวจต่อไปเป็นระยะเวลา 11 เดือน ก็ไม่พบเพรียงหัวหอมในบริเวณปากคลองสิเกา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง อ่าวราชมงคล และอ่าวปากเมง และได้หยุดการศึกษาในเดือนกันยายน 2546

The preliminary studies to rearing Tunicate (*Ecteinascidia turbinata* Herdman, 1880). The first, survey for studies the distribution of Tunicate in Faculty of science and fisheries technology area by to induct with a net in frame size 60 centimeters and to setting under water 1 meter to harvest every month. The result of experiment found that not found Tunicate after 3 months and not found Tunicate after 11 months of experiment continue. Stop this experimental on: September 2003.