

ตารางที่ 6 องค์ประกอบของกากมันสำปะหลัง

ลักษณะของกาก มันสำปะหลัง	องค์ประกอบทางเคมี (%)									
	คาร์โบไฮเดรต	โปรตีน	ไขมัน	เยื่อใย	เถ้า	ความชื้น	ไนโตรเจน	แคลเซียม	ฟอสฟอรัส	แหล่งข้อมูล
กากมันทั่วไป	76.45	1.77	0.18	8.20	1.36	13.03	-	-	-	ชวณิศนดากร (2500)
กากมันอบแห้ง	71.70	2.30	1.00	9.60	1.50	13.86	-	0.04	-	ชวณิศนดากร (2500)
กากมันตากแดด	67.50	2.30	0.70	9.80	6.20	13.47	-	0.03	-	ชวณิศนดากร (2500)
กากมันทั่วไป	59.77	-	-	-	-	9.25	0.29	-	-	จิราภรณ์ (2525)
กากมันแห้ง	90.80	1.04	0.80	5.30	1.80	13.20	-	-	0.04	ทวี (2527)
กากมันสด	94.00	1.00	0.50	1.50	1.50	80.00	-	-	-	ทวี (2527)
กากมันทั่วไป	65.03	1.75	0.48	9.24	10.76	12.74	-	0.39	0.05	เสาวนิตย์ (2527)

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ลักษณะของกาก	องค์ประกอบทางเคมี (%)									แหล่งข้อมูล
	คาร์โบไฮเดรต	โปรตีน	ไขมัน	เยื่อใย	เถ้า	ความชื้น	ไนโตรเจน	แคลเซียม	ฟอสฟอรัส	
กากมันทั่วไป	78.80	-	-	4.60	1.80	13.20	-	-	0.03	จิรสิทธิ์(2529)
กากมันของภาคอีสาน	70.50	2.38	0.16	12.15	2.89	8.99	-	-	-	สาวิตร (2530)
กากมันของภาคตะวันออกเฉียง	70.07	2.53	0.25	12.56	7.29	7.44	-	-	-	สาวิตร (2530)
กากมันแห้ง	77.60	1.00	0.80	5.30	1.80	13.20	-	-	0.03	เมธา และ ฉลอง(2533)
กากมันสด	14.00	2.50	0.50	1.50	-	80.00	-	1.50	-	เมธา และ ฉลอง (2533)
กากมันทั่วไป	62.22	3.39	0.24	15.26	2.65	12.21	-	-	-	สุนัย (2539)
ภาคอีสาน	70.50	2.38	0.43	12.15	12.89	8.99	-	-	-	*
ภาคตะวันออกเฉียง	70.07	2.53	0.52	12.56	7.29	7.44	-	-	-	*

หมายเหตุ (-) = ไม่มีรายงาน, (*) = Progress Report Thailand-USAID Project on Utilization of Cassava and Cassava Waste through Fermentation Technology (1984)