

ตารางผนวกที่ 15 อิทธิพลของแหล่งน้ำและชนิดพืชที่มีต่อปริมาณไนโตรเจน และฟอสฟอรัส
ในพืชภายหลังการทดลองครบ 11 สัปดาห์

(เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักแห้ง)					
ชนิดพืช	ซ้ำ	ส่วนเหนือดิน		ส่วนใต้ดิน	
		N	P	N	P
ในน้ำเสียชุมชน ก่อนบำบัด					
พุทธรักษาต้นสูงใบม่วงดอกแดง	1	7.12	0.90	0.43	0.06
	2	10.28	1.12	0.44	0.08
	3	7.53	0.94	0.42	0.06
พุทธรักษาต้นสูงใบเขียวดอกเหลือง	1	5.73	0.59	0.47	0.06
	2	9.59	1.17	0.38	0.06
	3	8.00	0.83	0.45	0.06
พุทธรักษาต้นเตี้ยใบเขียวดอกชมพู	1	5.36	0.59	0.35	0.05
	2	7.46	0.65	0.33	0.05
	3	6.44	0.64	0.26	0.05
ในน้ำชลประทานก่อนบำบัด					
พุทธรักษาต้นสูงใบม่วงดอกแดง	1	1.33	0.16	0.27	0.05
	2	1.32	0.17	0.51	0.14
	3	1.86	0.22	0.33	0.06
พุทธรักษาต้นสูงใบเขียวดอกเหลือง	1	1.03	0.15	0.25	0.05
	2	1.02	0.16	0.38	0.09
	3	1.09	0.14	0.27	0.05
พุทธรักษาต้นเตี้ยใบเขียวดอกชมพู	1	2.32	0.28	0.28	0.05
	2	1.16	0.15	0.27	0.04
	3	1.48	0.16	0.26	0.04