

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
13	การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การลดปริมาณ COD และการลดความ ความเข้มข้นของน้ำทิ้งโดยใช้เชื้อราเส้นใยสีขาวผสมสายพันธุ์ 03+39+25 ที่สภาวะแบบเดิมอาหารและไม่เดิมอาหาร	92
ตารางผนวกที่		
1	มาตรฐานน้ำทิ้งกำหนดโดย WTO Consultant และกระทรวง อุตสาหกรรม	82
2	มาตรฐานน้ำดิบกำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา	83
3	ผลการวิเคราะห์ปริมาณ COD และความเข้มข้นของเชื้อรา เส้นใยสีขาว (White-rot Fungi) สายพันธุ์เดี่ยวที่สภาวะแบบ เดิมอาหารที่ระยะเวลาของการบำบัดในน้ำทิ้งวันที่ 1	117
4	ผลการวิเคราะห์ปริมาณ COD และความเข้มข้นของเชื้อรา เส้นใยสีขาว (White-rot Fungi) สายพันธุ์เดี่ยวที่สภาวะแบบ เดิมอาหารที่ระยะเวลาของการบำบัดในน้ำทิ้งวันที่ 2	118
5	ผลการวิเคราะห์ปริมาณ COD และความเข้มข้นของเชื้อรา เส้นใยสีขาว (White-rot Fungi) สายพันธุ์เดี่ยวที่สภาวะแบบ เดิมอาหารที่ระยะเวลาของการบำบัดในน้ำทิ้งวันที่ 3	119
6	ผลการวิเคราะห์ปริมาณ COD และความเข้มข้นของเชื้อรา เส้นใยสีขาว (White-rot Fungi) สายพันธุ์เดี่ยวที่สภาวะแบบ เดิมอาหารที่ระยะเวลาของการบำบัดในน้ำทิ้งวันที่ 4	120
7	ผลการวิเคราะห์ปริมาณ COD และความเข้มข้นของเชื้อรา เส้นใยสีขาว (White-rot Fungi) สายพันธุ์เดี่ยวที่สภาวะแบบ เดิมอาหารที่ระยะเวลาของการบำบัดในน้ำทิ้งวันที่ 5	121
8	ผลการวิเคราะห์ปริมาณ COD และความเข้มข้นของเชื้อรา เส้นใยสีขาว (White-rot Fungi) สายพันธุ์เดี่ยวที่สภาวะแบบ ไม่เดิมอาหารที่ระยะเวลาของการบำบัดในน้ำทิ้งวันที่ 1	122