

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
37	ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นและระยะเวลาในการบำบัดน้ำทิ้งของเชื้อราเส้นใยสีขาว (White-rot Fungi) ผสมสายพันธุ์ที่สภาวะแบบเดิมอาหาร	71
38	ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การลดปริมาณ COD และระยะเวลาในการบำบัดน้ำทิ้งของเชื้อราเส้นใยสีขาว (White-rot Fungi) ผสมสายพันธุ์ที่สภาวะแบบเดิมอาหาร	74
39	ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การลดความเข้มข้นและระยะเวลาในการบำบัดน้ำทิ้งของเชื้อราเส้นใยสีขาว (White-rot Fungi) ผสมสายพันธุ์ที่สภาวะแบบเดิมอาหาร	76
40	ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ COD และระยะเวลาในการบำบัดน้ำทิ้งของเชื้อราเส้นใยสีขาว (White-rot Fungi) ผสมสายพันธุ์แบบไม่เดิมอาหาร	80
41	ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นและระยะเวลาในการบำบัดน้ำทิ้งของเชื้อราเส้นใยสีขาว (White-rot Fungi) ผสมสายพันธุ์ที่สภาวะแบบไม่เดิมอาหาร	81
42	ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การลดปริมาณ COD และระยะเวลาในการบำบัดน้ำทิ้งของเชื้อราเส้นใยสีขาว (White-rot Fungi) ผสมสายพันธุ์ที่สภาวะแบบไม่เดิมอาหาร	84
43	ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การลดความเข้มข้นและระยะเวลาในการบำบัดน้ำทิ้งของเชื้อราเส้นใยสีขาว (White-rot Fungi) ผสมสายพันธุ์ที่สภาวะแบบไม่เดิมอาหาร	86
44	การเปรียบเทียบปริมาณ COD และระยะเวลาในการบำบัดน้ำทิ้งของเชื้อราผสมสายพันธุ์หมายเลข 03+39+25 ที่สภาวะแบบเดิมอาหารและที่สภาวะแบบไม่เดิมอาหาร	89
45	การเปรียบเทียบความเข้มข้นและระยะเวลาในการบำบัดน้ำทิ้งของเชื้อราผสมสายพันธุ์หมายเลข 03+39+25 ที่สภาวะแบบเดิมอาหารและที่สภาวะแบบไม่เดิมอาหาร	90