

ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้เทคนิค HAT-RAPD ในการตรวจสอบกระบวนการ DNA methylation ในพืช 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว (*Oryza sativa*) พืชเนียบ (*Petunia hybrida*) ปวยเล้ง (*Spinacea oleracea* L.) และลำไย (*Dimocarpus longan* Lour.) ที่ถูกชักนำด้วยสาร 5-azacytidine สารโพแทสเซียมคลอเรท และอุณหภูมิต่ำ โดยใช้ข้าวและพืชเนียบเป็นกลุ่มควบคุมในการตรวจสอบ เนื่องจากมีรายงานแล้วว่าการใช้สาร 5-azacytidine มีผลไปลดการเติมหมู่เมทิลในจีโนมของพืช 2 ชนิดนี้ ซึ่งจากการศึกษามีผลการทดลองดังต่อไปนี้ (1) การให้สาร 5-azacytidine ความเข้มข้น 25 μM แก่ข้าว พบว่ากลุ่มที่ได้รับสาร 5-azacytidine มีแนวโน้มที่จะเกิดต้นเตี้ย โดยมีอัตราส่วนต้นเตี้ย : ต้นปกติ เท่ากับ 5 : 7 และเมื่อเลือกตัวอย่างข้าวมาตรวจสอบกระบวนการ DNA methylation โดยการใช้เอนไซม์ *HpaII* และ *MspI* ร่วมกับเทคนิค HAT-RAPD ด้วยการใส่ 3 ไพรมเมอร์ (OPW-09, OPL-04, OPL-14) พบว่าเกิดแถบดีเอ็นเอที่มีน้ำหนักโมเลกุลแตกต่างกันระหว่างตัวอย่างที่ได้รับสาร และตัวอย่างในกลุ่มควบคุม (2) การให้สาร 5-azacytidine ความเข้มข้น 50 และ 100 μM แก่พืชเนียบ พบว่ามีผลทำให้ต้นพืชเนียบมีการออกดอกเร็วขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับต้นที่ไม่ได้รับสาร และพบว่าการให้สารที่ความเข้มข้นสูงคือ 100 μM มีผลทำให้ต้นพืชเนียบมีความสูงเฉลี่ยมากกว่าในกลุ่มที่ไม่ได้รับสารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ไม่พบว่ามีผลต่อจำนวนยอด และจำนวนใบของต้นพืชเนียบ และเมื่อเลือกตัวอย่างพืชเนียบมาตรวจสอบกระบวนการ DNA methylation ด้วยการใส่ 2 ไพรมเมอร์ (OPW-09, OPL-04) พบว่าเกิดแถบดีเอ็นเอที่มีน้ำหนักโมเลกุลแตกต่างกันระหว่างตัวอย่างที่ได้รับสารแต่ละความเข้มข้น และตัวอย่างในกลุ่มควบคุม (3) การทดลองในปวยเล้ง พบว่าการให้สาร 5-azacytidine ความเข้มข้น 125 μM สารโพแทสเซียมคลอเรทความเข้มข้น 250 μM และอุณหภูมิต่ำที่ 10 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 20 วัน มีผลทำให้ต้นปวยเล้งมีการออกดอกเร็วกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งยังมีเปอร์เซ็นต์การออกดอกมากกว่ากลุ่มควบคุมประมาณ 13 - 34% แต่ไม่มีผลต่อความสูง จำนวน vegetative leaves และน้ำหนักสดของต้นปวยเล้ง หลังจากการตรวจสอบ กระบวนการ DNA methylation ในปวยเล้ง ด้วย 2 ไพรมเมอร์ (OPW-09, OPL-04) พบว่าเกิดแถบดีเอ็นเอที่มีน้ำหนักโมเลกุลแตกต่างกัน ระหว่างตัวอย่างที่ได้รับสารแต่ละชนิด และตัวอย่างในกลุ่มควบคุม (4) การให้สารโพแทสเซียมคลอเรทแก่ต้นลำไย ในอัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น มีผลทำให้ต้นลำไยออกดอกภายใน 38 วันหลังใส่สาร ในขณะที่ต้นที่ไม่ได้รับสารจะไม่พบการออกดอก หลังจากการตรวจสอบกระบวนการ DNA methylation ในลำไย ด้วย 5 ไพรมเมอร์ (OPW-09, OPL-04, OPC-09, OPH-06 และ OPL-15) ไม่พบว่าเกิดแถบดีเอ็นเอที่มีน้ำหนักโมเลกุลแตกต่างกัน ระหว่างกลุ่มที่ได้รับสารโพแทสเซียมคลอเรท และกลุ่มควบคุม

In this study, HAT-RAPD technique was chosen to detect DNA methylation in four plant species including rice (*Oryza sativa*), petunia (*Petunia hybrida*), spinach (*Spinacea oleracea* L.) and longan (*Dimocarpus longan* Lour.), which were induced by 5-azacytidine, potassium chlorate (KClO_3) and low temperature. Rice and petunia were induced, because there was evidence indicating that 5-azacytidine was able to reduce methylation level in their genomes. The results showed as follows : (1) To treat rice seeds with $25 \mu\text{M}$ 5-azacytidine resulted in dwarf seedlings with the ratio of dwarf : normal at 5 : 7. Rice leaf samples at age of 20 weeks were then collected to detect DNA methylation using restriction enzymes ; *Hpa*II and *Msp*I following with the HAT-RAPD technique by 3 primers (OPW-09, OPL-04, OPL-14). DNA bands with different molecular weight were detected between control and treated-group. (2) To treat petunia seeds with $50 \mu\text{M}$ and $100 \mu\text{M}$ 5-azacytidine led to induce early flowering. Plants treated with high concentration ($100 \mu\text{M}$) were higher than the control. However, shoots and leaves in the treated-groups were not different. Detection of DNA methylation in petunia, 2 primers (OPW-09, OPL-04) revealed DNA bands with different molecular weight between control and treated-groups. (3) To treat spinach seeds with $125 \mu\text{M}$ 5- azacytidine, $250 \mu\text{M}$ KClO_3 and low temperature at 10°C for 20 days led to induce early flowering and higher percentage of flowering than the control by 13-34%. However, the effects on the height, number of vegetative leaves and fresh weight were not observed. Detection of DNA methylation in spinach, 2 primers (OPW-09, OPL-04) revealed DNA bands with different molecular weight between control and treated-groups. (4) Treatment of longan with 1 kg of KClO_3 resulted in flowering induction within 38 days while the control did not. Detection of DNA methylation in longan, DNA bands with different molecular weight was undetectable among control and treated-group with 5 random primers (OPW-09, OPL-04, OPC-09, OPH-06, OPL-15).