

ปัจจุบันผู้ที่เป็โรคจิตจากสารแอมเฟตามีนมีเพิ่มมากขึ้น โดยพบมากในผู้ขายวัยรุ่นถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น จากข้อมูลการเข้ารับการบำบัดรักษาของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีนที่ผ่านมาพบว่าปัจจัยทางด้านครอบครัว โดยเฉพาะการทำหน้าที่ของครอบครัวมีความสำคัญต่อการเสพสารแอมเฟตามีน และการเข้ารับการบำบัดรักษา

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือ ผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีนที่มารับการตรวจรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2545 จำนวน 159 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบสอบถามการทำหน้าที่ของครอบครัว ซึ่งใช้แบบประเมินการทำหน้าที่ของครอบครัวจุฬาลงกรณ์แฟมิลีสอนเวทอรี่ ที่อุมาพร ตรีงคสมบัติ (2540) สร้างจากแนวคิดการทำหน้าที่ของครอบครัวของแมคมาสเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของผู้ที่เป็น โรคจิตจากสารแอมเฟตามีนอยู่ในระดับดีพอควรในทุกด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านการแก้ปัญหา บทบาทการสื่อสาร การตอบสนองทางอารมณ์ ความผูกพันทางอารมณ์ การควบคุมพฤติกรรม และการทำหน้าที่ทั่วไป

ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัวของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีนให้ดียิ่งขึ้น และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมการทำหน้าที่ของครอบครัวระหว่างสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

Presently, there is an increasing of person with amphetamine induced psychotic disorder, especially in male adolescent to early adulthood. Based on therapeutic data of person with amphetamine induced psychotic disorder, family factor, in particular family function, is one of the significant factors influencing addiction and treatment receive.

The purpose of this study was to examine the family function as perceived by persons with amphetamine induced psychotic disorder. The sample consisted of 159 persons with amphetamine induced psychotic disorder who admitted at Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai province during February to April, 2002. The instrument of this study was a questionnaire consisted of two parts: The Personal Data Recording Questionnaire, and The Chulalongkorn Family Inventory (CFI) Questionnaire, developed by Umaporn Trangkasombut (1997) based on McMaster Model of Family Functioning (MMFF). Data were analyzed using descriptive statistics.

The major results revealed that the average scores of family function as perceived by persons with amphetamine induced psychotic disorder were at a fair level in each part including problem solving, communication, roles, affective responsiveness, affective involvement, behavior control, and general functioning.

These findings, therefore, could be used as a preliminary data for promoting mental health in families of persons with amphetamine induced psychotic disorder. In addition, the family functions among family members of persons with amphetamine induced psychotic disorder could be promoted appropriately.