

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก. เปรียบเทียบค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นของสตูเก๋ลิ๊ด 2 ชนิด คือสตูเก๋ลิ๊ด DFA
และสตูเก๋ลิ๊ด Semi-boiled

<u>DFA Noodle</u>	<u>SB Noodle</u>
-------------------	------------------

11.9	16.83
------	-------

12.9	16.99
------	-------

12.7	17.49
------	-------

12.2	17.69
------	-------

12.4	17.47
------	-------

13.1	17.52
------	-------

12.3	17.24
------	-------

12.1	16.67
------	-------

12.1	16.32
------	-------

11.5	17.22
------	-------

11.5	17.43
------	-------

11.5	16.96
------	-------

11.5	16.02
------	-------

12.2	18.17
------	-------

11.7	17.27
------	-------

12.5	18.07
------	-------

12.5	17.85
------	-------

12.3	17.01
------	-------

12.3	16.79
------	-------

13.4	16.66
------	-------

13.4	16.40
------	-------

13.4	16.30
------	-------

13.4	18.02
------	-------

13.4	16.04
------	-------

12.2	17.47
------	-------

12.0	17.19
------	-------

<u>DFA Noodle</u>	<u>SB Noodle</u>
12.2	17.15
13.4	15.68
12.4	17.31
12.3	17.39
12.5	16.51
12.6	17.93

One-way ANOVA: DFA Noodle_1, SB Noodle

Analysis of Variance

Source	DF	SS	MS	F	P
Factor	1	348.102	348.102	906.33	0.000
Error	62	23.813	0.384		
Total	63	371.915			

Individual 95% CIs For Mean
Based on Pooled StDev

Level	N	Mean	StDev	
DFA Nood	32	12.431	0.606	(-*)
SB Noodl	32	17.096	0.633	(*)
Pooled StDev = 0.620				

-----+-----+-----+-----
13.5 15.0 16.5